

2000-11



TÜRKİYE BİLİMSEL VE
TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU

THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL
RESEARCH COUNCIL OF TURKEY



Temel Bilimler Araştırma Grubu

Basic Sciences Research Grant Committee

**İSKENDERUN KÖRFEZ'İNDEKİ MAVİ YENGEÇ
(Callinectes sapidus RATHBUN, 1896)' İN
BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ**

PROJE NO : TBAG-1552(196T056)

**Yrd.Doç.Dr. ÜNAL ERDEM
Araş.Gör.Dr. CANAN TÜRELİ
Yrd.Doç.Dr. MEHMET ÇELİK**

**EYLÜL 1999
ADANA**

İÇİNDEKİLER**SAYFA**

ÖNSÖZ.....	I
ÇİZELGELER DİZİNİ.....	II
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	IV
ÖZ.....	V
ABSTRACT.....	VI
GİRİŞ.....	1
2.MATERYAL VE METOD.....	3
2.1.Materyalin Tanıtımı.....	3
2.2.Çalışma Alanı.....	9
2.3.Materyalin Temini ve Kullanılan Metodlar.....	12
3.BULGULAR.....	20
3.1.SU ÖZELLİKLERİ.....	20
3.1.1.Sıcaklık (°C).....	20
3.1.2.Tuzluluk (‰).....	21
3.2.BÜYÜME VE MORFOMETRİK ÖZELLİKLER.....	22
3.2.1.Büyüme.....	22
3.2.2.Biyometri.....	30
3.3.ÜREME BİYOLOJİSİ.....	48
3.3.1.Cinsiyet Oranı.....	48
3.3.2.Gonadların Makroskopik Tanımlanması.....	49
3.3.3.Gonadosomatik İndeks.....	51
3.3.4.Kondisyon.....	53
3.3.4.Dişi.....	55
3.3.4.1.Resaptakalum Seminis.....	55
3.3.4.2.Yumurta Verimliliği (Fekondite).....	60
3.3.5.Erkek.....	72
3.3.5.1.Erkek Bireylerde Vas-Deferentia.....	72
3.4.BİYOKÜTLE.....	77
3.5.BESLENME EKOLOJİSİ.....	78
3.6.ET KOMPOZİSYONU.....	86
3.7.LARVA.....	87
3.7.1.Larval Evre Kompozisyonu.....	87

4.TARTIŞMA VE SONUÇ.....	93
4.1. Tartışma.....	93
4.2. Sonuç.....	117
KAYNAKLAR.....	119
TEŞEKKÜR.....	129

ÖNSÖZ

Bu çalışma ile gün geçtikçe ekonomik açıdan önemi artan ve değerlendirilmesi mutlaka gereken, kuzey-doğu Akdeniz de yoğun bir populasyon oluşturan Atlantik kökenli Mavi Yengeç (*Callinectes sapidus* Rathbun, 1896)'in yaşam döngüsü (yumurtlama, larva aşamaları ile kabuk değişimi), üreme biyolojisi (yumurta verimliliği, gonadosomatik indeks), morfometrik özellikleri, beslenme özellikleri (mide ve barsak içeriğinin incelenmesi), biyokimyasal analizler (kuru ağırlık, protein, lipit ve yağ) ile parazitleri gibi biyolojik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Böylece elde edilecek bulgularla bölgemizdeki Mavi Yengeç' in ekolojisinin ve biyolojisinin bilinmesi, stokların korunması ve avcılığı ile ilgili yönetim ilkelerinin yorumlanmasında temel oluşturacak bilgi eksikliğinin en azından bölgemiz açısından giderilmesi söz konusu olacaktır.

Bu çalışma TBAG-1552 Kod No' lu Proje olarak TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu tarafından desteklenmiştir.

ÇİZELGELER DİZİNİ

<u>Çizelge No</u>	<u>Sayfa No</u>
Çizelge 1. Yumurtalık Koy' unda Derinliklere Göre (m) Yıllık Ortalama Yüzey Su Sıcaklıkları(°C).....	20
Çizelge 2. Sıcaklık İçin Derinliğe Ait Varyans Analizi.....	20
Çizelge 3. Yumurtalık Koy' unda Derinliklere Göre (m) Yıllık Ortalama Tuzluluk Değerleri (%o).....	21
Çizelge 4. Tuzluluk İçin Derinliğe Ait Varyans Analizi.....	21
Çizelge 5. İskenderun Körfezi' nde 1996-1998 Yıllarını Kapsayan Örneklemelemlerde Aylık İncelenen Birey Sayısı, Olgunluk ve Cinsiyet Oranları (%).....	23
Çizelge 6. Mavi Yengeç Bireylerinde Alınan Biyometrik Ölçümlerle İlgili Ortalama Değerler.....	23
Çizelge 7. Kısaçlar ve Abdomen Segmentleri İle İlgili Ortalama Değerler.....	24
Çizelge 8. Bağımsız Değişken (X) Olarak Alınan Karapas Uzunluğu İle <i>C. sapidus</i> ' un Diğer Vücut Boyutları Arasındaki İlişki Denklemleri, Korelasyon Katsayıları (r) ve Büyüme Biçimi(b).....	30
Çizelge 9. Karapas Uzunluğu (KU) Bağımsız Değişken (X) Alınarak Vücut Boyutları İçin Saptanan Regresyon Katsayılarına Ait Varyans Analizleri.....	32
Çizelge 10. Karapas Uzunluğu (KU) Bağımsız Değişken (X) Alınarak Abdominal Segmentler İçin Yapılan Regresyon Katsayılarına Ait Varyans Analizleri.....	33
Çizelge 11. Karapas Uzunluğu (KU) İle Vücut Boyutlarıyla İlgili Regresyon Katsayılarına Ait Analiz Sonuçları.....	34
Çizelge 12. Mavi Yengeç' de Karapas Uzunluğu Olan Bağımsız Değişken (X) İle Kısaç Boyutları Arasındaki Regresyon Denklemleri, Korelasyon Katsayısı (r) ve Büyüme Biçimi (b).....	39
Çizelge 13. Karapas Uzunluğu İle Büyük Kısaç (Sağ) Boyutları Arasındaki İlişkilerin Regresyon Katsayılarına Ait Varyans Analiz Sonuçları.....	40
Çizelge 14. Karapas Uzunluğu İle Küçük Kısaç (Sol) Boyutları Arasındaki İlişkilerin Regresyon Katsayılarına Ait Varyans Analiz Sonuçları.....	41
Çizelge 15. Karapas Uzunluğu İle Kısaç Boyutları Arasındaki İlişkilerin Regresyon Katsayılarına Ait Varyans Analizi Sonuçları.....	42

Çizelge 16. Aylara Göre Mavi Yengeç'lerde Cinsiyet Dağılımı ve Oranı.....	48
Çizelge 17. Dişi Bireylerde Makroskobik Tanımlanmaya Göre Gonadların Yıllık Gelişim Döngüsü.....	50
Çizelge 18. Erkek Ve Dişi Mavi Yengeç'lerde Aylara Göre Gonadosomatik İndeks Değerleri.....	51
Çizelge 19. Yumurtalık Körfez'i Mavi Yengeç Örneğinde Aylara Göre Hesaplanan Ortalama Kondisyon ve Standart Sapma Değerleri.....	53
Çizelge 20. Örnekleme Aylarına Göre Döllenen ve Döllenenmemiş Dişi Değerleri	56
Çizelge 21. Dişi Mavi Yengeç'lerde Resaptakulum Seminisin Temel İstatiksel Değerleri.....	56
Çizelge 22. Embriyo Gelişim Aşamaları ve Ortalama Yumurta Çapları (μ).....	61
Çizelge 23. Fekondite ve Bazı Vücut Boyutları İçin yapılan Regresyon Katsayılarına Ait Varyans Analiz Tablosu.....	70
Çizelge 24. Fekondite İle Vücut Boyutlarıyla İlgili Regresyon Katsayılarına Ait Analiz Sonuçları.....	70
Çizelge 25. Aylara Göre Vas-Deferentia'lar da Sperm Bulunan ve Bulunmayan Erkek Birey Sayıları ve Bulunmayanların Yüzde Oranları.....	73
Çizelge 26. Yumurtalık Koy'unda Farklı Derinlik Bölgelerinde Mevsimlere Göre Hesaplanan Mavi Yengeç Ortalama Biyokütle Değerleri.....	77
Çizelge 27. İskenderun Körfez'indeki Mavi Yengecin Mide Doluluk Dereceleri ve Yüzde Oranları.....	78
Çizelge 28. Mavi Yengeç Mide İçeriğinde Saptanan Besin Grupları ve Bunların Bulunma Sıklığı (F.O %) Ve Yüzde Ağırlık Değerleri (%W).....	79
Çizelge 29. Karapas Genişliğine (KG) Göre Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerde Bulunan Besin Grupları.....	80
Çizelge 30. Mavi Yengeç Bireylerinde Aylara Göre Belirlenen Besin Grupları.....	82
Çizelge 31. Mavi Yengeç'lerde Erkek ve Dişi Bireylerin Göğüs ve Kısaç Etlerinin Mevsimsel Besin Maddeleri Oranları (%).....	86
Çizelge 32. Mayıs-1997-Mart-1998 Dönemlerinde Yumurtalık Koy'unda Derinliklere Göre Mavi Yengeç Zoeal Larvalarının Aylık Bulunurluğu.....	89
Çizelge 33. Zoeal Larvaların Derinliklere Göre Yüzde Dağılımı (%).....	89

ŞEKİLLER DİZİNİ

<u>Sekil No</u>	<u>Sayfa No</u>
Şekil 1. Mavi Yengeç Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerin Dorsalden ve Ventralden Görünümleri.....	4
Şekil 2. Mavi Yengeç Larva Evreleri a) Zoea Dorsal b) Zoea lateral c) Megalopa Dorsal den Görünümleri.....	7
Şekil 3. Mavi Yengeç’ de Eşeyssel Olgunluk ve Cinsiyet ile İlgili Ayırıcı Özellikler.....	8
Şekil 4. Çalışma Alanı İskenderun Körfezi (A) ve Yumurtalık Koyu ile İstasyonlar (B).....	11
Şekil 5. Mavi Yengeç’ de Morfometrik Ölçümler.....	13
Şekil 6. Mavi Yengeç’ de Göğüs Eti.....	17
Şekil 7. Mavi Yengeç’ de Kısa Kaç Eti.....	18
Şekil 8. Araştırmada Kullanılan WP-2 Plankton Kepçesi Örneği (Özel,1992).....	19
Şekil 9. Yumurtalık Koy’ unda Aylara Göre Ortalama Yüzey Su Sıcaklıkları.....	21
Şekil 10. Yumurtalık Koy’ unda Aylara Göre Ortalama Tuzluluk Değerleri	22
Şekil 11. Mavi Yengeç Populasyonun da Aylara Göre Ergin Dişi-Erkek Sayıları (n).....	25
Şekil 12. Mavi Yengeç Populasyon da Aylara Göre Juvenil Dişi-Erkek Birey Sayısı (n).....	25
Şekil 13. Mavi Yengeç Populasyonun da Cinsiyet, Juvenil ve Ergin Birey Oranları.....	26
Şekil 14. Dişi, Erkek , Yumurtalı Dişi ve Juvenil Bireylerde Karapas Genişliği Yüzde Oranları.....	27
Şekil 15. Dişi, Erkek, Yumurtalı Dişi ve Juvenil Bireylerde Karapas Uzunluğu Yüzde Oranları.....	28
Şekil 16. Karapas Uzunluğu (cm) İle Vücut Ağırlığı (g) ve Kısa Karapas Genişliği (cm) Arasındaki İlişki Grafikleri.....	35
Şekil 17. Karapas Uzunluğu (cm) İle Uzun Karapas Genişliği (cm) ve Vücut Derinliği (cm) Arasındaki İlişki Grafikleri.....	36
Şekil 18. Karapas Uzunluğu (cm) İle Dişilerde 4. ve 6. Abdomen Genişliği (cm) Arasındaki İlişki Grafikleri.....	37
Şekil 19. Karapas Uzunluğu (cm) İle Erkek Abdomen Genişliği (cm) Arasındaki İlişki Grafiği	38
Şekil 20. Karapas uzunluğu (cm) İle Büyük Kısa Kaç Propodal Uzunluğu (cm) ve Derinliği (cm) Arasındaki İlişki Grafikleri.....	43

Şekil 21. Karapas Uzunluğu (cm) İle Büyük ve Küçük Kısaç Propodal Genişliği Arasındaki İlişki Grafikleri (cm).....	44
Şekil 22. Karapas Uzunluğu (cm) İle Küçük Kısaç Propodal Uzunluğu (cm) ve Derinliği (cm) Arasındaki İlişki Grafikleri.....	45
Şekil 23. Ln Dişi 4. Abdomen Genişliği (cm) İle Ln Karapas Uzunluğu (cm) Arasındaki İlişki Grafiği.....	46
Şekil 24. Erkek Küçük Kısaç Ln Propodal Uzunluğu (cm) ve Ln Karapas Uzunluğu (cm) Arasındaki İlişki Grafiği.....	47
Şekil 25. Dişi ve Erkek Bireylerde Hesaplanan Ortalama Gonadosomatik İndeks Değerleri.....	52
Şekil 26. Mavi Yengeç Dişi Bireylerde Aylara Göre Ortalama Kondisyon Değerleri (%).....	54
Şekil 27. Mavi Yengeç Erkek Bireylerde Aylara Göre Ortalama Kondisyon Değerleri (%).....	55
Şekil 28. Aylara Göre Resaptakulum Seminis' te Bulunan Spermatoforların Ortalama Uzunluğu ve Standart Sapma Değerleri.....	57
Şekil 29. Aylara Göre Dişilerde Resaptakulum Seminis Durumu.....	57
Şekil 30. Kısa Karapas Genişliğine Göre Dişilerde Resaptakulum Seminis Durumu.....	58
Şekil 31. Karapas Uzunluğuna Göre Dişilerde Resaptakulum Seminis Durumu.....	58
Şekil 32. İstasyonlara Göre Dişilerde Resaptakulum Seminis Durumu.....	59
Şekil 33. Gonad Gelişimini Göre Dişilerde Resaptakulum Seminis Durumu.....	60
Şekil 34. Aylara Göre Değişik Embriyo Gelişim Evrelerine Sahip Dişi Sayısı.....	61
Şekil 35. Dişi Mavi Yengeç' de Farklı Embriyonik Gelişim Evrelerindeki Yumurtalar a) Sarı b) Portakal Renkli İlk gelişim c) Kiremit d) Kahve Renkli Gelişmekte e) Siyah Renkli Son Gelişim.....	63
Şekil 36. Mavi Yengeç' de Sarı Renkli İlk Embriyonik Gelişim Evresindeki Yumurtalar.....	64
Şekil 37. Mavi Yengeç' de Siyah Renkli Son Embriyonik Gelişim Evresindeki Yumurtalar.....	65
Şekil 38. Mavi Yengeç' de Embriyonik Gelişim Evreleri İle : a) Kısa karapas Genişliği (cm), b) Karapas Uzunluğu (cm), c) 4. Abdomen Genişliği (cm), d) 6. Abdomen Genişliği (cm), e) İstasyonlar Arasındaki İlişki Grafikleri.....	68
Şekil 39. Fekondite (F) ile Ağırlık (g), Karapas Genişliği (cm), Karapas Uzunluğu (cm), 4. ve 6. Abdomen Segment Genişliği Regresyon Grafikleri.....	71
Şekil 40. Aylara Göre Vas-Deferentia da Ortalama Spermatofor Uzunluğu Dağılımı ve Standart Sapma Değerleri.....	73

Şekil 41. Aylara Göre Vas-Deferentia da Spermatofor Oluşumu.....	74
Şekil 42. İstasyonlara Göre Vas-Deferentia da Spermatofor Oluşumu.....	74
Şekil 43. Kısa Karapas Genişliğine Göre Vas-Dereferentia da Spermatofor Oluşumu.....	76
Şekil 44. Karapas Uzunluğuna Göre Vas-Dereferentia da Spermatofor Oluşumu.....	76
Şekil 45. Abdomen Genişliğine Göre Vas-Deferentia da Spermatofor Oluşumu.....	76
Şekil 46. Karapas Genişliğine Göre Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerde Bulunan Besin Grupları.....	81
Şekil 47. Aylara Göre Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerde Besin Grupların.....	83
Şekil 48. Aylara Göre Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerde Beslenme İndeksi.....	85
Şekil 49. Aylara Göre Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerde Boşluk İndeksi.....	85
Şekil 50. Karapas genişliğine Göre Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerde Boşluk İndeksi.....	85
Şekil 51. Yumurtalık Koy' u Mavi Yengeç'lerin Zoéal Larvalarının Yüzde Dağılımı.....	87
Şekil 52. Mavi Yengeç' de I. ve VIII. Zoéal Evresi.....	91
Şekil 53. Mavi Yengeç' de VI. ve VII. Zoéal Evresi.....	92

ÖZ

Bu çalışma ile İskenderun Körfez' inden 15 Eylül 1996 ile 15 Mayıs 1998 tarihleri arasında elde edilen örnekler incelenerek Atlantik kökenli Mavi Yengeç (*Callinectes sapidus* Rathbun, 1896)'in yaşam döngüsü (yumurtlama, larva oluşturma, kabuk değişimi), üreme biyolojisi (yumurta verimliliği, gonadosomatik indeks), morfometrik özellikleri, beslenme özellikleri, et analizleri (kuru ağırlık, protein, lipit) gibi biyolojik özellikleri belirlenmiştir. Sonuçta İskenderun Körfez' indeki popülasyonda %68.8 ile dişilerin baskın olduğu, ergin dişilerin ortalama 12.69 ± 2.33 cm, erkeklerin 12.74 ± 2.77 cm, juvenillerin ise 7.81 ± 1.98 cm karapas genişliğinde oldukları saptanmıştır. Eşeyssel olgunluğa dişilerin 6.05 cm, erkeklerin 4.48 cm karapas uzunluğunda ulaştıkları ve çiftleşmenin ilkbaharda Mart-Nisan aylarında vejetasyonlu, tatlı suyun karıştığı sığ bölgelerde gerçekleştiği, yumurtlamanın Mart ile Eylül hatta Ekim ayına kadar yoğun olarak Yumurtalık Koy' unun 12-15 m derinliklerde gerçekleştiği, yumurta verimliliğinin ortalama $1.876.968 \pm 1.165.659$ adet olduğu bulunmuştur. Yumurta açılımdan sonra 8 zoea larval evre geçirdikleri saptanmıştır. Yumurta açılımı Yumurtalık Koy' unun girişindeki 10-20 m derinliklerde gerçekleşmekte daha sonra hakim rüzgarlarla larvalar sığ vejetasyonlu bölgelere taşınmaktadır. Juvenil bireyler Mayıs ve Eylül de arazide bulunmuştur. Yumurtalık Koy' unun toplam 118 km^2 alanında toplam biyokütle 34.9291 kg , km^2 ise 0.30 kg olarak hesaplanmıştır. Trol çekimlerinde av grupları içerisinde ilk sırayı Mavi Yengecin aldığı gözlenmiştir. Mavi Yengecin bivalviya, krustase, gastropod, balık ve bitkisel organizmalar üzerinden beslendikleri bulunmuştur. Yengeç etinin protein oranı yüksek (%21.96) , lipit (%0.21) oranı ise düşük saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mavi Yengeç, *Callinectes sapidus* , Biyo-Ekolojik Özellikler, Üreme Biyolojisi, Et Analizleri

ABSTRACT

This study was conducted in İskenderun Bay and investigated the cycle (ovulation, larval period, molt cycle), reproductive biology (fecundity, gonadosomatik index), morphometric aspects, feeding regine, meat analysis (dry weight, protein, lipit) of *Callinectes sapidus* from 15 September 1996 to 15 May 1998, Which is originated from Atlantic (Which is originating Atlantic). The population of mature females in İskenderun Bay were dominant to males (68.8 %) and the carapace of mature females and males were 12.69 ± 2.33 and 12.74 ± 2.77 cm in width, respectively. Whereas, juvenles were observed 7.81 ± 1.98 cm in carapace width. Sexual maturation of females and males was observed at 6.05 and 4.48 carapace length respectively. Mating behaviour was observed in spring from March to April in freshwater and shallow area which was rich in vegetation. Ovulation was detected which detected in Yumurtalık Bight (12-15 m depth) from September to October even until November. The Blue Crab was found to be a mean fecundity of $1.876.968 \pm 1.165.654$ and it was found out that after hatcing, larvae were passed through 8 zoeae stage. Hatching occured in 10-20 m depth in entire Yumurtalık Bight However, that were moved to the shallow, vegetation area by winds. Juvenils were first seen in sea between May and September. In Yumurtalık Bight total biomas was calculated as $34.9291 \text{ kg}/118 \text{ km}^2$ ($0.30 \text{ kg}/ \text{km}^2$) . According to the catches which were performed by troll, the biggest number of groups was seen as Blue Crabs. The Blue Crabs was feeding on Bivalvia, Crustacea, Gasropoda, fish and phytoplantons, protein rate of crab meat was obtained as 21.96 %. Although lipit rate was found to be low 0.21%.

Key Words: Blue Crab , *Callinectes sapidus* , Bio-Ecological Parameters, Reproductive Biology, Meat Analysis

1.GİRİŞ

Türkiye’de ticari amaçla avcılığı yapılan yengeç türlerinin başında Akdeniz bölgesinde ve özellikle Kuzey-doğu Akdeniz’de yaygın bulunan Mavi Yengeç (*Callinectes sapidus* RATHBUN, 1896) gelmektedir. 1980’li yıllara kadar, bu yengeç türünün ticari amaçlı herhangi bir üretim faaliyeti bulunmamaktaydı. Bölge halkı tarafından Mavi Yengeç eti tüketiminin olmayışı, iç pazarlardan da herhangi bir istek olmamasına karşın, dış satım yapılabileceğine ilişkin bazı ipuçları 1980’li yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle, özellikle Akyatan (Karataş) dalyan işletmesinde avlanan Mavi Yengeçler ticari bir değer kazanmış ve hatta Karataş (Adana) ilçesi yakınlarında bir de Yengeç işleme atölyesi açılmıştır. Ancak birkaç yıllık üretim faaliyeti sonunda pazar sorunu ve uzak doğu ülkeleri ile rekabet edilemediğinden avlama ve işleme faaliyetine son verilmişti. Ancak bu potansiyel, özellikle Yumurtalık-Karataş ilçeleri arasında ve yakın çevrelerinde halen bulunmaktadır. Ne var ki, balıkçıların ağlarına takılan Mavi Yengeçler ile bölge dalyanlarında balıklarla birlikte kuzuluklara giren binlerce yengeç öldürüp atılmakta, ticari bakımdan değerlendirilmeyen bir kitle halinde ziyan olup gitmektedir.

Yengeçler yenilebilir et kalitesi ve ekonomik değer bakımından gelişmiş ülkelerde oldukça yüksek fiyat bulan bir su ürünüdür. Gelişmiş ülkelerde yengeç endüstrisi kurulmuştur. Bu endüstride çeşitli işleme kademesinden geçen yengeçler üç tip ürün halinde üretilmektedir. Bunlar yengeç eti, bütün yengeç ,yengeç atıkları şeklindedir. Atık denilebilecek yengeç parçaları kabuklar, kitin, protein konsantrasyonları , atık etler ve sakatatlardır. Bunlardan atık etler fazla miktarda protein ve mineral içerdiğinden dolayı sığır, domuz, kümes hayvanları ve hatta balık beslenmesinde kullanıldığı bildirilmektedir. Kabuklardan elde edilen kitin maddesinden kitinoz elde edilmekte ve bu maddeden tekstilde, mürekkep yapımında, yapıştırıcı yapımında, kozmetik sanayinde kullanılmaktadır (Paul ve Haefner, 1985a).

Bu çalışma ile gün geçtikçe ekonomik açıdan önemi artan ve değerlendirilmesi mutlaka gereken , kuzey-doğu Akdeniz’de yoğun bir populasyon oluşturan Atlantik kökenli Mavi Yengeç (*C. sapidus*) ‘in bölgemiz koşullarında yaşam döngüsü (yumurtlama, kabuk dökme, larva evreleri) , üreme zamanı, büyüklüğü ve yeri, morfometrik özellikleri ve beslenmesi gibi biyolojik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Böylece elde edilecek bulgularla, bölgemizdeki Mavi Yengeç’in ekolojisinin ve biyolojisinin bilinmesi, stokların

korunması ve avcılığı ile ilgili yönetim ilkelerinin yorumlanmasında temel oluşturacak bilgi eksikliđinin en azından bölgemiz açısından giderilmesi söz konusu olacaktır.

2. MATERYAL VE METOD



2.1. Materyalin Tanıtımı

Araştırma konusu olan Mavi Yengeç (*C. sapidus*)'in taksonomisi Alvarez (1968)'e göre aşağıda gösterildiği gibidir.



Filum	: Arthropoda
Classis	: Crustacea
Subclassis	: Malacostraca
Series	: Eumalacostraca
Ordo	: Decapoda
Supersection	: Reptantia
Section	: Brachyura
Superfamilya	: Brachyrhyncha
Familya	: Portunidae
Genus	: Callinectes
Species	: <i>C. sapidus</i>

Mavi Yengecin bazı temel biyolojik özellikleri kısaca şöyledir.

İlk çifti beslenme ve savunma işlevine sahip olan kısaç şekli almış beş çift ayağa sahiptir. Kısaçları izleyen üç çift ayak yürüme işini, son çift ise yüzme işini üstlenmiştir. Mavi Yengeç yürüme ayakları ile iyi bir yürüyücü ve petal ayakları ile de hızlı bir yüzücüdür. Yapılan markalama çalışmaları 100 günde 500 mil yüzebildiklerini göstermiştir. Karapas veya kabuk genişliği, uzunluğunun 2-2,5 katı kadardır. Genişliğinde her bir kenardaki iki ışın vardır. Kabuk önde incelmektedir, gözlere kadar kenarlarda 8 adet yan ışınlar bulunmaktadır. Vücut yüzeyi kalsiyumlu kitin dış iskelet ile çevrilmiştir. Gözler kısa bir sap üzerinde serbest hareket edebilmektedir. Kabuk yüzeyinde renk koyu yeşilden kahverengimsi yeşile kadar değişebilmektedir. Erkek bireylerin kısaç parçalarının ucu kırmızı, çoğunlukla da mavidir. Dişilerde ise kısaçlar koyu kırmızı uçludur. Erkek bireylerde abdomen Y şeklinde, dişilerin ergin olmayanlarında üçgen, ergin bireylerde ise yarım ay şeklindedir (şekil 1).



Erkek



Dişi



Şekil 1. Mavi Yengeç Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerin Dorsal ve Ventral' den Görünümleri

Mavi Yengeç Atlantik kökenli olup dağılım alanı Nova Scotia' dan kuzey Arjantin'e kadardır. Zamanla Avrupa sularına geçmiş , Fransa, Danimarka kıyıları ile Akdeniz'e yerleşmiştir. İsrail de ve Mısır'ın Nil nehir deltasında da populasyon oluşturmuştur. Yumuşak zemini tercih etmektedir ve sık sık kendisini zemine gömmektedir. Esas yaşam alanları kıyısız olup, 35 m derinliklerde bulunmaktadır. Normalde tuzlu, sıcak tropikal sularda yaşamalarına karşın, %00 ile %90 arasında değişen tatl suda yüksek tuzlu alanlara kadar farklı alanlarda dağılım göstermektedir. Sadece dişi bireylerde göç olayı görülmektedir.


Vücudu dış iskelet ile sarıldığından büyümek için bunun zaman zaman atılması gereklidir. Bu işleme "Molting" veya "shedding" adı verilmektedir. Kabuk değişimi yüksek vejetasyonlu alanlarda gerçekleşmektedir. Yeni oluşan kabuk oldukça saydam ve yumuşaktır. Kabuk değişiminden 2 veya 3 saat sonra yengeçlerde 4 veya 5 inch' lik büyüme olmakta, 72 saat sonra ise yeni sert kabuk oluşmaktadır. En küçük yengeçlerde her 3-5 günde bir kabuk değişmekte, her değişimde büyüklüğünde ortalama %33 artış olmaktadır. Mavi yengeç eşeyssel olgunluğa 12 ila 16 ayda ulaşmaktadır. Ortalama yaşam süresi ise 2-4 yıl arasında değişmektedir. Tropikal ve subtropikal populasyonlarda üreme bütün bir yıl içinde sürmektedir. Erkek bireyler (yaklaşık 4 inch' lik) dişilere göre daha küçük büyüklükte eşeyssel olgunluğa ulaşmaktadırlar. "She crab" şeklinde isimlendirilen olgunlaşmamış dişiler, 12 -14 ay sonra eşeyssel olgunluğa ulaşmaktadırlar. Olgunlaşma kabuk değiştirdiği zaman büyüme ile gerçekleşmekte ve bu nedenle de "Terminal Molt" olarak bilinmektedir. Dişiler yalnız yılda bir kez, erkekler ise birkaç kez çiftleşmektedir. Çiftleşme genellikle acı sularda gerçekleşmektedir. Yengeçler "doubler-çift" şeklinde adlandırılan pozisyonda , kabuk değişimini tamamlamayan dişi bireyler, üzerlerinde taşıdıkları erkek bireyler tarafından korunmaktadır. Çiftleşme dişilerin yumuşak kabuklu olduğu zamanda gerçekleşmektedir. Dişi yengeçlerde çiftleşmeden sonra kabuk değişimi sona ermekte, erkek bireylerde ise büyüme süresince 3 yaz boyunca kabuk değişimi devam etmektedir. Erkek birey spermelerini spermatozoa şeklinde dişi bireyin seminal resaptakulumuna iletmektedir. Sperm dişinin vücudunda yumurtlama geciktiği durumlarda 1 yılı aşkın süre depo edilmekte ve hatta bu durumda dişi bir kez daha çiftleşebilmektedir. Dişiler çiftleşmeden 1 veya 9 ay sonra suyun sıcaklığına bağlı olarak yumurtlamaktadırlar. Yumurtalar seminal resaptakulumdan geçerken orada döllenmektedirler. "Sponge Crab" şeklinde isimlendirilen dişiler yarım ay şeklindeki "apron" abdomende 2 milyonu aşkın sayıda yumurta taşımaktadır. Mavi Yengeç esas olarak acı sularda yaşamakta, fakat yumurtaların açılması yüksek tuzlulukta gerçekleştiği için dişiler derinlere göç etmektedirler. Yumurta kütlelerinde yumurta sarısının gelişimine bağlı olarak

gelişme ilerledikçe rengi turuncudan, koyu kahverengiye dönüşmektedir. Döllenmeyi izleyen 2 hafta sonra, koyu kahve renkli yumurta kütesinde serbest yüzen zoea larvaları oluşmaktadır. Zoea larvaları duyarlı yapıda olup, tuzluluk ve sıcaklık değişimine olan dayanıklılığı oldukça düşüktür. Zoea ,7 veya karmaşık kabuk değişimi geçirerek 31-49 gün sonunda “megalopa” denilen ıstakoz benzeyen yengeç şekline dönüşmektedir (şekil 2). 20 gün sonra tuzluluk ve sıcaklığa bağlı olarak megalopa kabuk değiştirerek ilk gerçek yengece dönüşmektedir. Yetişkin evre, yumurta açılmasından 12 –18 ay sonra acı-suda gerçekleşmektedir. Zoea’ den yetişkinliğe kadar dişiler 18-20; erkekler 25 kez kabuk değiştirmektedirler.


Doğada Mavi Yengecin ilginç yapısal özelliklerinden dolayı cinsiyet belirlenmesi kolaylıkla yapılabilmektedir. Mavi kısıkaçlı bireyler erkek olup “jimmy”olarak adlandırılmaktadırlar. Kırmızı kısıkaca sahip olanlar ise dişidirler . Dişilerden abdomeni Y şeklinde olanlar olgunlaşmamış (çiftleşmemiş) dişiler “she crab” , yarım ay şeklinde abdomene sahip olanlar ise ergin (çiftleşmiş) ”sooks” şeklinde adlandırılmaktadırlar (şekil 3).

Mavi Yengeç canlı veya ölü , bitkisel ve hayvansal materyallerle oldukça geniş bir beslenme çeşitliliğine sahiptir. Leşçi olarak bilinirse de canlı ve taze besinleri tercih etmektedirler. Küçük balıkları yakalayıp, ezici kısıkaçları ile de genç İstiridyeler ve Bivalv' leri yakalayıp yemekteyiz. Mavi yengeçlerde, yaralı veya yumuşak kabuklu bireyler üzerine kannibalistik görülmektedir.

Mavi Yengeçlerde hastalıklara neden olan çok sayıda parazit bilinmektedir. Amerika'nın Atlantik kıyılarında *Paramoeba pernicioso* (amoebozoa:Protozoa) Mavi Yengeçte kitlesel ölümlere neden olmaktadır. Solungaçları ise çoğunlukla Nemertean solucanlar gibi parazitlerle enfekte olmaktadır. *Sacculina carsini* (Crustacea) ise en ciddi parazitlerini oluşturmaktadır. Bunlar vücut dışında birikmekte olup, çoğunlukla yumurta kütesi ile karıştırılmakta ise de genellikle renginin gri , kaygan düz yapıda olması ile yumurta kütesinden ayrılmaktadırlar.




Şekil 2. Mavi Yengeç Larva Erveleri a) Zoea Lateral b) Zoea Dorsal c) Megalopa Dorsal' den Görünümleri



(Ergin Dişi)



(Ergin Erkek)




(Juvenil)

Şekil 3. Mavi Yengeç' de Eşeyssel Olgunluk ve Cinsiyet İle İlgili Ayırıcı Özellikler


2.2. Çalışma alanı

Araştırma sahamızın içinde bulunduğu İskenderun Körfezi, Levantin havzasının kuzey doğusunda, yaklaşık 65 km uzunluğunda ve 35 km genişliğinde ve yaklaşık 2275 km² bir alana sahiptir (İyiduvar,1986). Körfezde ortalama derinlik 70 m olmasına, tüm su kolonunun ışıklı olmasına ve besleyici element miktarının açık denize oranla 2-4 kat daha fazla olmasına karşın, körfezin dinamik yapısı nedeniyle, körfezde ne derinliğe doğru belirgin bir oksijen azalması, ne de belirgin bir ötrifikasyon bulunmamaktadır (Yılmaz ve ark., 1992). Açık denize bağlandığı kesimin geniş olması nedeniyle dip akıntılarında ve rüzgar hareketlerinden etkilenmektedir. Körfez dinamik bir yapıya sahiptir. İskenderun Körfez' inin güneydoğu ve kuzeydoğu kısmında kayalık bir zemin ve kuzeydoğu kesiminde deniz çayırının bulunduğu bir alan yer almaktadır. Yumurtalık Körfez' inde örnekleme yengeçlerin yoğun olarak bulunduğu Karataş ilçesine kadar uzanan Yumurtalık kıyılarından çizilen hat boyunca gerçekleştirilmiştir (şekil 4 A). Ayrıca bu hat içerisinde bulunan Yumurtalık Koy' unda her bir derinlik düzeyinde (0-10; 10-20; 20-50 m) birbirlerine paralel 2 adet olmak üzere toplam 6 istasyonda trol örnekleme yapılmıştır (şekil 4 B). Yumurtalık Koy' u ise İskenderun Körfezi'nin batı yakasında yerleşmiş, uzunluğu ortalama 14 km olup, genişliği ise 8,4 km' dir (şekil 4 B). Alanı 118 km² ve en yüksek derinliği İskenderun Körfez' i girişindeki yer almış olup 46 m' dir. Doğusunda İskenderun Körfezi, güney, kuzey ve batısında ise Yumurtalık ilçe sınırları tarafından çevrilmiştir. Körfez içine kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yerleşmiş olan bu koy, üçgenimsi bir yapı göstermektedir. Koyun, İskenderun Körfezi' ne açılan giriş kısmı oldukça geniş (8,4 km) olduğundan , körfezin hidroğrafik koşullarından yoğun olarak etkilenmektedir. Taban tamamen çamur, mil ve kumlarla kaplı olup, sadece Yumurtalık ilçesi tarafında yer yer kayalıklara rastlanmaktadır. kuzey ve kuzeybatı kıyıları yöresel kayalarla çepeçevre kuşatılmış iken, güney kıyıları tamamen alüvyonlarla kaplı ve düz ova yapısındadır. Bu yüzyılın ortalarına kadar Ceyhan nehri Yumurtalık Koyu'na dökülürken , son zamanlarda yatak değiştirerek daha güneye yani Karataş ilçesine doğru dökülmeye başlamıştır. Koyun güneybatısında toplam alanı 1300 hektar kadar olan Çamlık veya Yumurtalık Dalyanı bulunmaktadır. Bu dalyandan bol miktarda Mavi Yengeç avlanmaktadır. Doğu Akdeniz'deki Kilikya Baseni'nin kuzeydoğu köşesinde yer alan İskenderun Körfezi'nin bir parçası olan bu koy, doğal olarak bölgenin sub-tropikal iklim koşullarının etkisi altındadır. Koyun sığ oluşu ve ana karanın içine doğru daha fazla giriş yapması , sıcak iklim

koşullarından çevre bölgelere oranla daha çok etkilenmesine neden olmaktadır. Böylece koy abiyotik koşullar itibariyle özellikle yaz aylarında tropikal karakterli hale gelmiş olmaktadır.



(A)



(B)




Şekil 4. (A) Çalışma Alanı İskenderun Körfezi (B) Yumurtalık Koyu İle İstasyonlar

2.3 Materyal Temini ve Kullanılan Metodlar

Araştırma ile ilgili olan örneklemeler 15 Eylül 1996 ile 15 Mayıs 1998 tarihleri arasında yürütülmüştür. Örneklerin alınmasında Ç.Ü Su ürünleri Fakültesinin Gözlem adlı motorlu teknesinden yararlanılmıştır. Yumurtalık Koy' unda örnekleme 10, 20 ve 30 m derinliklerde çizilen hat boyunca, her derinlikte 2 tekerrürlü olmak üzere toplam altı istasyonda trol ağı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca koy 0-5 m 'lik sığ bölgelerinde tül ıgırıp, sepet ve kepçeler ile örnekleme yapılmıştır (şekil 4 B). Bu dönem içerisinde ayrıca bölgede yer alan dalyanlardan, Akyatan ve Hurma Boğazı dalyanı ve Karataş kıyılarından da trol ve uzatma ağlar ile örnekler elde edilmiştir (şekil 4 A). Araştırma süresince belirtilen istasyonlarda yüzey suyu sıcaklığı ve tuzluluk ölçümleri YSI marka 30 model salinometre cihazı ile yapılmıştır.

Ergin ve juvenil bireyler yakalandıktan sonra laboratuvara getirilerek, erginlerde erkek ve dişiler ayrılmış ve 0,1 g duyarlı terazi ile ağırlıkları ölçülmüştür. Ağırlık birimi olarak gram kullanılmıştır. Örnek bireylerde ayrıca morfometrik ölçümler yapılmıştır. Bunlar Lateral ışın içermeyen Kısa Karapas Genişliği (KKG), İçeren Uzun Karapas Genişliği (UKG), Frontal ışın içeren Karapas Uzunluğu (KU), Vücut Derinliği (VD), Sağ ve Sol Kısaçların Propodal Uzunluğu (SKPU, SolKPU) , Genişliği (SKPG, SolKPG) ve Derinliği (SKPD, SolKPD), dişilerde 4.ve 6. Abdomen Segmentlerinin Genişliği (DAG4,DAG6), erkeklerde ise kaynaşmış 4. ve 5. Segment Genişliği (EAG) (şekil 5) dir. Bu ölçümlerde kumpas kullanılmış ve ölçü birimi olarak cm alınmıştır. Daha sonra ölçüm değerlerinin temel istatistiksel verileri hesaplanmış ve aralarındaki ilişkiler belirlenmiştir (Hartnoll 1978; Paul ve Haefner 1985 a, b; 1990; Olmii III ve Bishop 1983).

Büyüme özelliğini belirlemek için $y=a.x^b$ şeklindeki Allometrik Büyüme Denklemi kullanılmıştır. Eğrisel olan Allometrik Büyüme Denklemine her iki tarafının logaritması veya Ln alınarak denklem $\ln y = \ln a + b \cdot \ln x$ şeklindeki doğrusal ilişki denklemine dönüştürülmüştür (Hartnoll 1974;1978, Paul ve Haefner 1985 a, b). X bağımsız değişken olarak Hartnoll (1978)'ın önerdiği şekilde Karapas Uzunluğu (KU) alınarak diğer morfometrik ölçümlere de büyüme denklemi uygulanmıştır. Bu doğrusal denklemde elde edilen b değeri büyüme biçimini belirtmektedir. Buna göre b=1 ise büyüme izometriktir, karapas uzunluğu ile diğer vücut kısımları eşit oranda büyüme özelliği gösterirler. b<1 ise negatif allometri göstermektedir ; diğer vücut kısımları karapas uzunluğuna göre daha yavaş bir büyüme gerçekleşmektedir. b>1 pozitif allometri olup; diğer vücut kısımlarının karapasa



řekil 5. Mavi Yengeç' de Morfometrik Ölçümler

göre daha yüksek bir büyüme sahip olduğunu göstermektedir (Hartnoll, 1974;1978, Paul ve Haefner 1985 a, 1985 b, 1990). İkincil cinsiyet karakterlerinden kısaç , abdomen ve pleopodların büyüme şekli, cinsel olgunluk büyüklüğünü tanımlamada da kullanılmaktadır. Cinsel olgunluğu belirlemede de $y=a.x^b$ Allometrik Büyüme Denkleminde yararlanılmıştır (Hartnoll, 1974; Paul ve Haefner 1985 a).

Üreme biyolojisi ile ilgili verileri elde etmek için ilk önce erkek ve dişilerin vücut ağırlıkları tartılmış, sonrada gonadları çıkarılarak 0,0001 g duyarlı terazide ağırlıkları alınmıştır. Wenner (1989)'in önerdiği skala kullanılarak makroskobik ve mikroskobik gözlemlerle gonad gelişim aşamaları saptanmıştır. Vücut ve gonad ağırlık değerlerinden Gonadosomatik İndeks hesaplanarak, üreme zamanı belirlenmeye çalışılmıştır. GSI değeri hesaplamalarında aşağıda verilen eşitlikten yararlanılmıştır (Wootton,1990).

$$GSI=(\text{Gonad Ağırlığı}/\text{Vücut Ağırlığı}) \times 100$$

Araştırmada yumurtlama dönemi, en küçük yumurtlama boyu, yumurta verimliliği (Fekondite), yumurta çapı ve bu değerlerin karapas boyu ve genişliği ile olan ilişkileri de belirlenmiştir. Yumurta verimliliği (Fekondite) hesaplamalarında ilk önce dişi abdomeninden toplam yumurta kütlesi etrafındaki pleopod kalıntıları temizlenerek, kurutulmadan direkt toplam ağırlığı tartılmıştır. Daha sonra 0,0001 g duyarlı terazide 1-10 mg' lik yumurta kütlesinin farklı bölgelerinden alt örnekler alınmıştır. Alınan alt örnekler, üzerine yumurtaların dağılması için %30'luk gliserin damlatılarak tek yönlü çizgili lam üzerine yayılmıştır. Daha sonra lamın bir kenarından başlanarak tüm lam üzerindeki yumurtalar sayılmıştır. Ayrıca alt örneklerde mikrometrik öküler ile ortalama 10-20 adet yumurtanın çapları ölçülmüştür. Her bir birey için ortalama toplam yumurta sayısı aşağıda verilen denklemden yararlanılarak bulunmuştur (Prager ve ark., 1990; Jones ve ark., 1990)

$$\text{Toplam Yumurta sayısı}=(\text{Total Yumurta Ağırlığı} \times \text{Alt Örnek Yumurta Sayısı})/\text{Alt Örnek Ağırlığı}$$

Populasyonda erkek ve dişi oranı belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, dişilerde sperme kesesinden ,erkeklerde ise Vas deferantia' dan ezme preparatları yapılarak spermatofor oluşumu ve varlığı da araştırılmıştır (Paul ve Haefner,1985 b;1990; Wenner, 1989).

Beslenme kapasitesi ile beslenme düzeyi hakkında bilgi veren kondisyon faktörünün hesaplanmasında

$$K=W/L^3 \times 100$$

denklemini kullanılmıştır (Lagler,1970). Denklemden balıklar için kullanılan boy değeri olan L yerine ,yengeçlerde uzun karapas genişliği (UKG) kullanılmıştır.

Biyokütle hesaplamaların "Alan Tarama" metodu ile yapılmıştır. Toplam alanın biyokütlesinin hesaplanmasında, aşağıda verilen alt alanlara ayrılmış biyokütle tahmin eşitliğinden yararlanılmıştır (Avşar, 1998).

$$B = \sum B_i = \sum cwi / ai \cdot qi \cdot Ai$$

B: Toplam alanın biyokütlesi (kg)

B_i : i' nci tabakanın biyokütlesi(kg)

cwi : i'inci alt tabakanın ortalama biyokütlesi

ai : i' inci alt tabakada taranan alan (m^2)

qi : i' inci alt tabakada kullanılan trol ağının yakalayabilirlik katsayısı

A_i : i' inci alt tabakanın alanı (m^2)




Yengeçlerden alınan mide örnekleri %4'lük formaldehit içerisinde 200 ml' lik şişelerde saklanmıştır. Daha sonra ağırlık metodu ile mide içeriği analizi yapılmıştır. Midelerin total ağırlıkları alınarak ilk aşamada makroskobik gözlemlerle oluşturduğumuz skala ile boşluk derecesi belirlenmiştir. Daha sonra mideler açılarak içerikleri petri kaplarına alınmış ve 0,0001 g duyarlı terazide tartılmış, Stereo Mikroskopta incelenerek içindeki besin grupları tanımlanmıştır. Besin gruplarının tanımlanmasında Rield (1983), Ruppert ve Barnes(1994), Geldiay ve Kocataş(1988), Hayward, Nelson-Smith ve Shields (1996), Dance (1996), Özel (1996), 'den yararlanılmıştır. Belirlenen her besin grubu, kağıt peçeteler üzerinde bırakılarak fazla suları alınmış ve tartılmıştır. Besin gruplarının ağırlık yüzdeleri, baskınlıkları, boş mide yüzdeleri, nutrient yüzdesi hesaplanmıştır (Holden ve Rcitt, 1974; Bagenal, 1978; Hyslop, 1980).

Et kompozisyonunu belirlemek amacıyla her mevsim 20 adet (10 dişi, 10 erkek) birey kullanılmıştır. Yengeç bireylerin toplam ağırlığı 0,01 g duyarlı terazide alınmıştır. Daha sonra göğüs ve kısıkaç etlerinde (şekil 6,7) Kjeldal (Matissek, Schnepel ve Steiner, 1989) yöntemine göre Ham protein, Bligh ve Dyer (1959)'e göre de Lipit analizleri yapılmıştır. Kuru madde etüvde 104 °C de 4 saat ve ham kül fırında 550 °C'de 4 saat yakılarak tespit edilmiştir (Matissek, Schnepel ve Steiner, 1989). Et kompozisyonu için istatistiksel analizler SAS paket programı ile yapılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde Bek ve Efe (1988)'nin yöntemlerinden yararlanılmıştır.


Belirtilen dönem içerisinde Yumurtalık Koy' un da belirtilen istasyonlarda larval evrelerin dağılımının belirlenmesi amacıyla ayda bir , ilkbahar ve yaz aylarında ise her hafta veya iki hafta da bir, göz açıklığı 335 µm olan WP-2 plankton kepçesi (şekil 8) ile yatay ve dikey örnekleme yapılmıştır (Özel, 1992). Çekimlerde plankton kepçesinin üzerine flovmetre

takılmadığı için süzülen su miktarı saptanamamış, bu nedenle de m³ 'deki larva sayısı verilememiştir. Örnekler %4'lük hazırlanmış Formaldehit içeren cam kavanozlara konularak laboratuvara getirilmiştir. Larva tayini için üzerinde 2 ml alacak şekilde hazne oluşturulmuş kendinden çizgili lamlar kullanılmıştır. Her bir örnekleme için 4 tekerrürlü olarak tür tanısı yapılmıştır. Tür ve larval evrelerin tanımlanmasında Gurney (1942), Costlow ve Bookhout (1959) Bourdillon-Casanova (1960), Ingle (1989), Özel (1996)'dan yararlanılmıştır. Ayrıca çalışmada saptanan tüm larval evre için yüzde frekansları (Organizmanın kaydedildiği örnek sayısının , alınan toplam örnek sayısına olan yüzde oranı) bulunmuş ve %80-100 için "sürekli var", %60-79 için "büyük var ", % 40-59 için "çoğunlukla var", %20-39 için "ara sıra var", %1-19 için "nadiren var" olarak değerlendirilmiştir.


İstatistik analizler, SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır (Anonymus,1993)



Şekil 6. Mavi Yengeç' de Göğüs Eti



Şekil 7. Mavi Yengeç' de Kısaç Eti



Şekil 8. Araştırmada Kullanılan WP-2 Plankton Kepçesi Örneği (Özel, 1992)

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

3.1. SU ÖZELLİKLERİ

3.1.1. Sıcaklık (°C)


Yumurtalık Koy' unda yüzey suyu sıcaklığı kış ve ilkbaharın ilk ayında (Mart) düşük , ilkbahar ve yaz aylarında ise yüksek bulunmuştur. En düşük sıcaklık 0-10 m derinlikte Ocak ayında (15.2 °C), en yüksek değer ise yine aynı derinliklerde Ağustos ayında (31.5 °C) ölçülmüştür. Yumurtalık Koy' unda derinlik düzeylerine göre bulunan yıllık sıcaklık ortalamaları ve bunların standart sapma değerleri Çizelge 1, şekil 9 da gösterilmiştir. Yapılan varyans analizine göre derinlikler arasında ortalama yüzey suyu sıcaklıkları bakımından önemli fark bulunmamıştır (çizelge 2). İlgili şekilden de görüleceği gibi, Nisan ayından itibaren sıcaklık değerleri yükselmeye başlamış, yaz aylarında en yüksek değerlerine ulaşmış, Eylül ayından itibaren de düşüş göstermiştir. Yıllık ortalama yüzey suyu sıcaklığı 24.70 ± 4.42 °C olarak hesaplanmıştır. Temmuz/97 ayına ait derinlik düzeylerine göre 0-10 m derinlik tabakasında ortalama dip su sıcaklığı 29 ± 0.07 °C, 10-20 m de 28.15 ± 0.21 °C, 20-50 m derinlik tabakasında ise 28.50 ± 0.14 °C olarak hesaplanmıştır.

Çizelge 1. Yumurtalık Koy' unda Derinliklere Göre (m) Yıllık Ortalama Yüzey Su Sıcaklıkları (°C)

Derinlik (m)	Sıcaklık (°C)
0-10	24.14 ± 5.31 (15. 2-31.5)
10-20	24.38 ± 4.61 (16. 9-30.7)
20-50	25.57 ± 3.58 (17. 50-30.6)

Çizelge 2. Sıcaklık İçin Derinliğe Ait Varyans Analizi

Varyasyon Kaynağı	Serbestlik Derecesi	Kareler Ortalaması	F
Derinlikler	2	0.2359	0.0098
Hata	24	24.1183	-



Şekil 9. Yumurtalık Koy'unda Aylara Göre Ortalama Yüzeysel Su Sıcaklıkları (°C)

3.1.2. Tuzluluk (‰)


Tuzluluk sonbahar ve kış aylarında düşük, yaz aylarında ise yüksek değerlerde ölçülmüştür. Derinlik düzeylerine göre bulunan yıllık ortalama tuzluluk değerleri Çizelge 3, şekil 10 da gösterilmiştir. Yapılan varyans analizine göre derinliğe göre tuzluluk değerleri arasında fark bulunmamıştır (çizelge 4). İlkbahar aylarında tuzluluk ölçümleri alınamamıştır. Bu durumda göz önünde bulundurulduğunda düşük tuzluluk ölçümleri Ocak, Eylül ve Ekim aylarında alınmış, en düşük değer Ekim ayında ‰27.00 olarak ölçülmüştür. En yüksek tuzluluk ise yaz aylarında özellikle Ağustos ayında (‰38.77) ölçülmüştür. Yumurtalık Koy' u için yıllık ortalama yüzeysel suyu tuzluluğu ise 32.67 ± 5.39 olarak hesaplanmıştır. Temmuz/97 de derinlik düzeylerine göre ortalama dip suyu tuzluluk değerleri 0-10 m $\%38.35 \pm 0.64$, 10-20 m de $\%38.40$, 20-50 m de ise $\%38.35 \pm 0.07$ olarak bulunmuştur.

Çizelge 3. Yumurtalık Koy'unda Derinliklere Göre (m) Yıllık Ortalama Tuzluluk Değerleri (‰)

Derinlik (m)	Tuzluluk (‰)
0-10	$32.99 \pm 5.50 (27.30-38.77)$
10-20	$32.90 \pm 6.41 (27.30-38.50)$
20-50	$31.70 \pm 6.16 (27.00-38.50)$

Çizelge 4. Tuzluluk İçin Derinliğe Ait Varyans Analizi

Varyasyon Kaynağı	Serbestlik derecesi	Kareler Ortalaması	F
Derinlikler	3	0.7810	0.4244
Hata	10	0.7657	



91

Şekil 10. Yumurtalık Koy' unda Aylara Göre Ortalama Tuzluluk Değeri (‰)

3.2. BÜYÜME VE MORFOMETRİK ÖZELLİKLER

3.2.1. Büyüme

15 Eylül 1996 ve 15 Mayıs 1998 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmada örneklemeler İskenderun Körfezi'nin Yumurtalık Koy' undaki 0-10; 10-20; 20-50 m derinlik düzeylerindeki istasyonlardan aylık dönemlerle, Karataş kıyıları, Akyatan, Hurmaboğazı ve Silifke dalyanlarında belirli aralıklarla yapılmıştır. Aşağıda çizelge 5 de aylık incelenen birey sayısı, cinsiyet ve erginlik oranları verilmiştir.

Çizelge 5. İskenderun Körfezi'nde 1996-1998 Yıllarını Kapsayan Örneklemelerde Aylık İncelenen Birey Sayısı, Olgunluk ve Cinsiyet Oranları (%)

Ay	Erkek			Dişi				Toplam Yengeç
	Juvenil %	Ergin %	Total %	Juvenil %	Ergin %	Yumurtalı %	Total %	
Temmuz/96	---	10.7	10.7	---	65.0	24.3	89.3	103
Eylül	19.5	17.2	36.7	4.7	32.0	26.6	63.3	128
Ekim	---	25.0	25.0	---	70.0	5.0	75.0	20
Kasım	---	38.5	38.5	7.7	53.8	---	61.5	39
Aralık	---	45.7	45.7	---	54.3	---	54.3	35
Şubat/97	---	79.3	79.3	---	20.7	---	20.7	29
Mart	---	36.4	36.4	---	36.4	27.3	63.7	44
Mayıs	1.9	70.2	72.1	3.8	20.2	3.8	27.8	104
Haziran	---	15.7	15.7	3.4	56.2	24.7	84.3	178
Temmuz	1.7	20.7	22.4	16.5	34.7	26.4	77.6	121
Ağustos	3.3	10.7	14.0	14.8	42.6	28.7	86.1	122
Eylül	---	16.9	16.9	---	33.7	49.4	83.1	83
Ekim	---	93.8	93.8	---	6.3	---	6.3	16
Kasım	---	24.5	24.5	---	75.5	---	75.5	53
Aralık	---	---	---	---	77.8	22.2	100.0	9
Ocak/98	---	25.5	25.5	---	54.5	20.0	74.5	55
Şubat	---	31.0	31.0	---	67.2	1.7	68.9	58
Mart	---	6.7	6.7	---	62.2	31.1	93.3	45
Nisan	---	2.3	2.3	---	84.1	13.6	97.7	44
Mayıs	15.9	5.8	21.7	2.9	44.9	29.0	76.8	69
Total	3.2	24.3	27.5	4.5	47.2	20.8	72.5	1355

Mavi yengeç bireylerinde alınan biyometrik ölçümlerle ilgili temel istatistiksel değerler çizelge 6'da, sağ ve sol kısıkaçlar ve abdomen segmentleri ile ilgili istatistiksel değerler ise çizelge 7'de verilmiştir.

Çizelge 6. Mavi Yengeç Bireylerinde Alınan Biyometrik Ölçümlerle İlgili Ortalama Değerler

Ergin	Cinsiyet (n)	Ağırlık(w)	Kısa Karapas Genişliği(cm)	Uzun Karapas Genişliği(cm)	Karapas Uzunluğu (cm)	Vücut Derinliği (cm)
Ergin	Dişi (587)	106.58±40.97 (5.1-283.80)	10.45±2.11 (2.00-17.00)	12.69±2.33 (2.00-18.10)	5.59±0.85 (1.90-7.60)	3.26±0.49 (1.00-4.40)
	Erkek (295)	174.33±78.80 (5.2-407.50)	11.06±2.13 (3.30-15.80)	12.74±2.77 (3.70-18.60)	6.19±1.18 (2.00-11.80)	3.24±0.61 (1.10-4.60)
	Yumurtalı Dişi (264)	126.14±53.36 (6.00-317.00)	10.15±1.63 (4.00-16.00)	12.65±2.10 (4.90-19.00)	5.52±0.76 (2.40-7.20)	3.28±0.44 (1.20-4.80)
	Dişi (53)	35.54±27.02 (5.50-124.20)	6.53±1.45 (3.70-10.20)	7.40±1.78 (4.50-12.30)	3.66±0.82 (2.10-5.80)	2.17±0.49 (1.20-3.30)
Juvenil	Erkek (19)	10.77±5.48 (3.40-19.30)	4.87±1.52 (3.00-8.20)	5.41±1.78 (3.20-9.50)	2.77±0.83 (1.70-4.60)	1.58±0.46 (1.00-2.60)
	Toplam (1218)	123.32±65.65 (3.40-407.00)	10.18±2.25 (2.00-17.00)	12.22±2.83 (1.30-19.00)	5.58±1.11 (1.70-11.80)	3.25±0.63 (1.00-4.80)

Çizelge 7. Kısaçlar ve Abdomen Segmentleri İle İlgili Ortalama Değerler


Cinsiyet	Sağ Kısaç (Büyük)			Sol Kısaç (Küçük)			Abdomen Genişliği		
	Uzunluğu	Genişliği	Derinliği	Uzunluğu	Genişliği	Derinliği	4 segment	6 segment	
Dişi	5.7±1.0 (1.6-8.7)	1.5±0.3 (0.4-4.2)	3.4±0.6 (0.9-6.3)	5.6±1.0 (1.6-8.3)	1.5±0.2 (0.4-2.4)	3.2±0.5 (0.9-4.8)	4.2±0.6 (1.2-6.0)	3.7±0.7 (0.4-7.0)	
Yumurta lı Dişi	5.7±0.9 (2.6-8.2)	1.62±0.4 (0.7-6.7)	3.3±0.5 (1.5-4.9)	5.7±0.9 (2.5-7.8)	1.5±0.2 (0.6-2.0)	3.2±0.5 (1.5-4.3)	4.2±0.5 (1.9-5.7)	3.6±0.5 (1.5-4.9)	
Erkek	7.7±1.8 (1.9-11.0)	2.0±0.4 (0.5-3.1)	4.5±1.0 (1.2-7.2)	7.6±1.8 (2.0-12.5)	1.9±0.4 (0.5-3.0)	4.3±1.0 (1.2-7.0)			3.0±0.6 (1.1-4.1)
Juvenil	3.5±1.0 (1.7-6.2)	0.9±0.2 (0.5-1.7)	2.1±0.6 (1.1-3.6)	3.4±1.0 (1.7-6.2)	0.9±0.2 (0.4-1.6)	1.9±0.5 (1.0-3.4)			
Toplam	6.1±1.6 (1.6-11.0)	1.6±0.4 (0.4-6.7)	3.6±0.9 (0.9-7.2)	6.0±1.6 (1.6-12.5)	1.5±0.4 (0.4-3.0)	3.4±0.9 (0.9-7.0)	4.1±0.7 (1.2-6.0)	3.4±1.0 (0.4-7.0)	3.1±0.7 (1.0-4.7)

Çizelge 5' de verildiği gibi juvenil bireylere sonbahar (Eylül, Kasım), ilkbahar sonu (Mayıs) ve yaz aylarında rastlanılmıştır. Özellikle juvenil erkekler Eylül/96 (%19.5), Mayıs/98 (%15.9), dişiler ise Temmuz/97 (%16.5), Ağustos (%14.8) aylarında en yüksek oranda bulunmuşlardır. Juvenillerde erkeklerin 3.20-9.50 cm, dişilerin 4.20-12.30 cm karapas genişlik (UKG) sınırlarında dağıldıkları belirlenmiştir. Ortalama karapas genişliği ise erkeklerde 5.41 ± 1.78 cm, dişilerde 7.40 ± 1.78 cm ölçülmüştür. Juvenillerin toplamında karapas genişlik sınırları 3.20-12.30 cm olup, ortalama karapas genişliği 7.18 ± 1.95 cm olarak hesaplanmıştır (Çizelge 6). Juvenil bireylerin %70.7 gibi büyük bir bölümü Yumurtalık Koy'unun bataklık olarak adlandırılan *Zostera* çayırları ile kaplı olan bölgeden elde edilmiştir. Bunu %8.6 ile çamurlu, killi Kokar burnu'nun 2 mil içerisinde olan bölge, %6.9 ile silt-kumlu dip yapılı kokar burnu, %5.2 ile çamurlu-siltli geçit adlı bölge ve en son %1.7 ile Arap boğazından elde edilmiştir. Bu bölgelere göre ortalama karapas genişlikleri; Bataklık; 6.70 ± 1.76 (3.20-9.70), Kokar Burnu; 9.10 ± 1.62 (6.90-10.80), Kokar burnu içi; 5.54 ± 1.38 (4.20-7.40); Geçit; 7.07 ± 2.05 (3.20-12.30) cm olarak bulunmuştur. Yapılan varyans analizine göre bu belirtilen örnekleme alanlarından Kokar Burnu ile Bataklık ve Kokar Burnu içindeki bölgede karapas genişlikleri arasında fark önemli bulunmuştur ($F=5.61$ $df_1=6$, $df_2=51$ $P<0.05$). Yukarıda verilen değerlerden de anlaşılacağı gibi en büyük juvenil bireyler Kokar Burnu istasyonunda bulunmuştur.


Uzun karapas genişliği 3.70-18.60 cm sınırları arasında olan toplam 295 ergin erkek birey örnekleştirilmiştir. Ergin erkek bireylerde ortalama karapas genişliği 12.74 ± 2.77 cm olarak hesaplanmıştır (çizelge 6). Ergin erkek bireyler, Ekim/97 de %93.8 gibi büyük bir oranda elde edilmiştir. Bunu sırasıyla Şubat/97 (%79.3) ve Mayıs/97 (%70.2) ayları izlemektedir. Ergin dişi bireyler ise en yoğun olarak Nisan/98 (%84.1) ayında elde edilmiş, bunu Aralık/97 (%77.8) ile Kasım/97 (%75.5) ayları izlemiştir (çizelge 5). Böylece ergin dişiler ve erkekler

araziden özellikle kış, sonbahar ve ilkbahar aylarında yoğun olarak örneklenmişlerdir (Çizelge 5, şekil 11). Ergin dişilerin karapas genişliği 2.00-18.10 cm sınırlarında, ortalama 12.69 ± 2.33 cm olarak belirlenmiştir (çizelge 6). Yumurtalı dişiler ise sırasıyla en yoğun Eylül/97 (%49.4), Mart/98 (%31.1), Mayıs/98 (%29.0) aylarında örneklenmişlerdir. Çizelge 5'in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, araziden en yoğun olarak yumurtalı dişiler Mart ayından başlayarak Eylül ayına kadar ki dönemde elde edilmiştir. Yumurtalı dişilerde ise karapas genişliği 4.90-19.00 cm sınırları arasında, ortalama 12.65 ± 2.10 cm olarak hesaplanmıştır (Çizelge 6).

Aylara göre örneklenen ergin erkek ve dişi ile juvenil bireylerin bulunma çoklukları ayrıca şekil 11 ve 12'de gösterilmiştir.




Şekil 4.11. Mavi Yengeç Populasyonunda Aylara Göre Ergin Dişi-Erkek Sayıları (n)



Şekil 4.12. Mavi Yengeç Populasyonunda Aylara Göre Juvenil Dişi-Erkek Birey Sayısı (n).

Şekil 11'e göre örnekleme yapılan bütün aylarda dişi bireyler erkeklere göre daha fazla elde edilmiştir. Üremenin gerçekleştiği ilkbahar ve yaz aylarında farklılık daha da belirginleşmektedir. Yapılan istatistiksel analizlerde ise bu farklılığın önemli olduğu saptanmıştır ($\chi^2 = 540$ $P < 0.05$). Juvenil bireyler araziden Kasım ayı ve yaz aylarında örneklenmişlerdir. Erginlerde olduğu gibi juvenillerde de dişi bireyin sayısının erkeklere göre fazla olduğu görülmektedir (Şekil 12).


İncelenen populasyondaki cinsiyet ile juvenil ve ergin birey oranları şekil 4.13 de gösterilmiştir.




Şekil 13. Mavi Yengeç Populasyonunun da Cinsiyet, Juvenil ve Ergin Birey Oranları

Şekil 13 de görüldüğü gibi örneklenen populasyonda %47.5 ergin, %21.3 yumurtalı olmak üzere toplam %68.8 ile dişilerin hakim olduğu ve bunu %23.9 erkek bireylerin izlediği belirlenmiştir.

Dişi, yumurtalı dişi, erkek ve juvenil bireylerde karapas genişlik ve uzunluk yüzde oranları şekil 14 ve 15 de gösterildiği gibi saptanmıştır.



Şekil 14. Dişi, Erkek, Yumurtalı Dişi ve Juvenil Bireylerde Karapas Genişliği Yüzde Oranları



Şekil 15. Dişi, Erkek, Yumurtalı Dişi ve Juvenil Bireylerde Yüzde Karapaks Uzunluğu Oranları

Birbirini izleyen aylardaki dişi, erkek ve juvenil bireylerin karapas genişlik oranları arasında farklılığın önemli olup olmadığı % 5 önem düzeyinde Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz edilmiştir. Sonuçta dişilerde Mart-Nisan (K-S-Z=1.817 P<0.05), Mayıs-Haziran (K-S-Z=2.153 P<0.05), Haziran-Temmuz (K-S-Z=1.735 P<0.05) ve Kasım-Aralık (K-S-Z=1.396 P<0.05) da ki ortalama karapas genişlikleri arasındaki fark önemli bulunmuştur. Buna göre büyümenin en yüksek ilkbahar ve yaz mevsimi süresince gerçekleştiği söylenebilir. Erkeklerde Eylül-Ekim (K-S-Z=1.565 P<0.05), Ekim-Kasım (K-S-Z=1.396 P<0.05), Temmuz-Ağustos (K-S-Z=1.378 P<0.05) arasında karapas genişlikleri farklı bulunmuş olup, erkeklerde büyüme sonbahar ve yaz ortasında daha hızlı olmuştur. Juveniller için ise karapas genişlik frekanslarında önemli farklılık Mayıs-Haziran (K-S-Z=1.443 P<0.05) da elde edilmiştir. Juvenil bireyler Mayıs' tan Ağustosta kadar araziden örneklenmiştir. Bu dönemler içinde en yüksek büyüme Mayıs-Haziran geçişinde görülmüştür. Yapılan varyans analizine göre karapas genişliği (UKG) bakımından cinsiyetler arasında farklar önemli bulunmuştur (F=10.98 P<0.05). Bu farklılık çok yönlü Duncan testi ile analiz edildiğinde erkek, dişi ve yumurtalı dişilerde farklılık önemli olmazken juvenillerin diğerlerinden farklı olduğu saptanmıştır (Şekil 14). Diğer morfometrik ölçümler dikkate alındığında, karapas uzunluğu (KU)'n da ki farklılığın juvenil ve erkek bireylerde önemli olduğu bulunmuştur (F=91.82 P<0.05) Ergin dişi ve yumurtalı dişiler arasındaki farklılık ise önemli bulunmamıştır (Şekil 15). Kısa karapas genişliği ve kısa kaç boyutları için de aynı sonuçlar elde edilmiştir. Bu durumda erkek ve dişi arasında boyutlar arasındaki farklılığın önemli olduğunu ve erkeklerin dişilere göre daha güçlü ve geniş yapılı olduklarını ileri sürülebilir (çizelge 6,7).

Arazi örneklemelerinde terminal kabuk değişim aşamasında olan yumuşak kabuklu bireyler, Mayıs/96 ayı içerisinde bataklık-vegetasyonlu kıyusal zonda ve Arap boğazı kısmında Mayıs/97' de yapılan ıgırıp çekimleriyle 15 adet olarak elde edilmiştir. Bunların büyük bir kısmının dişilerden oluştuğu belirlenmiştir. Bunun dışında Mart ve Eylül/97 de vegetasyonlu bataklık alanında da henüz kabuğu sertleşmemiş bireyler bulunmuştur. Ayrıca arazi çalışmalarında özellikle vegetasyonlu sığ bölgede ikili dediğimiz çiftleşen dişi-erkek bireyler Mart ayında gözlenmiştir. ıgırıp çekimleri ve arazi gözlemlerimiz sonucunda , Yumurtalık Koy' unun derinliği 0-3 m geçmeyen çamurlu-bataklık Arap boğazı ve bataklık bölgesi şeklinde adlandırılan alanlarında Mavi Yengeçlerin ilkbahar (Mart-Mayıs) ve Eylül aylarında çiftleştikleri ve dişilerin terminal kabuk değişimin gerçekleştiği belirlenmiştir.

3.2.2. Biyometri

Çizelge 8 de Bağımsız değişken (X) olarak karapas uzunluğu (KU) ile diğer morfometrik ölçümler arasında hesaplanan ilişki denklemleri, bunlarla ilgili basit korelasyon katsayıları ve büyüme biçimleri gösterilmiştir.

Çizelge 8. Mavi Yengeç' in Bağımsız Değişken (X) Olarak Alınan Karapas Uzunluğu ile Vücut Boyutları Arasındaki İlişki Denklemleri, Korelasyon Katsayıları (r) ve Büyüme Biçimi (b)

Y Değişkeni	Cinsiyet	Denklem	Korelasyon (r)	b(Büyüme biçimi)	
W (g)	Dişi	$\text{LnY}=0.12+2.64.\text{LnX}$	0.81*		
	Erkek	$\text{LnY}=-0.07+2.81.\text{LnX}$	0.83*		
	Juvenil	$\text{LnY}=-0.21+2.76.\text{LnX}$	0.89*		
	Toplam	$\text{LnY}=-0.20+2.85.\text{LnX}$	0.85*		
KKG (cm)	Dişi	$Y=-0.18+1.87.X$	0.91*	1.043	
	Erkek	$Y=0.84+1.64.X$	0.93*	1.003	+
	Juvenil	$Y=0.16+1.69.X$	0.91*	0.974	-
	Toplam	$Y=0.12+1.79.X$	0.94*	1.033	
UKG (cm)	Dişi	$Y=-0.20+2.35.X$	0.87*	1.075	+
	Erkek	$Y=1.15+2.06.X$	0.89*	1.062	+
	Juvenil	$Y=-0.10+2.02.X$	0.90*	1.009	
	Toplam	$Y=0.01+2.23.X$	0.89*	1.080	+
VD (cm)	Dişi	$Y=0.30+0.53.X$	0.91*	0.924	
	Erkek	$Y=0.46+0.49.X$	0.92*	0.925	
	Juvenil	$Y=0.18+0.53.X$	0.89*	0.926	-
	Toplam	$Y=0.29+0.52.X$	0.88*	0.945	
DAG4 (cm)	Dişi	$Y=0.20+0.72.X$	0.91*	1.052	+
	Juvenil	$Y=0.12+0.55.X$	0.94*	0.932	-
	Toplam	$Y=-0.29+0.80.X$	0.92*	1.180	
DAG6 (cm)	Dişi	$Y=-0.64+0.76.X$	0.92*	1.582	
	Juvenil	$Y=-0.45+0.38.X$	0.61*	1.263	+
	Toplam	$Y=-1.59+0.91.X$	0.91*	2.000	
EAG (cm)	Erkek	$Y=0.40+0.01.X$	0.82*	0.841	
	Juvenil	$Y=0.22+0.46.X$	0.99*	0.856	-
	Toplam	$Y=0.48+0.43.X$	0.88*	0.876	

*P<0.05

İlgili çizelgeden de anlaşılacağı gibi, karapas uzunluğu ile diğer vücut ölçüleri arasında doğrusal ilişki bulunurken, ağırlık ile arasında üssel bir ilişki bulunmuştur (Çizelge 8, şekil 16,17,18,19). Karapas uzunluğu ile ağırlık dışındaki ölçümlerdeki değişim yönü aynı

olmuştur. Diğer bir deyişle karapas uzunluğundaki artışa veya azalışa bağlı olarak vücut ölçülerinde de artış veya azalış söz konusudur. İlişkilerin korelasyon değerlerinin tümünde 0.5 den oldukça yüksek elde edilmiştir (çizelge 8). Bu da karapas uzunluğu ile diğer metrik özellikler arasında güven duyulur yüksek bir ilişki olduğunu göstermektedir. Çizelge 4.8 deki verilere göre, dişilerde Kısa Karapas Genişliği (KKG), Uzun Karapas Genişliği (UKG), Abdomen Genişliği 4 ve 6. Segment (DAG4 ve DAG6) pozitif allometri gösterirken; Vücut Derinliği (VD) negatif allometri göstermektedir. Erkek bireylerde sadece UKG ve KKG pozitif allometri gösterirken; VD, AG negatif allometri göstermektedir. Bu da bu kısımların karapas uzunluğuna oranla daha yavaş büyüdüğünü belirtmektedir. Dişi ve erkek karışık juvenillerde ise UKG pozitif ;KKG, VD negatif; dişilerde DAG4 negatif, DAG6 pozitif allometri gösterirken, erkeklerde AG negatif allometri büyüme göstermektedir. Toplam populasyonu incelediğimizde ise Kısa Karapas Genişliği, Uzun Karapas Genişliği, Dişilerde 4. ve 6. Segment Genişliğinde pozitif ; Vücut Derinliği ve erkek abdomen genişliğinde negatif allometri saptanmıştır. Bu durumda, dişilerde karapas genişliği ve abdomen genişliğindeki artışlar karapas uzunluğuna göre daha yüksek oranda olurken; vücut derinliği ve erkeklerde abdomen artışının karapas uzunluk artışına oranla daha yavaş gerçekleştiği söylenebilir (Çizelge 8).

Çizelge 9 , 10 ve 11 de karapas uzunluğu bağımsız değişken (X) alınarak diğer vücut ölçümleri arasındaki regresyon katsayılarına ilişkin analiz sonuçları ve varyans analiz tablosu verilmiştir. İncelendiğinde regresyon katsayıları arasındaki farkların önemli olduğu görülmektedir ($P < 0.05$).

Şekil 16 dan başlayarak şekil 19'a kadar, bağımsız değişken karapas uzunluğu (X) alınarak diğer biyometrik ve morfometrik ölçümler arasında oluşturulan noktalama grafikleri verilmiştir.

Çizelge 9. Karapas Uzunluğu (KU) Bağımsız Değişken (X) Alınarak Vücut Boyutları İçin Saptanan Regresyon Katsayılarına Ait Varyans Analizleri

Ydeğişkeni	Cinsiyet	Varyans Kaynağı	Serbestlik Derecesi	Kareler Ortalaması	F
W (g)	Dişi	Regresyon	1	150.494	2284.12*
		Hata	727	0.06	
	Erkek	Regresyon	1	100.529	2032.02*
		Hata	270	0.049	
	Juvenil	Regresyon	1	40.927	751.043*
		Hata	62	0.054	
	Toplam	Regresyon	1	476.661	7492.08*
		Hata	1063	0.06	
KKG (cm)	Dişi	Regresyon	1	1656.26	3347.25*
		Hata	618	0.49	
	Erkek	Regresyon	1	1021.00	1703.41*
		Hata	260	0.59	
	Juvenil	Regresyon	1	192	468.59*
		Hata	86	0.41	
	Toplam	Regresyon	1	4411.96	7906.93*
		Hata	968	0.55	
UKG (cm)	Dişi	Regresyon	1	2571.78	2119.17*
		Hata	660	1.21	
	Erkek	Regresyon	1	1500.23	1021.29*
		Hata	240	1.46	
	Juvenil	Regresyon	1	262.15	382.97*
		Hata	83	0.68	
	Toplam	Regresyon	1	6313.77	3919.20*
		Hata	987	1.61	
VD (cm)	Dişi	Regresyon	1	149.92	3941.17*
		Hata	788	0.03	
	Erkek	Regresyon	1	95.67	1577.87*
		Hata	283	0.06	
	Juvenil	Regresyon	1	18.76	324.81*
		Hata	85	0.05	
	Toplam	Regresyon	1	404.24	8609.72*
		Hata	1160	0.04	

*P<0.05

Çizelge10. Karapas Uzunluğu (KU) Bağımsız Değişken (X) Alınarak Abdominal Segmentler İçin Yapılan Regresyon Katsayılarına Ait Varyans Analizleri



Ydeğişkeni	Cinsiyet	Varyans Kaynağı	Serbestlik Derecesi	Kareler Ortalaması	F
DAG4 (cm)	Dişi	Regresyon	1	257.716	3909.13*
		Hata	783	0.06	
	Juvenil	Regresyon	1	9.590	445.243*
		Hata	49	0.021	
	Toplam	Regresyon	1	453.09	5216.04*
		Hata	835	0.08	
DAG6 (cm)	Dişi	Regresyon	1	257.23	3408.38*
		Hata	604	0.07	
	Juvenil	Regresyon	1	4.602	29.6551*
		Hata	49	0.15	
	Toplam	Regresyon	1	551.87	3200.93*
		Hata	656	0.17	
EAG (cm)	Erkek	Regresyon	1	65.625	601.87*
		Hata	280	0.10	
	Juvenil	Regresyon	1	2.513	785.454*
		Hata	16	0.003	
	Toplam	Regresyon	1	115.93	1095.85*
		Hata	298	0.10	

*P<0.05



Çizelge 11. Karapas Uzunluğu (KU) İle Vücut Boyutlarıyla İlgili Regresyon Katsayılarına Ait Analiz Sonuçları

Özellikler	Cinsiyet	β	S.H β	t-test
W (g)	Dişi	2.64	0. 05	47.79*
	Erkek	2.81	0. 06	45.07*
	Juvenil	2.76	0. 10	27.40*
	Toplam	2.85	0. 03	86.55*
KKG (cm)	Dişi	1.87	0. 03	57.85*
	Erkek	1.64	0. 03	41.27*
	Juvenil	1.69	0. 07	21.64*
	Toplam	1.79	0. 02	88.92*
UKG (cm)	Dişi	2.35	0. 05	46.03*
	Erkek	2.06	0. 06	31.95*
	Juvenil	2.02	0. 10	19.57*
	Toplam	2.23	0. 03	62.60*
VD (cm)	Dişi	0.53	0.008	62.77*
	Erkek	0.49	0. 01	39.72*
	Juvenil	0.53	0. 02	18.02*
	Toplam	0.52	0.005	92.78*
DAG4 (cm)	Dişi	0.72	0. 01	62.52*
	Juvenil	0.55	0. 02	21.10*
	Toplam	0.80	0. 01	72.22*
DAG6 (cm)	Dişi	0.76	0. 01	58.38*
	Juvenil	0.38	0. 07	5.44*
	Toplam	0.91	0. 01	56.57*
EAG (cm)	Erkek	0.40	0. 01	24.53*
	Juvenil	0.46	0. 01	28.02*
	Toplam	0.43	0. 01	33.10*



*P<0.05




Şekil 16. Karapas Uzunluğu ile Ağırlık ve Kısa Karapas Genişliği (cm) Arasındaki İlişki Grafikleri



řekil 17. Karapas Uzunluđu ile Uzun Karapas Geniřliđi ve Vücut Derinliđi (cm) Arasındaki İliřki Grafikleri



Şekil 18. Karapas Uzunluğu ile Dişlerde 4. Ve 6. Abdomen Genişliği (cm) Arasındaki İlişki Grafikleri



Şekil 19. Karapas Uzunluğu ile Erkek Abdomen Genişliği (cm) Arasındaki İlişki Grafiği

Karapas uzunluğu bağımsız değişken alınarak kısıkaç boyutları arasında hesaplanan ilişkiler, korelasyon ve büyüme biçimleri çizelge 12 de verilmiştir.

Çizelge 12. Mavi Yengeç de Karapas Uzunluğu olan Bağımsız Değişken (X) ile Kısaç Boyutları Arasındaki Regresyon Denklemleri , Korelasyon Katsayısı (r) ve Büyüme Biçimi (b)

Y Değişkeni	Cinsiyet	Denklem	Korelasyon (r)	b (Büyüme Biçimi)	
Büyük Kısaç PU (cm)	Dişi	$Y = -0.05 + 1.06.X$	0.90	1.048	+
	Erkek	$Y = -2.00 + 1.42.X$	0.95	1.262	+
	Juvenil	$Y = -0.06 + 1.03.X$	0.93	1.009	+
	Toplam	$Y = -1.47 + 1.38.X$	0.91	1.174	
PD (cm)	Dişi	$Y = 0.18 + 0.59.X$	0.80	0.998	-
	Erkek	$Y = -0.52 + 0.81.X$	0.89	1.189	+
	Juvenil	$Y = 0.02 + 0.60.X$	0.93	0.999	-
	Toplam	$Y = -0.58 + 0.76.X$	0.87	1.125	+
PG (cm)	Dişi	$Y = 0.13 + 0.26.X$	0.56	0.972	-
	Erkek	$Y = -0.15 + 0.35.X$	0.88	1.168	+
	Juvenil	$Y = 0.009 + 0.27.X$	0.95	0.997	-
	Toplam	$Y = -0.15 + 0.33.X$	0.78	1.094	+
Küçük Kısaç PU (cm)	Dişi	$Y = -0.09 + 1.05.X$	0.88	1.036	
	Erkek	$Y = -0.93 + 1.39.X$	0.89	1.207	+
	Juvenil	$Y = -0.23 + 1.08.X$	0.98	1.059	+
	Toplam	$Y = -1.29 + 1.32.X$	0.88	1.162	
PD (cm)	Dişi	$Y = 0.10 + 0.57.X$	0.84	0.977	-
	Erkek	$Y = -0.41 + 0.76.X$	0.88	1.165	+
	Juvenil	$Y = -0.02 + 0.59.X$	0.97	1.016	+
	Toplam	$Y = -0.59 + 0.73.X$	0.88	1.119	
PG (cm)	Dişi	$Y = 0.13 + 0.25.X$	0.80	0.977	-
	Erkek	$Y = -0.07 + 0.32.X$	0.88	1.925	+
	Juvenil	$Y = -0.01 + 0.274.X$	0.96	1.036	+
	Toplam	$Y = -0.14 + 0.31.X$	0.88	1.088	

*P<0.05

Çizelge 12'i incelendiğinde, karapas uzunluğu ile büyük ve küçük kısaç boyutları arasında hesaplanan korelasyon katsayılarının 0.5 den oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu da boyutlar arasındaki ilişkinin oldukça yüksek ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Yine ilgili çizelgeden anlaşılacağı gibi, karapas uzunluğu ile kısaç boyutları arasındaki ilişkiler doğrusal olarak belirlenmiştir (çizelge 12, şekil 20, 21, 22). Büyüme biçimine bakıldığında ise; Dişilerde, Karapas Uzunluğu ile büyük ve küçük kısaçların uzunlukları (Propodal Uzunluk (PU)) arasında pozitif, diğerlerinde Propodal Derinlik (PD), Propodal Genişlik (PG) de negatif allometri bulunmuştur. Erkeklerde büyük ve küçük kısaçların bütün boyutları ile karapas uzunluğu arasında pozitif allometri belirlenmiştir. Erkek ve dişi karışık juvenillerde ise büyük kıskaçın derinliği ve genişliğinde negatif allometri ; büyük ve küçük kıskaçın diğer bütün boyutlarında pozitif allometri hesaplanmıştır. Populasyonu genel olarak ele alındığında,

büyük ve küçük kısaç boyutlarının pozitif allometri gösterdiğini ve karapas uzunluğuna göre kısaç boyutlarındaki gelişmenin daha yüksek olduğu söylenebilir (çizelge 12).

Karapas uzunluğu ve kısaç boyutları arasında hesaplanan regresyon denklemlerine ait varyans analiz tablosu ve regresyon katsayılarına ait analiz sonuçları çizelge 13, 14 ve 15 de verilmiştir. Ayrıca bağımsız değişken (X) karapas uzunluğu alınarak dişi, yumurtalı dişi, erkek ve juvenil bireylerde sağ ve sol kısaç boyutları için oluşturulan grafikler şekil 20, 21, 22 'de verilmiştir.

Çizelge 13. Karapas Uzunluğu ile Büyük Kısaç (Sağ) Boyutları arasındaki İlişkilerin Regresyon Katsayılarına Ait Varyans Analiz Sonuçları

Ydeğişkeni	Cinsiyet	Varyans Kaynağı	Serbestlik Derecesi	Kareler Ortalaması	F
Büyük Kısaç PU (cm)	Dişi	Regresyon	1	483. 78	2819.79*
		Hata	613	0.171	
	Erkek	Regresyon	1	755.591	2740.07*
		Hata	244	0. 27	
	Juvenil	Regresyon	1	57.608	402.34*
		Hata	60	0. 14	
	Toplam	Regresyon	1	2202. 37	4958.77*
		Hata	921	0. 44	
PD (cm)	Dişi	Regresyon	1	148. 53	1181.74*
		Hata	623	0. 12	
	Erkek	Regresyon	1	222.681	967.080*
		Hata	247	0. 23	
	Juvenil	Regresyon	1	19. 61	390.40*
		Hata	60	0. 05	
	Toplam	Regresyon	1	701. 02	3805.60*
		Hata	916	0. 18	
PG (cm)	Dişi	Regresyon	1	22. 31	122.32*
		Hata	443	0.182	
	Erkek	Regresyon	1	41.298	918.42*
		Hata	245	0.044	
	Juvenil	Regresyon	1	4.208	647.66*
		Hata	60	0.006	
	Toplam	Regresyon	1	128. 11	898.54*
		Hata	196	0. 14	

*P<0.05

Çizelge 14. Karapas Uzunluğu ile Küçük Kıskaç (Sol) Boyutları Arasındaki İlişkilerin Regresyon Katsayılarına Ait Varyans Analiz Sonuçları

Ydeğişkeni	Cinsiyet	Varyans Kaynağı	Serbestlik Derecesi	Kareler Ortalaması	F	
KÜÇÜK KISKAÇ PU (cm)	Dişi	Regresyon	1	325. 45	2045.03*	
		Hata	416	0. 159		
	Erkek	Regresyon	1	559. 39	555.99*	
		Hata	234	1. 000		
	Juvenil	Regresyon	1	59. 86	1847.39*	
		Hata	54	0. 03		
	Toplam	Regresyon	1	1926.000	3004.27*	
		Hata	889	0. 64		
	PD (cm)	Dişi	Regresyon	1	94. 10	1387.04*
			Hata	416	0.060	
Erkek		Regresyon	1	171. 45	569.94*	
		Hata	237	0. 30		
Juvenil		Regresyon	1	17. 93	1156.63*	
		Hata	54	0. 01		
Toplam		Regresyon	1	583. 71	2840.23*	
		Hata	889	0. 20		
PG (cm)		Dişi	Regresyon	1	18. 74	813.99*
			Hata	416	0.020	
	Erkek	Regresyon	1	30. 36	563.54*	
		Hata	237	0. 05		
	Juvenil	Regresyon	1	3. 85	686.38*	
		Hata	54	0.005		
	Toplam	Regresyon	1	106. 67	2718.65*	
		Hata	889	0. 03		



*P<0.05

Çizelge 15. Karapas Uzunluğu İle Kısaç Boyutları Arasındaki İlişkilerin Regresyon Katsayılarına Ait Varyans Analiz Sonuçları



Özellikler	Cinsiyet	β	S.H β	t-test
Büyük Kısaç PU (cm)	Dişi	1.11	0.03	32.190*
	Erkek	1.42	0.04	33.026*
	Juvenil	1.03	0.51	20.059*
	Toplam	1.35	0.02	58.152*
PD (cm)	Dişi	0.59	0.06	35.270*
	Erkek	0.87	0.01	45.280*
	Juvenil	0.60	0.93	19.750*
	Toplam	0.77	0.01	61.690*
PG (cm)	Dişi	0.26	0.24	11.060*
	Erkek	0.35	0.01	30.300*
	Juvenil	0.27	0.01	25.449*
	Toplam	0.33	0.01	29.976*
Küçük Kısaç PU (cm)	Dişi	1.06	0.02	40.220*
	Erkek	1.26	0.05	23.570*
	Juvenil	1.08	0.25	42.981*
	Toplam	1.29	0.02	54.811*
PD (cm)	Dişi	0.57	0.01	37.240*
	Erkek	0.69	0.02	23.870*
	Juvenil	0.59	0.01	34.000*
	Toplam	0.71	0.01	53.294*
PG (cm)	Dişi	2.55	0.008	28.530*
	Erkek	0.29	0.01	23.730*
	Juvenil	0.27	0.01	26.190*
	Toplam	0.30	0.005	52.141*

*P<0.05



İlgili çizelgelerden de anlaşılacağı gibi, belirtilen boyutlar arasında saptanan ilişkilere ait regresyon katsayıları arasındaki farklar önemli bulunmuştur (P<0.05).



Şekil 20. Karapas Uzunluğu(cm) ile Büyük Kıskaç Propodal Uzunluğu ve Derinliği (cm) Arasındaki İlişki Grafikleri




Şekil 21. Karapas Uzunluğu(cm) ile Büyük ve Küçük Kıskaç Propodal Genişlik (cm) Arasındaki İlişki Grafikleri




Şekil 22. Karapas Uzunluğu (cm) ile Küçük Kısaç Propodal Uzunluğu (cm) ve Derinliği (cm) Arasındaki İlişki Grafikleri

Mavi Yengeçlerde morfometrik özelliklerden erkeklerde propodal kısaç boyutları , dişilerde ise 4. abdomen segment genişliği eşeyssel olgunluk ve seksüel dimorfizme ulaşma büyüklüğünün belirlenmesinde kullanılmaktadır. Dişiler için 4. Abdomen genişliği ve erkek bireylerde küçük kısaç propodal uzunluğu ile karapas uzunluğu arasında belirlenen (logaritmik ,Ln) ilişki grafiği şekil 23 ve şekil 24 de verilmiştir.



Şekil 23. Ln Dişi 4. Abdomen Genişliği (cm)-Ln Karapas Uzunluğu (cm)

Şekil 23 de görüldüğü gibi yaklaşık Ln 1.3-1.4 cm sınırları pre-pubertal (olgunlaşma öncesinin son iki evresi arasındaki geçiş) kabuk aşamasını, Ln 1.4 ile Ln 2.2-2.3 cm sınırları post pubert kabuk aşamasını , Ln 1.3-1.4 cm ile Ln 1.8 cm arasındaki kısım ise pubert kabuk aşamasını (olgunlaşma öncesinin son evresi ile ergin aşamaya geçiş) oluşturmaktadır. Bu durumda Mavi Yengeç dişi bireylerinde eşeyssel olgunluk, Ln 1.8 cm= 6.05 cm karapas uzunluğu (KU) 'na ulaştıktan sonra başlamaktadır. Arazi örneklemelelerinde ise ergin dişilerin ortalama karapas uzunluğu 5.59 ± 0.85 cm ölçülmüştür.



Şekil 24. Erkek Küçük Kısaç Ln Propodal Uzunluğu (cm) ve Ln Karapas Uzunluğu (cm) Arasındaki İlişki Grafiği

Şekil 24 incelendiğinde Ln 1.5 cm kadar regresyon doğrusunun eğimi yumuşak devam ederken Ln 1.5 cm'den sonra ise yüksek pozitif allometri göstermesinden dolayı eğimi belirgin olarak yükselmektedir. Bu durumda, erkek bireylerin seksüel olgunluğa Ln 1.5 cm = 4.48 cm karapas uzunluğundan sonra ulaştığı söylenebilir. Arazi örneklemelelerinde ise spermatoforum bulunduğu fonksiyonel üreme yeteneğine sahip en küçük bireyin karapas uzunluğu 4.70 cm olarak ölçülmüştür.

3.3. ÜREME BİYOLOJİSİ

3.3.1 Cinsiyet Oranı

1.5 yıl süreyle yapılan aylık örnekleme sonuçlarında toplam 1237 birey incelenmiştir. Cinsiyet ayrımı seksüel dimorfizm sayesinde kolaylıkla yapılabilmektedir. Aylara göre alınan örneklerde juvenil, dişi ve erkek adeti ile cinsiyet oranı (dişi:erkek) Çizelge 16 da verilmiştir.

Çizelge 16. Aylara Göre Mavi Yengeçlerde Cinsiyet Dağılımı ve Oranı

Ay	Juvenil (n)	Dişi (n)	Erkek (n)	Cinsiyet Oranı (D/E)
Temmuz/96	---	93	11	8.5:1
Eylül	17	71	18	3.9:1
Ekim	---	13	3	4.3:1
Kasım	3	21	15	1.4:1
Aralık	---	15	14	1.1:1
Şubat/97	---	6	23	0.26:1
Mart	---	8	3	2.7:1
Mayıs	---	21	64	0.3:1
Haziran	6	144	28	5.1:1
Temmuz	22	75	25	3.0:1
Ağustos	21	42	10	4.2:1
Eylül	---	68	15	4.6:1
Ekim	---	1	15	0.07:1
Kasım	1	40	13	3.1:1
Ocak/98	---	41	14	2.9:1
Şubat	---	39	18	2.2:1
Mart	---	42	3	14.0:1
Mayıs	14	58	4	14.5:1
Toplam	84	798	296	2.7:1

Çizelgeden de anlaşılacağı gibi, araştırma bölgesindeki Mavi Yengeç Populasyonunda Şubat ve Ekim ayları dışında, dişi bireyler erkeklere göre daha yoğun bulunmuştur (Çizelge 16). Ekim ayında ise erkek bireylerin oldukça yüksek (1:15; 0.07:1) oranda populasyonda yer aldığı görülmektedir. Bu durumun Şubat ayında trol örnekleme yapılamaması ve sözü edilen aylarda sadece dalyanlardan örnekleme yapılmasından kaynaklandığı sanılmaktadır. Çizelge 16 da görüldüğü gibi 96 yılı içindeki değişimde Temmuz ayında en yüksek olan dişi sayısı düzenli azalmaya başlayarak Kasım'a kadar sürmüştür. Kasım ve Aralık'ta ise iki cinsiyet grubu arasındaki varlık oranı hemen hemen istenilen 1:1 oranına yaklaşmıştır. Şubat/97 de erkeklerin baskın olduğu görülmektedir. Dişi sayısında tekrar artış ise Mart'tan başlayarak Eylül sonuna kadar sürmüştür. Bu dönem içerisinde Mayıs/97 de görülen erkek baskınlığının yine trol örnekleme yapılamamasından kaynaklandığı söylenebilir. Bu dişi:erkek oranında

örnekleme ayları arasında farklılık önemli olmuştur ($\chi^2 = 416$ $df=38$ $P<0.05$). Sonuçta bütün Populasyon için cinsiyet oranı $798:296 = 2.7:1$ olarak saptanmıştır.

3.3.2. Gonadların Makroskobik Tanımlanması

Erkek bireylerde gonad gelişimi Makroskobik olarak izlenememiştir. Dişilerde ise gonad gelişimde 4 evre belirlenmiştir.

1. **Olgunlaşmamış:** Loblar oldukça küçük, beyaz renkli, yumurtalar pre veya erken vitelluslu yapı göstermektedirler. Olgunlaşmamış olarak değerlendirilenlerin büyük bir çoğunluğunun juvenil bireylerden oluştuğu saptanmıştır. Bunların ortalama karapas uzunluğu 4.68 ± 1.30 cm, ortalama karapas genişliği 9.89 ± 3.37 cm olarak hesaplanmıştır.
2. **Olgunlaşmaya Başlamış:** Ovaryum pembe veya sarı renkli olup, vitellus gelişmeye devam etmektedir. Ergin dişilerin büyük kısmında bu tip gonad yapısı gözlenmiştir. Ortalama karapas uzunluğu 5.71 ± 0.77 cm ; ortalama karapas genişliği 12.97 ± 2.11 cm olarak bulunmuştur.
3. **Olgunlaşan:** Ovaryum portakal renkli, yumurtalar içerisinde yumurta sarısı belirgin olarak görülmektedir. Bu bireylerde ortalama karapas uzunluğu 5.79 ± 0.67 cm; ortalama karapas genişliği 13.26 ± 1.67 cm olarak saptanmıştır.
4. **Olgun:** Ovaryum koyu portakal renkli, vücut boşluğunun hemen hemen tamamını doldurmuştur. Ovaryumda büyük ve olgun yumurtalar bulunmaktadır. Yumurta içerisinde vitellus yoğun olarak dağılmıştır. Bu durumdaki bireylerde ortalama karapas uzunluğu 6.54 ± 0.70 cm; ortalama karapas genişliği ise 14.60 ± 1.66 cm olarak hesaplanmıştır. Yapılan varyans analizinde gonad gelişim evrelerine göre ortalama karapas genişlikleri arasındaki farklar ($F=70.469$ $df=488$ $P<0.05$) ile ortalama karapas uzunlukları arasındaki farklar ($F=74.27$ $df=638$ $P<0.05$) istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. %5 önem düzeyinde yapılan Duncan Çoklu Aralık testine göre ortalama karapas genişliği ve ortalama uzunluğunun bütün gonad gelişim evrelerinde birbirinden farklı oldukları bulunmuştur. Bu durumda gonad gelişimine koşut olarak karapas uzunluğu ve genişliğinin de arttığı söylenebilir.

Makroskobik tanımlamaya göre dişi gonadların yıllık gelişim döngüsü çizelge 4.17 de verilmiştir.

Çizelge 17. Dişi Bireylerde Makroskobik Tanımlanmaya Göre
Gonadların Yıllık Gelişim Döngüsü

Aylar	Ovaryum Gelişim Evreleri Yüzde Oranı
Eylül 96	I (33.9), II.(26.4), III.(24.5), IV.(15.0)
Ekim	I.(50.0), II.(8.3), III.(41.6)
Kasım	I.(63.6), II.(27.2), III.(9.0)
Aralık	I.(53.8), II.(23.0), III.(23.3)
Şubat 97	II.(60.0), III.(40.0)
Mart	II.(14.2), III.(42.8), IV.(42.8)
Mayıs	I.(12.5) II.(62.5), III.(12.5), IV.(12.5)
Haziran	I.(21.5), II.(41.1), III.(27.4), IV.(9.8)
Temmuz	I.(48.3) II.(33.3), III.(9.6), IV.(8.6)
Ağustos	I.(54.5), II.(30.9), III.(9.0), IV.(5.4)
Eylül	I.(20.6), II.(32.3), III.(25.4), IV.(22.0)
Ekim	I.(7.6), III.(15.3), IV.(76.9)
Kasım	I.(15.3), II.(69.2), III.(15.3)
Aralık	I.(16.6), II.(50.0), III.(33.3)
Ocak 98	I.(4.8), II.(48.7), III.(41.4), IV.(4.8)
Şubat	II.(63.8), III.(36.1)
Mart	I.(9.5), II.(16.6), III.(40.4), IV.(33.3)
Nisan	I.(16.2), II.(37.2), III.(39.5), IV.(6.9)
Mayıs	I.(36.9), II.(32.3), III.(26.1), IV.(4.61)

Çizelge 17 'de görüleceği gibi 1996 yılı için olgun bireylere Eylül ayı içinde rastlanılmıştır. 1997 yılın da ise ilkbahar ve yaz ayları ile Eylül ayında olgun bireyler örneklenmiştir. Nisan ayı içinde örnekleme yapılamamıştır. 1998 yılı örneklemelelerinde ise sadece Ocak ve ilkbahar ayları içinde olgun bireylere rastlanılmıştır. Bütün bu yılları içine aldığımızda olgun bireyler Ocak/98 dışında, Mart' tan başlayarak Eylül' e kadar ve hatta Ekim ayı içinde de görülmektedir. I. gelişim evredeki ovaryumlara sahip dişi bireyler, 1997 yılı içinde Şubat, Mart ve 1998'in Şubat ayında rastlanılmamıştır. Olgunlaşmaya başlamış ve olgunlaşan ovaryumlu bireyler ise bütün aylık örneklemelemlerde bulunmuştur. Sonbahar ve kış aylarında olgun ovaryumlara sahip bireyler görülmemekte, ilkbahar ve yaz aylarında ise olgun ovaryumlu dişilere rastlanılmaktadır. Yine Çizelge 17'de görüldüğü gibi olgun bireyler 1997 yılı içinde Mart ve Mayıs ta yüksek oranlarda bulunurken üreme dönemi ile birlikte gittikçe azalan yüzde ile varlıklarını sürdürmektedirler. Ancak Eylül ayı onu takip eden Ekim ayında tekrar yeni bir artışın olduğu görülmektedir. Ekim, Kasım ve Aralık ta yüksek yüzdelerde bulunan I. evredeki bireyler Mart ayına yaklaşıldıkça yerlerini II. ve III. evredeki olgunlaşmaya başlamış ve olgunlaşan bireylere bırakmıştır (Çizelge 17). Aylara göre gonad gelişim evrelerinin bulunma oranları arasında farklılık önemli bulunmuştur ($\chi^2 = 332$ df=54 P<0.05).



3.3.3. Gonadosomatik İndeks

Eylül 1996 ve Mayıs 1998 tarihleri arasında yapılan aylık örnekleme sonuçlarında erkek ve dişi Mavi Yengeç bireylerinde elde edilen gonadosomatik İndeks değerleri Çizelge 18 ve Şekil 25 de verilmiştir.

Çizelge 18. Erkek ve Dişi Mavi Yengeç'lerde Bireylerde Aylara Göre Gonadosomatik İndeks Değerleri

Ay	Dişi		Erkek	
	n	Ortalama± SD(min.-mak.)	n	Ortalama± SD(min-mak.)
Eylül/96	11	4.2588±3.6522 (0.21- 9.93)	7	1.7154±1.2952 (0.53-4.15)
Ekim	6	1.8669±1.7906 (0.08- 3.80)	3	1.3942±0.8329 (0.71-2.32)
Kasım	14	0.3326±0.2899 (0.04- 0.94)	13	1.2516±0.9452 (0.04-3.03)
Aralık	10	0.5392±0.3735 (0.06- 1.31)	13	0.8348±0.3513 (0.10-1.34)
Şubat/97	6	0.5060±0.2124 (0.08- 0.63)	20	0.5776±0.3489 (0.07-1.30)
Mart	4	4.6693±3.1868 (0.99- 6.67)	2	0.7609±0.7055 (0.26-1.26)
Mayıs	5	3.9100±1.8600 (0.07- 8.85)	39	1.0169±0.6265 (0.11-2.74)
Haziran	22	2.6516±2.4252 (0.13-10.21)	9	1.7959±0.4903 (0.96-2.50)
Temmuz	21	2.8224±2.6862 (0.24- 9.63)	16	1.6062±0.4518 (0.97-2.33)
Ağustos	6	4.1444±2.6212 (0.97- 8.09)	2	3.4092±1.8444 (2.11-4.71)
Eylül	12	5.3085±4.6861 (0.57-14.06)	10	2.9665±1.0548 (1.79-5.39)
Ekim	1	0.15	11	2.2228±0.4525 (1.67-3.25)
Kasım	6	0.7234±0.6539 (0.30- 2.03)	6	2.3215±0.4361 (1.76-2.94)
Ocak/98	16	3.5931±3.1597 (0.59- 8.58)	8	2.2403±1.0414 (0.65-4.08)
Şubat	23	1.5336±1.3863 (0.40- 5.03)	12	2.0355±0.6347 (1.20-3.34)
Mart	7	8.6919±3.5714 (2.62-12.53)	1	1.0612
Nisan	29	4.0480±2.9412 (0.26-12.96)	1	3.1753
Mayıs	19	5.5747±4.1585 (0.34-16.25)	1	2.6096

Çizelgeden de anlaşılacağı gibi, dişi bireylerin GSI değerlerinin 1996 yılı içinde Eylül ayında yüksek olduğu Ekim ayından başlayarak Mart/97'ye kadar düşük seyrettiği , Mart/97'de yükselerek ilerleyen aylarda yavaş bir düşüş göstermekte, Ağustos/97 ise tekrara artış göstererek yıl içinde Eylül/97'de en yükseğe ulaşmıştır. 1998 yılında yine Mart ayında en yüksek değere ulaşmakta ve bir yıl önceki gibi yavaş bir düşüş göstermektedir. Bu durum Mavi Yengecin İskenderun Körfez'inde üremeye Mart ayında başladıkları ve Eylül sonuna kadar devam ettiklerini göstermektedir (şekil 25). Erkek bireylerin aylık ortalama GSI değerleri şekil 25 de verilmiştir. Erkek bireylerde üreme bütün bir yıl boyunca gerçekleşmektedir. Erkek bireylerde üreme olgusunun en yüksek oranda Ağustos ile Ekim ayları arasında gerçekleştiği belirlenmiştir (Şekil 25).



Şekil - 25. Dişi ve Erkek Bireylerde Hesaplanan Ortalama Gonadosomatik İndeks Değerleri

3.3.4. Kondisyon


İskenderun Körfez' inden elde edilen toplam 1355 Mavi Yengeç bireyinde çalışmanın gerçekleştiği dönem içerisinde aylık kondisyon değerleri saptanmış olup, bu değerlerinin ortalamaları ve standart sapmaları çizelge 19' da verilmiştir.

Çizelge 19. Yumurtalık Körfezi Mavi Yengeç Örneğinde Aylara Göre Hesaplanan Ortalama Kondisyon ve Standart Sapma Değerleri

Aylar	Kondisyon \pm Standart Sapma (Min-Mak.)	
	Dişi	Erkek
Eylül/96	4.88 \pm 1.29 (2.23- 7.17)	7.01 \pm 1.41 (4.38- 9.27)
Ekim	4.47 \pm 0.68 (2.93- 5.04)	7.22 \pm 0.34 (6.83- 7.50)
Kasım	4.72 \pm 0.72 (3.39- 6.75)	7.14 \pm 1.15 (5.42- 9.44)
Aralık	4.21 \pm 0.79 (3.03- 5.47)	6.45 \pm 1.32 (4.45- 8.74)
Şubat/97	5.06 \pm 0.41 (4.73- 5.83)	7.51 \pm 0.67 (6.21- 8.66)
Mart	5.57 \pm 1.08 (3.90- 6.82)	7.12 \pm 0.18 (6.94- 7.30)
Mayıs	8.29 \pm 2.06 (4.88-10.94)	8.39 \pm 1.00 (5.48-10.96)
Haziran	5.45 \pm 1.09 (0.37- 7.74)	7.38 \pm 0.93 (5.01- 0.93)
Temmuz	5.56 \pm 0.85 (3.78- 8.87)	7.77 \pm 1.26 (5.99-10.98)
Ağustos	4.56 \pm 0.99 (3.67- 6.47)	4.63 \pm 0.01 (4.62- 4.64)
Eylül	5.08 \pm 1.29 (2.05- 7.63)	6.59 \pm 1.08 (5.28- 8.00)
Ekim		7.57 \pm 1.02 (5.49- 8.67)
Kasım	4.06 \pm 0.53 (3.02- 4.74)	6.14 \pm 0.54 (5.69- 7.02)
Aralık	4.98 \pm 1.25 (2.56- 6.34)	
Ocak/98	5.23 \pm 0.82 (2.79- 6.43)	5.11 \pm 1.61 (3.17- 7.15)
Şubat	4.61 \pm 0.46 (3.75- 5.26)	6.83 \pm 0.68 (5.53- 7.62)
Mart	4.06 \pm 1.27 (0.90- 6.25)	5.98 \pm 0.27 (5.74- 6.27)
Nisan	5.52 \pm 0.80 (4.14- 7.57)	7.95
Mayıs	5.24 \pm 1.24 (0.43- 7.59)	7.95 \pm 0.51 (7.21- 8.32)
Genel	5.26 \pm 1.27 (5.16- 5.36)	7.42 \pm 1.29 (7.25- 7.58)


Çizelge 19'un incelenmesinde görüleceği gibi dişi ve erkek bireylerde en yüksek kondisyon değerleri Mayıs/97 , en düşük değer ise dişilerde Kasım/97 ve Mart/98, erkeklerde ise Ağustos /97 aylarında hesaplanmıştır. Çalışmanın gerçekleştiği dönem için geçerli olmak üzere dişiler için ortalama kondisyon değeri 5.26 \pm 1.27, erkekler için ise 7.42 \pm 1.29 saptanmıştır. Yapılan varyans analizine göre iki değer arasındaki fark önemli ($P<0.05$) bulunmuştur. Bu duruma göre erkeklerin dişilere göre daha iyi beslendikleri ve yapılı bir vücuda sahip oldukları belirtilebilir. Dişi ve erkek bireylerde aylık olarak hesaplanan ortalama kondisyon değerlerini gösteren grafik şekil 25 'de verilmiştir. Gonad gelişimi ile kas

dokularında depolanan besin maddeleri arasında ters ilişkidendir. Gonadosomatik İndeks değeri arttıkça buna bağlı olarak kondisyon değerinin düşmesi gerekmektedir. Buna uygun olarak Şekil 26 da görüleceği gibi, 1997 yılında değerin en yüksek olduğu Mayıs ayından itibaren bir düşüş gözlenmiştir ve Kasım ayına kadar devam etmiştir. Bu düşüşün dişilerin yumurtlamaya başlamasından kaynaklandığı sanılmaktadır. 1998 yılında ise diş bireylerin yoğun olarak yumurtlamaya başladıkları Mart ayında en düşük kondisyon değerleri bulunmuştur.



Şekil 26. Mavi Yengeç, Dişi Bireylerde Aylara Göre Ortalama Kondisyon Değerleri (%)

Erkek bireylerde ise en düşük kondisyon değerleri Ağustos/97'de en yüksek değer ise Mayıs/97'de hesaplanmıştır. Ayrıca, en yüksek Mayıs/97 ayında elde edilen kondisyon değeri GSI değerlerine uygun olarak üremenin yoğun gerçekleştiği dönemde (Temmuz ile Eylül) azalma göstermiştir, özellikle üreme olgusunun en yüksek olduğu Ağustos ayı içinde en düşük bulunmuştur.



Şekil 27. Mavi Yengeç, Erkek Bireylerde Aylara Göre Ortalama Kondisyon Değerleri (%)

3.3.4. Dişi

3.3.4.1. Resaptakulum Seminis

İncelenen ergin dişi aylara göre elde edilen döllenmiş ve döllenmemiş dişi sayıları çizelge 20 de verilmiştir. İncelenen 357 ergin dişiden %21.85 nin resaptakulum seminisinde, ne spermatofora, ne de sperme rastlanılmamıştır. Ergin dişi bireylerin %78.15 gibi büyük bir oranının ise döllenmiş oldukları saptanmıştır. Dölenen dişilerde spermatofor uzunluğu en düşük 13.47 μ , en yüksek 49.54 μ , ortalama $29.23 \pm 7.25 \mu$ bulunmuştur.

Çizelge 20 de verildiği gibi döllenmemiş dişi yüzdesine en yüksek Aralık/96 ve Ağustos/97 de rastlanılmıştır. Yapılan incelemelerde Ağustos ayındaki döllenmemiş dişi bireylerin büyük bir kısmının olgunlaşmış gonadlara sahip oldukları saptanmıştır. Bütün dişilerin döllenmiş oldukları aylar ise 1997 yılının Mayıs, Ekim, Aralık ayları ve 1998 yılının Ocak ayıdır. Bu durumun çizelge 20 de görüldüğü gibi, bu aylarda örneklenen birey sayısının azlığından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. İncelenen aylara göre döllenmemiş dişi sayısındaki bu farklılık istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur ($\chi^2 = 74$, $df = 18$, $P < 0.05$).


Çizelge 20. Örnekleme Aylarına Göre Döllenmiş ve Döllenmemiş Dişi Değerleri.

Ay	Döllenmiş(Döllenmemiş)	Döllenmemiş (%)
Eylül/96	6 (4)	30
Ekim	8 (2)	20
Kasım	15 (5)	15
Aralık	2 (9)	81
Şubat/97	4 (1)	20
Mart	3 (1)	15
Mayıs	13 (0)	0
Haziran	20 (5)	20
Temmuz	36 (5)	13
Ağustos	8 (12)	60
Eylül	29 (3)	10
Ekim	1 (0)	0
Kasım	31 (2)	7
Aralık	1 (0)	0
Ocak/98	28 (0)	0
Şubat	19 (1)	5
Mart	17 (7)	30
Nisan	17 (10)	38
Mayıs	21 (11)	35

Çizelge 21 de verildiği gibi sperm veya spermatofora sahip resaptakulum seminisler şişkin ve oldukça sert yapıdadırlar ve şişkin olarak tanımlanmışlardır. Bunlarda yapılan total tartımlarda ortalama ağırlığı 0.65 ± 0.50 g olarak saptanmıştır. Elde edilen en yüksek değer 2.17 g, en düşük değer ise 0.17 g olarak tartılmıştır. Döllenmemiş resaptakulum seminisde sperm veya spermatofor bulunmayanlar ince ve gevşek yapıda olup, çizelge 21'de ince şeklinde tanımlanmışlardır. Ortalama ağırlıkları 0.20 ± 0.16 g , en düşük 0.01 ve en yüksek 0.91 g olarak tartılmışlardır. Resaptakulum seminis de bulunan spermatoforların ortalama uzunluğu 29.23 ± 13.47 μ , en düşük 7.25 μ , en yüksek 7.25 μ şeklinde belirlenmiştir (Şekil 28). Aylara göre spermatofor uzunlukları arasında da farklılık % 5 önem düzeyinde yapılan varyans analizi sonucunda önemli bulunmamıştır.


Çizelge 21. Dişi Mavi Yengeçlerde Resaptakulum Seminisin Temel İstatiksel Değerleri

Resaptakulu seminis Durumu (n)	Ortalama Ağırlık (g)	Standart Sapma	Minimum	Maksimum
Şişkin (98)	0.65	0.50	0.17	2.17
İnce (46)	0.20	0.16	0.01	0.91




Şekil 28. Aylara Göre Resaptakulum Seminis' te Bulunan Spermatoforların Ortalama Uzunluğu ve Standart Sapma Değerleri

Şekil 29'da verildiği gibi Aralık/96 ve Ağustos/97 ayları dışında döllenmiş dişi birey sayısı daha yüksektir. En yüksek döllenmemiş dişi ise Aralık/96 (%81), Ağustos/97 (%60) ve 98 yılı içinde ise Mart (%30), Nisan (%38) ve Mayıs (%35) ayında elde edilmiştir (Çizelge 20).




Şekil 29. Aylara Göre Dişilerde Resaptakulum Seminis Durumu

Kısa karapas genişlik sınırları göz önüne alındığında, 5.80-6.90 cm genişlik sınırlarındaki resaptakulum seminislerin tümü ince ve boş yapıdadır. Karapas genişliği arttıkça şişkin resaptakulum seminis sayısında da artış olmaktadır (şekil 30). Yapılan t-testine göre karapas genişliği ile döllenme yüzdesi arasındaki ilişki önemli bulunmuştur ($t = -4.75$ $df = 347$ $P < 0.05$). Bu durumda, büyük bireylerde döllenme yüzdesinin daha yüksek olduğu belirtilebilir.




Şekil 30. Kısa Karapas Genişliğine Göre Resaptakulum Seminis Durumu

Şekil 31 incelediğinde 3.20 cm karapas uzunluğuna sahip bireylerin tamamında resaptakulum seminislerin ince oldukları görülmektedir. Yine karapas genişlik sınırlarında olduğu gibi karapas uzunluğu arttıkça dölenmiş birey oranında da artış olmaktadır. Karapas uzunluğu ile resaptakulum seminis durumu arasındaki ilişki istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur ($t=-4,72$ $P<0.05$).




Şekil 31. Karapas Uzunluğuna Göre Resaptakulum Seminis Durumu

Örnekleme yapılan bütün istasyonlarda da döllenmiş ve şişkin yapıda resaptakulum seminislere sahip bireyler oldukça fazla bulunmaktadır (Şekil 32). Özellikle çiftleşmenin gerçekleştiği kıyısal , vegetasyonlu bataklıklarda elde edilen dişilerin tamamında şişkin spermatofor bulunan resaptakulum seminislere bulunmuştur. Örnekleme alanlarına göre resaptakulum seminis durumu arasındaki ilişki istatistiksel bakımdan da önemli bulunmuştur ($\chi^2 = 25$ df=11 P>0.05).



Şekil 32. İstasyonlara Göre Resaptakulum Seminis Durumu

İncelenen ergin dişilerin gonad gelişimlerine bakıldığında, dört gelişim evresindeki bireylerde de ince ve şişkin resaptakulum seminislere rastlanılmıştır. Olgunlaşmamış evredeki bireylerin %26.76 sında, olgunlaşmakta olanların %17.73 inde, olgunlaşanların %23.47 sinde, olgun evredeki bireylerinde % 38.1 inde sperm veya spermatofora rastlanılmamıştır. Oransal olarak döllenmemişler en az 2. evredeki bireylerde, en yüksek değer ise olgun evredeki bireylerde görülmektedir (şekil 33). Resaptakulum seminis durumu ile gonad gelişim evreleri arasındaki ilişki % 5 önem düzeyinde yapılan χ^2 istatistik analizinde önemli bulunmamıştır.




Şekil 33. Gonad Gelişimini Göre Resaptakulum Seminis Durumu

3.3.4.2. Yumurta Verimliliği (Fekondite)

Yumurtalı dişilerin ortalama yumurta verimliliği $1.876.969 \pm 1.165.659$ adet olarak hesaplanmıştır. En düşük değer 243.666, en yüksek ise 7.030.000 adet olarak bulunmuştur. Çalışma dönemi süresinde elde edilen yumurtaların embriyonik gelişim aşamaları ve hesaplanan çapları çizelge 22 de, aylara göre oluşturulmuş grafik ise şekil 34 de gösterilmiştir.

Çizelge 22. Embriyo Gelişim Aşamaları ve Ortalama Yumurta Çapları (μ)

Renk (Birey Sayısı)	Çap(μ) Ortalama \pm SD (en az-en yük.)	Larval gelişimi (Wenner, 1989)
Sarı (17)	63.31 \pm 10.41 (27.49-73.68)	Oldukça ufak embriyonik disk alanına sahiptir. İnvaginasyon henüz başlamamıştır. Yumurta hacminin %90 nı vitellustan oluşmuştur.
Portakal (9)	65.14 \pm 6.02 (50.01-69.96)	
Kiremit (18)	59.81 \pm 9.35 (26.60-69.16)	İnvaginasyon , organogenesis tamamlanmış, göz pigmentasyonu başlamış (kahverengimsi renklenme)ve yumurta hacminin %50 sini vitellustan oluşmuştur.
Kahve (14)	51.69 \pm 18.13 (22.88-69.16)	
Siyah (59)	53.17 \pm 20.25 (82.17-80.86)	Embriyo gelişimi tamamlanmış açılım 48 saaten daha bir kısa zamanda gerçekleşecek. Yumurta hacminin %10 undan daha azını vitellus oluşturmaktadır.




Şekil 34. Aylara Göre Değişik Embriyo Gelişim Aşamalarına Sahip Dişi Sayısı

Çizelge 22 incelendiğinde yakın yumurta çapında azalma var gibi görülse de yapılan tek yönlü varyans analizinde bu farklılığın önemli olmadığı saptanmıştır. Şekil 34 den de anlaşılacağı gibi Yumurtalık Körfezi'nde yumurtalı dişiler 96-97 yıllarındaki örneklemelerde Mart ayından başlayarak Eylül sonuna kadar bulunmuştur. 98 yılında ise daha önceki yıllardaki örneklemelerden farklı olarak Karataş kıyılarında Ocak ayında da yumurtalı bireyler trol ile 20 m derinliklerde elde edilmiştir. Yumurtalı dişiler yaz ayları süresince özellikle Temmuz/96-97 ve Eylül/97 de en yüksek miktarlarda elde edilmişlerdir. İlk gelişim




evresindeki (sarı) yumurtalı dişiler en çok Temmuz/96 , Mayıs ile Temmuz/97 ve Mart/98 aylarında bulunmuştur (şekil 34). Ocak /98 de Karataş kıyılarından elde edilen dişi bireylerin tamamında İnvaginasyon, organogenesisi tamamlamış , göz pigmentasyonu başlamış yumurtalar bulunmuştur (Kiremit, Kahve). Şubat ayında yumurtalı bireylere rastlanılmamıştır. Mart ve Nisan/98 de ise ilk (sarı) ve son (siyah) evredeki bireyler yakalanmıştır. Mayıs/97 de yumurtaların büyük bir kısmını ilk evredekilerden oluşurken, Mayıs/98 de embriyo gelişimini tamamlamış ve açılımı 48 saatten kısa bir sürede gerçekleştirecek bireyler elde edilmiştir (şekil 34). Haziran/97, Temmuz/96 ve 97 ise bütün embriyo gelişimin evrelerine sahip bireyler bulunmuştur. Her iki yılın Temmuz ayında en fazla ilk evredeki yumurtalar örneklenmiş olup, benzer bir durum görülmüştür. Ağustos/97 örneklemelerinde ise ilk evredeki bireylere rastlanılmamış, buna karşın son gelişme evresindeki bireylerin daha fazla oldukları gözlenmiştir. Eylül/96 ve 97 ise ilk evredeki bireyler az miktarda görülmeye başlamıştır. Yine bu ayda bütün evredeki bireylere rastlanılmıştır. Ekim /97de ise sadece son gelişim evresindeki bireyler bulunmuştur. Kasım ayında yumurtalı dişiler örneklenmemiştir. Aralıkta ise yine son gelişim evresindeki bireyler saptanmıştır (şekil 34). Embriyo evrelerinde aylara göre belirlenen bu farklılığın istatistiksel açıdan da önemli olduğu saptanmıştır ($\chi^2=142$ df=48 P<0,005). Sonuç olarak Eylül/96-Eylül/97 yılı içinde Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat ayları dışında, bütün yıl içerisinde yumurtalı bireylere rastlanılmıştır. Eylül/97-Mayıs/98 arasındaki ikinci 8 aylık dönemde ise Şubat ayında örnekleme yapılamamıştır. Belirtilen dönemde ise ilk örnekleme yılından farklı olarak, yumurtalı bireyler özellikle 20 m derinlikten örneklenmiştir. İskenderun Körfez' inde yumurtlama Mart ayından başlayarak Ekim ayına kadar sürmektedir.

Farklı embriyonik evrelerindeki (renkteki) yumurtalı dişi bireyler şekil 35'de, İlk ve son gelişim evresindeki yumurtalar ise şekil 36 ve 37'de gösterilmiştir.



Embriyonik gelişim evreleri ile karapas genişliği, karapas uzunluğu , dişilerde 4. ve 6. abdominal segment genişliği ile istasyonlar arasında oluşturulan ilişki grafikleri ise şekil 38 de verilmiştir.




Şekil 35. Mavi Yengeç' de Farklı Embriyonik Gelişim Evrelerindeki Yumurtalar a) Sarı Renkli b) Portakal Renkli İlk Gelişim Evresi c) Kiremit Renkli d) Kahve Renkli Gelişmekte e) Siyah Renkli Son Gelişim Evresi




Şekil 36. Mavi Yengeç' de Sarı Renkli İlk Gelişim Evresindeki Yumurtalar




Şekil 37. Mavi Yengeç' de Siyah Renkli Son Embriyonik Gelişim Evresindeki Yumurtalar




(a)




(b)



(c)



(d)



(e)

Şekil 38. Mavi Yengeç` de Embriyonik gelişim Aşamaları İle : a) Kısa karapas Genişliği (cm), b) Karapas Uzunluğu (cm), c) 4. Abdomen Genişliği (cm), d) 6. Abdomen Genişliği (cm), e) İstasyonlar Arasındaki İlişki Grafikleri

Şekil 38 a da gösterildiği gibi, 8 ve 14 cm arasındaki kısa karapas genişlik sınırındaki bireylerde bütün gelişim evrelerine sahip yumurtalar bulunmuştur. İlk evredeki yumurtalar 8-9 cm, son gelişim evresindekiler ise 8-11 cm kısa karapas genişliğine sahip bireylerde en fazla bulunmuştur. Karapas uzunluğu dikkate alındığında ise 4-7 cm uzunluk sınırındaki bireylerde bütün gelişim evrelerine rastlanılmıştır. Yine en fazla ilk ve son evredeki yumurtaya sahip bireyler 5-6 cm karapas uzunluğunda bulunmuştur (şekil 38 b). Yapılan tek yönlü varyans analizinde kısa karapas genişliği ve karapas uzunluğu ile yumurta evreleri arasında ilişki önemli bulunmamıştır. Dişilerde 4. abdomen segment genişliğine baktığımızda yine 3-4 cm genişlik sınırındaki bireylerde bütün gelişim evrelerindeki bireylere rastlanırken özellikle 4 cm genişliğindeki bireylerde en yüksek değerler elde edilmiştir (şekil 38 c). 6. abdomen genişlik sınırlarına baktığımızda 2-6 cm genişliğinde ki bireylerde, özellikle 3-4 cm genişliğinde bütün evreler en yüksek değerlerde bulunmuştur (şekil 38 d). 4. ve 6. abdomen genişliğine bağlı olarak yumurta evrelerinde oluşan farklılık yapılan tek yönlü varyans analizinde önemli bulunmamıştır.

Yumurtalık Koy' undaki 1. 2. istasyonlarda (0-10 m derinlik) diğer istasyonlara göre daha az yumurtalı birey elde edilmiştir. İlk embriyonik gelişim evreli bireyler bütün istasyonlarda bulunmuştur. Derinlik arttıkça her evredeki birey sayısında ve gelişim evresinde artma gözlenmektedir (şekil 38 e). Özellikle embriyonik gelişimini tamamlamış, yaklaşık 48 saat içinde açılacak yumurtaya sahip dişiler 3. 4. istasyonlarda (10-20 m derinlik) örneklenmiştir. 20 m den daha derinlikteki istasyonlarda ise son aşamalı dişilere rastlanılmamıştır. Embriyo evresi ile istasyonlar arasındaki bu farklılık % 5 önem düzeyinde yapılan χ^2 istatistik analizinde önemli bulunmamıştır. Derinlikler dikkate alındığında ise 0-5 m ıgırıp çekimi yapılan sığ bölgeler ile 5 ila 50 m derinlikleri kapsayan trol çekimi yapılan istasyonlar arasında yumurtalı dişi ve dişi sayısı bakımından oldukça fark olduğu saptanmıştır ($\chi^2=114$ $df=3$ $P<0.05$). Bu bilgiler ışığında, Yumurtalık Koy' u için Mavi Yengecin yumurtlama ve larva çıkışının 10-20 m derinliklerde gerçekleştiği ileri sürülebilir. Yumurtaların açılımı ve larva çıkışı 10 m' den sonraki derinliklerde koy' un girişinde gerçekleşmektedir. Bu yumurtlama göçü biyokütle hesaplamaları ile de desteklenmektedir. Yumurtlamanın gerçekleştiği yaz ve sonbahar ayları dışında, 20-50 m derinlik çizgisinde yapılan trol çekimlerinde Mavi Yengeç bireylerine rastlanılmamıştır (çizelge 26). Ayrıca larva örneklemelerinde, üreme olayının göstergesi sayılan I. evredeki larvalar en yüksek oranlarda 10-20 m derinlik örneklemelerinde elde edilmiştir (çizelge 33).

Fekondite (yumurta verimliliği) ile ağırlık , kısa karapas genişliği , karapas uzunluğu, 4. ve 6. abdomen segment genişliği arasındaki ilişki denklemleri gösterildiği gibi saptanmıştır.

$$F = 801749. W (g)^{0.005}$$

$$F = 250726. KKG (cm)^{0.175}$$

$$F = 180648. KU (cm)^{0.384}$$

$$F = 167745. DAG4 (cm)^{0.522}$$

$$F = 311148. DAG6 (cm)^{0.440}$$

Fekondite (yumurta verimliliği) ile bazı vücut boyutları için yapılan regresyonlara ait varyans analizler çizelge 23'de, regresyon katsayılarına ait analiz sonuçları ise çizelge 24 de verilmiştir. Ayrıca yumurta verimliliği ile ağırlık, karapas genişliği, uzunluğu ve 4.,6. abdominal segment genişliklerine uygulanan regresyon grafikleri şekil 39 da gösterilmiştir.

Çizelge 23. Fekondite ve Bazı Vücut Boyutları İçin yapılan Regresyon Katsayılarına Ait Varyans Analiz Tablosu






Değişkenler	Varyasyon Kaynağı	Serbestlik Derecesi	Kareler Ortalaması	F
Ağırlık (W)	Regrasyon	1	13.498	47.49*
	Hata	166	0.283	
Karapas Genişliği (KKG)	Regrasyon	1	11.284	37.10*
	Hata	176	0.304	
Karapas Uzunluğu (KU)	Regrasyon	1	13.801	46.30*
	Hata	193	0.298	
4.Abdomen Genişliği (DAG4)	Regrasyon	1	12.234	48.32*
	Hata	193	0.294	
6.Abdomen Genişliği (DAG6)	Regrasyon	1	11.131	37.06*
	Hata	186	0.300	

*P<0.05

Çizelge 24. Fekondite ile Vücut Boyutlarıyla İlgili Regresyon Katsayılarına Ait Analiz Sonuçları

Değişkenler	β	S.H β	t-testi
Ağırlık (W)	0.005	0.007	6.891*
Karapas Genişliği (KG)	0.175	0.02	6.092*
Karapas Uzunluğu (KU)	0.384	0.43	6.805*
4.Abdomen Genişliği (DAG4)	0.522	0.07	6.952*
6.Abdomen Genişliği (DAG6)	0.440	0.07	6.088*

*P<0.05



Şekil 39. Fekondite ile Ağırlık (g), Kısa Karapas Genişliği (cm), Karapas Uzunluğu (cm), 4. ve 6. Abdomen Segment Genişliği (cm) Regresyon Grafikleri

3.3.5. ERKEK


3.3.5.1. Erkek bireylerde Vas-deferentia

Erkek bireylerin eşeyssel olgunluğa erişme göstergesi şunlardır. 1. Vas-deferentia' nın ön bölgesinde sperm veya spermatofor bulunması, 2. Abdomenin sternum dan tamamen ayrı bulunması veya sternal tuberküller ile bağlı olması, 3. Penislerin ve ikinci pleopodların birinci çift pleopodların içine yerleşmiş olmasıdır. Yapılan çalışmada, abdomen tamamen serbest , penisler ve ikinci pleopod'lar birincileri içerisine yerleşmiş 295 ergin birey ve belirtilen özellikleri göstermeyen 29 erginleşmemiş birey incelenmiştir. Populasyondaki erkek bireylerin yıl içinde, her ay işlevsel olarak üreyebildikleri saptanmıştır. Sonuç olarak incelenen erkek bireylerin yaklaşık %90'unda Vas-deferentia' nın ön bölgesinde sperme rastlanılmıştır. Spermatoforların, en az 10.94 μ , en yüksek 47.88 μ , ortalama $27.64 \pm 7.05 \mu$ uzunlukta oldukları saptanmıştır (şekil 40). Çok az kısmında (yaklaşık %10) ise sperme ve de spermatofora rastlanılmamıştır. Bu sonuçlar, sadece yapısal olarak cinsiyet ayırımı yapılabilmüş bireylerden elde edilmiştir. Bu orana juvenil bireyler katılmamıştır. Çizelge 25 de aylara göre erkek bireylerde vas-deferentiadaki sperm varlığı gösterilmiştir. % 5 önem düzeyinde yapılan x^2 istatistik analizinde aylara göre sperm varlığı arasında ilişkinin önemli olmadığı saptanmıştır. Bu da erkek bireylerin tüm yıl içinde spermatofor oluşturduklarını ve dölleme yeteneğinde olduğunu göstermektedir


Aşağıda verilen çizelge 25'in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, Aralık/96 da sperm bulunmayan bireylerin yüzdesi %60 ile en yüksek bulunmuştur. Bunu %25 değer ile Kasım/96 ve 97 ile Şubat/98 ayları izlemiştir. Yılın bütün aylarında dölleme yeteneğine sahip bireyler araziden örneklenmiştir (Şekil 41). Genel olarak kış aylarında diğer aylara göre daha uzun spermatoforlar görülmektedir (şekil 40). Bununla birlikte yapılan tek yönlü varyans analizinde, mevsimlere göre oluşturulan spermatoforların uzunlukları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı bulunmuştur.

Çizelge 25. Aylara Göre Vas-Deferentia' da Sperm Bulunan ve Bulunmayan Erkek Birey Sayıları ve Bulunmayanların Yüzde Oranları

Ay	Sperm var (yok)	Sperm yok (%)
Eylül/96	3 (0)	00
Ekim	3 (0)	00
Kasım	6 (2)	25
Aralık	2 (3)	60
Şubat/97	4 (0)	0
Mayıs	23(1)	5
Haziran	7 (0)	0
Temmuz	14(1)	7
Ağustos	2 (0)	0
Eylül	9 (1)	10
Ekim	10(0)	0
Kasım	3 (1)	25
Şubat/98	6 (2)	25
Mart	1 (0)	0
Nisan	1 (0)	0
Toplam	94(11)	11.70




Şekil 40. Aylara Göre Vas-Deferentia da Ortalama Spermatofor Uzunluğu Dağılımı ve Standart Sapma Değerleri



Şekil 41. Aylara Göre Vas-Deferentia da Spermatofor Oluşumu

Spermatofor bulunmayan erkek bireyler en fazla 1. ve 2. İstasyonlardan elde edilirken, 20-50 m derinlik bölgesinde bulunan 6. istasyonda yakalananların tümünde spermatofor bulunmamıştır. Oldukça sığ olan (1-3 m) ve bitkisel bataklıkların yer aldığı bataklık ve ırgırp istasyonlarında örneklenen bireylerin büyük bir kısmının işlevsel üreme yeteneğinde olduğu görülmektedir (şekil 42). İstasyonlar arasında bu farklılığın istatistiksel bakımdan önemli olduğu bulunmuştur ($\chi^2=17$ df=7 $P<0.05$). Bu sonuç beklenen bir sonuçtur. Çünkü, erkek bireyler sığ otluk bölgelerde kabuk değiştirerek olgunlaşmakta ve dişilerin aksine herhangi bir üreme göçü gerçekleştirmemektedirler. Ayrıca çiftleşme, bu belirtilen alanlarda gerçekleşmektedir.




Şekil 42. İstasyonlara Göre Vas-Deferentia da Spermatofor Oluşumu

Kısa karapas genişliği, karapas uzunluğu ve abdomen genişliğine göre Vas-deferentia' da spermatofor oluşumu grafikleri şekil 43, 44 ve 45'de verilmiştir.


Kısa karapas genişlik sınırlarına bakıldığında, 8.00-9.50 cm arasındaki karapas genişliğindeki bireylerin tümünde de Vas-deferentia' da spermatoforlara rastlanılmıştır. Sadece, 9.50 cm kısa karapas genişliğine sahip olan bireyler arasında %50'ye varan oranda spermatofor oluşturmayan bireyler bulunmaktadır. Daha yüksek kısa karapas genişlik sınırlarında ise çok az oranlarda spermatofor oluşturmayan bireyler saptanmıştır. Şekil 43'de de görüldüğü gibi, özellikle 11 cm kısa karapas genişliğindeki bireylerde spermatofor oluşturmayan bireylerin sayısı, diğer kısa karapas genişlik sınırlarına göre yüksek bulunmuştur. Yapılan t-testi ile eşeyssel olgunlaşmaya ulaşma (Vas-deferentia' da spermatofor bulunma) ile kısa karapas genişliği arasında ilişkinin önemli olmadığı bulunmuştur. Arazi örneklemelerinde de farklı genişlik sınıflarında hem spermatoforlu, hem de bulunmayan bireyler elde edilmiştir. Araziden örneklenen işlevsel üreme yeteneğine sahip en küçük birey ise 8.00 cm kısa karapas genişliğinde bulunmuştur.

Şekil 44 incelendiğinde , spermatoforun bulunduğu en küçük bireyin 5.20 cm karapas uzunluğuna sahip olduğu görülmektedir. Konu karapas uzunluklarına göre değerlendirildiğinde, 5.30, 5.90, 6.20-6.30, 6.70, 7.0, 7.40 cm ve özellikle 7.60 cm uzunluğa sahip bireylerde spermatofor oluşturamayan bireyler saptanmıştır. Bunun nedeni olarak örneklemin yetersiz kalabileceği düşünmekle birlikte, kısa karapas genişliğinde olduğu gibi, uzunluğun da spermatofor oluşturma ve üreme işlevinin gelişiminde etkili olmadığı ileri sürülebilir (t-test $P>0.05$).


Abdomen genişlik sınırlarına göre incelendiğinde ise, 3.10 ila 3.90 cm arasındaki bireylerin şekil 45 de görüleceği üzere çok az bir kısmında Vas-deferentiada sperm veya spermatoforlara rastlanılmamıştır. Abdomen genişlik sınırlarında ile spermatofor oluşturma arasındaki ilişkinin de yapılan t-testi sonucunda önemli olmadığı saptanmıştır.



Şekil 43. Kısa Karapas Genişliğine Göre Vas-Dereferentia da Spermatofor Oluşumu



Şekil 44. Karapas Uzunluğuna Göre Vas-Dereferentia da Spermatofor Oluşumu



Şekil 45. Abdomen Genişliğine Göre Vas-Deferentia da Spermatofor Oluşumu

3.4. BİYOKÜTLE

Yumurtalık Koy' undan elde edilen Mavi Yengeç biyokütlesi ile ilgili verilerin değerlendirilmesinde Avşar ve ark., (1998) 'nın belirttiği her derinlik bölgesinin yüzey alanı ve koy' un toplam yüzey alan değerleri kullanılmıştır. Her istasyonun trol çekim derinliği, mevsimsel olarak ortalama av verimlilikleri , istasyonların yerleştirildiği her derinlik bölgesinin yüzey alanı , Yumurtalık Koy' unun toplam yüzey alanı ve toplam Mavi Yengeç biyokütlesi Çizelge 26'da verilmiştir.

Çizelge 26. Yumurtalık Koy' unda Farklı Derinlik Bölgelerinde Mevsimlere Göre Hesaplanan Mavi Yengeç Ortalama Biyokütle Değerleri

Dönemler	Derinlik Bölgeleri			Toplam Biyokütle
	0-10 m	10-20 m	20-50 m.	
	A=53.12 km ²	A=22.86 km ²	A=42.02 km ²	A=118 km ²
SONBAHAR				
Biyokütle(kg)	10.0629	1.9639	0.8548	12.8816
Standart Sapma	28.2200	11.4578	3.4661	28.3695
KIŞ				
Biyokütle(kg)	0.6035	0.0870	---	0.6905
Standart Sapma	1.2446	1.5349	---	8.6557
İLKBAHAR				
Biyokütle(kg)	1.5810	1.7378	---	3.3188
Standart Sapma	10.3665	18.4452	---	24.2199
YAZ				
Biyokütle(kg)	4.6969	4.0996	9.2717	18.0382
Standart Sapma	31.3275	19. 89	22.2108	42.0780
Toplam	16.9443	7.8583	10.1265	34.9291

En yüksek biyokütle su sıcaklığı ve beslenme ile ilgili olarak yaz aylarında ve sonbaharın ilk ayında , en düşük ise kış aylarında elde edilmiştir. Burada en dikkati çeken nokta ise kış ve ilkbahar aylarında 20 m derinlikten sonraki bölgelerde yengeç bireylerine rastlanılmamasıdır. Bu derinliklerde yengeç bireyleri, özellikle Mayıs ayından başlayarak yaz ve sonbahar aylarında gerçekleştirilen trol çekimlerinde yakalanmıştır. Bu durumun özellikle dişilerin, yumurta bırakmak için koyun ağzına ve derinlere üreme göçü yapmasından kaynaklandığı söylenebilir.

Çizelge 26'nın incelenmesinde görüleceği gibi standart sapma değerleri ortalamalardan oldukça yüksek elde edilmiştir. Bu durumun yengeçlerin belirli alanlarda kümelenmelerine bağlanabilir. Bu nedenle de yapılan trol çekimlerinde, bir çekim alanında

Mavi Yengeç elde edilmezken, diğer alanda belirli miktarlarda bulunmasının sapmanın bu kadar yüksek çıkmasına neden olduğunu düşündürmektedir.

Yumurtalık Koy' u toplam 118 km² alanında toplam Mavi Yengeç biyokütlesi 34.9291 kg olarak hesaplanmıştır (çizelge 26). Buna göre km² birim alanda ise ortalama biyokütle 0.30 kg olmaktadır.

3.5. BESLENME EKOLOJİSİ

148 dişi, 72 erkek ve 45 juvenil birey olmak üzere toplam 265 bireyin mide içeriği incelenmiştir. Mide içeriğinde, bivalviya, krustase, gastropod, kemikli balıklar, bitkisel organizma ve yumurta saptanmıştır. Makroskobik olarak yapılan değerlendirmede doğrultusunda doluluk dereceleri ve % frekansları çizelge 27 de verilmiştir. Çizelge 27'de görüldüğü gibi incelenen örneklerin %24 'nü boş mideler oluşturmaktadır. Dişi bireylerde boş mide oranı erkek ve juvenil bireylere göre oldukça düşük bulunmuştur. Dişilerde en yüksek miktarda az dolu mideler bulunurken ; erkeklerde boş ve az dolu, juvenillerde ise az dolu, dolu ve boş mide oranları hemen hemen eşit olmuştur. Bu farklılık istatistiksel açıdan da önemli bulunmuştur ($\chi^2 = 29$ df=8 P<0.05).Yapılan incelemelerde besinlerin büyük oranda sindirildiği ve midenin yapısında bulunan gastrolitler sayesinde oldukça parçalandığı gözlenmiştir. Bu nedenle, mide içeriğindeki organizma tanısı tür düzeyinde yapılamamıştır. Çizelge 28 de erkek, dişi ve juvenil bireylerde besin grupları ve bunların yüzde ağırlık değerleri verilmiştir.

Çizelge 27. İskenderun Körfezindeki Mavi Yengecin Mide Doluluk Dereceleri ve Yüzde Oranları

Kapasite	Cinsiyet					
	Dişi		Erkek		Juvenil	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Tam Dolu(4/4)	8	5.4054	1	1.3888	5	11.1111
Dolu(3/4)	25	16.8948	7	9.7222	12	26.6666
Yarı Dolu(2/4)	24	16.2162	6	8.3333	6	13.3333
Az Dolu(1/4)	67	45.2702	29	40.2777	11	24.4444
Besinli Mide	124	83.7836	43	59.7220	34	75.5554
Boş	24	16.2162	29	40.2777	11	24.4444
Toplam	148	100.0000	72	100.0000	45	100.0000

Çizelge 28. Mavi Yengeç Mide İçeriğinde Saptanan Besin Grupları ve Bunların Bulunma Sıklığı (F.O %) ve Yüzde Ağırlık Değerleri (%W)

Besin Grupları	Cinsiyet								
	Dişi			Erkek			Juvenil		
	n	(F.O%)	(%W)	n	(F.O %)	(%W)	n	(%)	(%W)
Balık	65	52.419	29.100	16	37.209	11.800	7	20.588	20.400
Kabuklu	55	44.354	32.400	9	20.930	32.300	4	11.764	8.500
Bivalviya	53	42.741	36.200	21	48.837	36.400	17	50.000	60.300
Gastropod	11	8.870	0.100	2	4.651	6.200	1	2.941	5.200
Bitkisel Organizma	21	16.935	2.200	10	23.255	13.400	5	14.705	5.600
Yumurta	4	3.225	---	10	23.255	---	---	---	---


Çizelge 28 incelendiğinde, besin grupları içinde sırasıyla bivalviya , balık ve krustasenin, gerek bulunma sıklığı ve gerekse ağırlık oranları olarak öncelikli besin gruplarını oluşturdukları görülmektedir. Dişi bireylerde balık grubu mide içeriklerinde yoğun bulunmalarına rağmen, ağırlık olarak en fazla bivalviya yer almaktadır. Ayrıca erkek ve juvenil bireylerde alınan besin grupları içerisinde bitkisel organizmaların da önemli bir payı olduğu görülmektedir. Juvenil bireylerin mide içeriğinin gerek bulunma sıklığı ve gerekse ağırlık olarak büyük bir kısmını bivalviya oluşturmaktadır. Daha sonra bunu balık, bitkisel organizmalar, gastropodlar izlemektedir. Ergin dişi ve erkek bireylerin midesinde yumurta bulunurken, juvenil bireylerin midelerinde rastlanılmamıştır. Yapılan tek yönlü varyans analizlerinde eşem-ağırlık arasında kabuklu bakımından istatistik olarak fark önemli bulunmuştur ($P<0.05$). Bulunan farklılığın, hangi eşem grupları arasında olduğunu belirlemek için % 5 önem seviyesinde Duncan Çoklu Aralık testi uygulanmıştır. Sözü edilen teste göre bu farklılık erkek ve dişi bireyler arasında bulunmuştur. Diğer besin grupları için eşem-ağırlık bakımından fark önemsiz elde edilmiştir. Eşem-yumurta bakımından ise farklılık önemli bulunmuştur ($x^2 =16$ $df=2$ $P<0.05$). Yapılan incelemelerde, Mavi Yengeç'lerin mide içeriklerinde büyük oranda ağ parçaları, kum-çakıl ve özellikle sakız gibi inorganik materyallere de rastlanılmıştır. Bunlardan ağ parçalarının yengeçlerin ağlarda balık yakalarken kopardığı parçalar olduğu, bunun dışındakilerin ise dipte beslenirken besin maddeleri ile birlikte aldığı düşünülmektedir.

Karapas genişliğine göre dişi, erkek ve juvenil bireylerde bulunan besin grupları çizelge 29 da ve şekil 46 da gösterilmiştir.

Çizelge 29. Karapas Genişliğine (KG) Göre Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerde Bulunan Besin Grupları

Karapas Genişliği	Cinsiyet(n)	Balık (n)	Kabuklu (n)	Bivalviya (n)	Gastropod (n)	Bitkisel organizma (n)	Yumurta (n)
3.30-3.90	Dişi (0)	---	---	---	---	---	---
	Erkek(0)	---	---	---	---	---	---
	Juvenil(7)	0	0	5	0	0	0
4.40-6.90	Dişi(3)	0	1	0	0	0	1
	Erkek(5)	0	1	1	0	1	0
	Juvenil(15)	4	4	8	1	1	0
7.00-7.90	Dişi(10)	2	4	3	1	1	0
	Erkek(3)	0	0	1	0	1	0
	Juvenil (6)	3	0	3	0	2	0
8.10-8.90	Dişi(10)	3	2	6	0	0	0
	Erkek(7)	1	1	1	0	1	0
	Juvenil(6)	0	0	1	0	2	0
9.10-9.90	Dişi(30)	13	20	12	0	1	0
	Erkek(11)	2	0	3	0	1	0
	Juvenil(2)	2	0	0	0	0	0
10.0-10.90	Dişi(33)	14	9	16	2	5	1
	Erkek(17)	1	2	4	0	0	3
	Juvenil(1)	1	0	0	0	0	0
11.0-11.90	Dişi(38)	17	10	9	4	7	1
	Erkek(17)	6	4	5	2	4	2
	Juvenil(0)	---	---	---	---	---	---
12.0-12.90	Dişi(23)	13	7	5	4	7	0
	Erkek(8)	2	1	1	0	0	2
	Juvenil(0)	---	---	---	---	---	---
13.0-14.30	Dişi(4)	3	2	2	0	0	1
	Erkek(8)	4	0	5	0	2	3
	Juvenil(0)	---	---	---	---	---	---
Toplam		91	68	91	14	36	14

Çizelge 29'un incelenmesinden anlaşılacağı gibi, yengeç bireylerinde karapas genişliği arttıkça mide içeriğinde yer alan balık ve kabuklu sayısında da artış olmakta, bivalviya tüketimi ise her büyüklükte önemli olmaktadır. Ancak yapılan t-testine göre her bir besin grubunun alındığı bireylerde ortalama karapas genişliği bakımından farklılığın önemli olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle her karapas genişlik sınırlarında bütün besin gruplarının tüketildiği söylenebilir.




Şekil 46. Karapas Genişliğine Göre Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerde Bulunan Besin Grupları

Aylara göre belirlenen besin grupları ise çizelge 30' da ve şekil 47'de gösterilmiştir.

Çizelge 30. Mavi Yengeç Bireylerinde Aylara Göre Belirlenen Besin Grupları

Ay	Cinsiyet (n)	Balık (n)	Kabuklu (n)	Bivalviya (n)	Gastropod (n)	Bitkisel organizma (n)	Yumurta (n)
Ocak	Dişi(19)	7	5	8	2	3	0
	Erkek(6)	3	0	3	0	3	3
	Juvenil(0)	---	---	---	---	---	---
Şubat	Dişi(0)	---	---	---	---	---	---
	Erkek(1)	0	1	0	1	0	0
	Juvenil(0)	---	---	---	---	---	---
Mart	Dişi(12)	6	3	1	0	0	0
	Erkek(3)	1	1	1	0	0	0
	Juvenil(0)	---	---	---	---	---	---
Nisan	Dişi(14)	3	3	11	0	0	0
	Erkek(0)	---	---	---	---	---	---
	Juvenil(0)	---	---	---	---	---	---
Mayıs	Dişi(24)	4	7	18	3	3	0
	Erkek(37)	3	3	14	1	3	3
	Juvenil(19)	1	2	12	1	1	0
Haziran	Dişi(24)	10	11	5	0	2	1
	Erkek(4)	0	2	0	0	0	0
	Juvenil(1)	1	1	0	0	0	0
Temmuz	Dişi(20)	8	11	6	1	1	0
	Erkek(10)	3	2	2	0	1	0
	Juvenil(9)	1	0	4	0	1	0
Ağustos	Dişi(3)	1	3	0	0	0	0
	Erkek(2)	0	0	0	0	0	0
	Juvenil(9)	4	1	5	0	3	0
Eylül	Dişi(17)	13	6	1	0	0	0
	Erkek(7)	1	0	0	0	2	1
	Juvenil(3)	1	1	3	0	0	0
Ekim	Dişi(0)	---	---	---	---	---	---
	Erkek(0)	---	---	---	---	---	---
	Juvenil(0)	---	---	---	---	---	---
Kasım	Dişi(28)	17	9	7	5	13	3
	Erkek(8)	6	0	2	0	1	3
	Juvenil(4)	---	---	---	---	---	---
Aralık	Dişi(1)	1	0	0	0	0	0
	Erkek(0)	0	---	---	---	---	---
	Juvenil(0)	---	---	---	---	---	---

Çizelge 30'dan da anlaşılacağı gibi, Ekim ayı içinde örnekleme yapılamadığı için Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında ise araziden juvenil bireyler örneklenemediği için mide içerikleri incelenememiştir. Su sıcaklığı ve besin maddelerinin artması gibi nedenlerden dolayı ilkbahar ve yaz aylarında beslenme yoğunluğunun arttığını, daha çok bivalviya, kabuklu ve balık üzerinden beslenildiği saptanmıştır. Sonbahar aylarına doğru ise dalyanlara geçiş ile ilgili olarak beslenmenin daha çok balık üzerine yoğunlaştığı belirlenmiştir. Mevsimlere göre alınan besin gruplarındaki farklılık, yapılan χ^2 istatistik de önemli bulunmuştur ($\chi^2=49$ df=12 P<0.05).



Şekil 47. Aylara Göre Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerde Besin Grupları


Mavi Yengeç' de aylara göre dişi, erkek ve juvenil bireylerde hesaplanan Beslenme İndeksi grafiği şekil 48'de, aylara ve karapas genişliğine göre hesaplanan Boşluk İndeksi grafikleri ise şekil 49 ve 50' de verilmiştir.

Aylara göre hesaplanan ve grafik olarak da verilen “Beslenme İndeksi” değerlerine bakıldığında dişilerin erkek ve juvenillere göre daha yüksek değerlere sahip olduğunu belirtebiliriz (Şekil 49). Dişi bireylerde en yüksek değerler 3. ayda elde edilmiştir. Daha sonra 4. ayda %50’ye varan bir düşüş olmuştur. Bunun nedeni 4. ay örneklerinin aynı alanlardan örneklenmemesinden kaynaklanabilir. Daha sonra ise 7. aya kadar düzenli bir artış söz konusudur. Yaz aylarında ise tekrar bir düşüş gözlenmektedir. Bunun da yumurtlama dönemi olmasından kaynaklanabileceği ileri sürülebilir. Erkek bireylerde ise dişilerin aksine, en yüksek değerler sonbahar ve kış aylarında elde edilmiştir. En yüksek değer Şubat’ ta elde edilmiş, 3. ayda ani bir düşüş göstermiş, diğer aylarda ise 0,5 düzeylerinde ilerlemiştir. En düşük değer 8. ay saptanmıştır. Sonuç olarak erkek bireylerin sonbahar ve kış aylarında yoğun olarak beslendikleri, ilkbahar ve yaz aylarında beslenme düzeylerinin düştüğü belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak, kıyusal bölgelerdeki besin maddelerinin bulunurluğu, su sıcaklığı ve çifleşmenin bu dönemde gerçekleşmesinin etken olabileceği söylenebilir. Juvenil bireylerde ise bulunabildikleri aylarda en yüksek değer 5. ayda elde edilmiştir. Diğer aylarda ise (5. aydan 10. aya kadar) düzgün bir değer göstermiştir. Buna göre juveniller, ergin erkek bireylerden oldukça yüksek beslenme indeksi göstermişlerdir (Şekil 48).


Dişi bireylerde 3. ayda incelenen midelerden % 70 boş çıkmıştır. Şekil 49 dan da anlaşılacağı gibi diğer aylarda boşluk yüzdeleri %10-20 arasında bir değer göstermiştir. Erkek bireylerde en yüksek boşluk indeksi 8. ayda görülmüştür (yaklaşık %100). Juvenillerde ise en yüksek oran 7. ayda (%30) elde edilmiştir.

Dişi bireyler arasında ise 4.40-6.90 cm karapas genişliğine sahip bireylerin incelenen midelerinin %70 ‘ nin boş olduğu bulunmuştur. Erkeklerde bu oran, 8.10-8.90 cm karapas genişliğine sahip bireylerde %60 gibi bir değer göstermektedir. Juvenillerde ise erkek ve dişilerden farklı olarak 4.40-6.90 cm karapas genişliğindeki bireylerde incelenen örnekler arasında boş mide yüzdesinin daha düşük olduğu saptanmıştır (Şekil 50).


İncelenen Mavi Yengeç populasyonunun büyük bir kısmında ise karapas, kıskaç ve abdomenlerinde üzerinde bağımlı olarak yaşayan bazı kabuklular (Cirripedia=Crustacea) görülmüş ve bunların *Chelonibia patula* (Ranzani) 1818 adlı tür olduğu saptanmıştır (Rellini, 1980).



Şekil 48. Aylara Göre Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerde Beslenme İndeksi (%)



Şekil 49. Aylara Göre Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerde Boşluk İndeksi (%)



Şekil 50. Karapaks genişliğine Göre Dişi, Erkek ve Juvenil Bireylerde Boşluk İndeksi (%)

3. 6. ET KOMPOZİSYONU

Yumurtalık Körfez' inden değişik mevsimlerde elde edilen erkek ve dişi Mavi Yengeç bireylerinde mevsimlere göre göğüs ve kıskaç etlerinde saptanan ham Protein, kuru madde, ham kül ve lipit düzeyleri çizelge 31 de verilmiştir.

Çizelge 31. Mavi Yengeçlerde Erkek ve Dişi Bireylerin Göğüs ve Kıskaç Etlerinin Mevsimsel Besin Maddeleri Oranları (%)

Mevsim	Cinsiyet	Organlar	Ham Protein	Kuru Madde	Ham Kül	Lipit
Kış	Erkek	Göğüs	16.72±0.01	18.46±0.03	1.57±0.01	0.21±0.01
		Kıskaç	16.92±0.04	19.59±0.03*	1.70±0.01*	0.96±0.01*
	Dişi	Göğüs	19.05±0.05	23.12±0.12	3.28±0.08*	0.79±0.01
		Kıskaç	20.45±0.06*	23.67±0.02	1.21±0.03	1.99±0.02*
İlkbahar	Erkek	Göğüs	15.12±0.07	21.90±0.08	2.89±0.03	3.89±0.01
		Kıskaç	17.46±0.23*	26.15±0.16*	3.10±0.03*	5.60±0.08*
	Dişi	Göğüs	21.96±0.17*	25.68±0.18	1.96±0.02*	1.76±0.04
		Kıskaç	20.86±0.20	25.36±0.13	1.92±0.01	2.58±0.07*
Yaz	Erkek	Göğüs	14.64±0.03	19.02±0.04	2.65±0.02*	1.73±0.04
		Kıskaç	15.57±0.06*	20.21±0.03*	2.36±0.03	2.28±0.06*
	Dişi	Göğüs	15.28±0.25*	19.48±0.29*	3.03±0.04	1.17±0.02*
		Kıskaç	11.59±0.11	15.44±0.12	3.12±0.04	0.73±0.02
Sonbahar	Erkek	Göğüs	16.88±0.01	21.95±0.20	1.69±0.01	3.39±0.20
		Kıskaç	17.90±0.00*	23.43±0.00*	1.78±0.02*	3.75±0.12*
	Dişi	Göğüs	12.11±0.04	17.24±0.11	2.38±0.02	2.74±0.10
		Kıskaç	12.21±0.03	17.00±0.00	2.37±0.02	2.62±0.07

*Yapılan varyans analizine göre iki organın aynı sütundaki özellikleri bakımından aralarındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğunu göstermektedir (P<0.05).


Söz konusu çizelgede görüleceği gibi, kış mevsiminde erkek bireylerin kıskaçlarındaki kuru madde, ham kül ve lipit değerleri, göğüs etlerine göre yüksek bulunmuştur. Bu farklılığın istatistiksel bakımdan da önemli olduğu saptanmıştır (P<0.05). Ham protein açısından her iki organda aşağı yukarı aynı düzeyler elde edilmiştir. Dişilerde ise aynı mevsim için kıskaç etlerindeki ham protein ve lipit değerleri, göğüs etinde ise ham kül düzeyi diğer organa göre yüksek bulunmuştur. İlkbahar da erkek bireylerin kıskaç etlerindeki bütün besin maddesi değerleri göğüs etine göre yüksek olmuştur. Yine bu farklılık da istatistiksel açıdan önemlidir (P<0.05). Dişilerde ise ham protein ve ham kül göğüs etinde , lipit kıskaç etinde yüksek bulunurken, kuru madde açısından farklılık önemli bulunmamıştır. Yaz aylarında erkek bireylerin kıskaç etlerinde değerler yüksek elde edilirken, dişilerde göğüs etlerinde yüksek bulunmuştur. Yalnız erkeklerin göğüs etindeki ham küldeki farklılık, kıskaç etine göre önemli

saptanmıştır. Dişilerde ham kül bakımından her iki organ için de farklılık önemsizdir. Sonbaharda ise diğer mevsimlerde olduğu gibi erkeklerin kısıkaç eti değerleri göğüs etine göre yüksek bulunurken, dişilerde her iki organ açısından farklılık önemsiz olmuştur. Çizelge 31 den de anlaşılacağı, gibi erkek bireylerin kısıkaç etindeki değerler bütün mevsimlerde göğüs etinden yüksektir. Dişilerde ise sonbahar dışındaki diğer mevsimlerde göğüs eti değerleri kısıkaca göre yüksek bulunurken, sonbaharda birbirine oldukça benzer olmuştur. En yüksek ham protein değeri %21.96 ile ilkbaharda dişî bireylerin göğüs etinde, kuru madde %26.15 ile ilkbaharda erkek kısıkacında, ham kül %3.28 ile kışın dişinin göğüs etinde, lipit ise %3.89 ile ilkbaharda erkek bireylerin göğüs etinde saptanmıştır.

3.7. LARVA

3.7.1. Larval Evre Kompozisyonu.

Yumurtalık Koy' undaki Mayıs-1997 ile Mart-1998 dönemleri arasında aylık aralıklarla yapılan plankton örneklemelerinde Mavi Yengeç larvalarının 7 veya 8 planktonik evre geçirdiği belirlenmişti. Arazi örneklemelerinde ilk zoeal evreler (I, II, III) ile ileri zoeal evreler (IV, VI, VII, VIII) saptanırken, V. zoea evredeki bireylere ise rastlanılmamıştır. Elde edilen larvaların evrelerine göre yüzde dağılımı şekil 51 de verilmiştir. Aylara ve derinliklere göre elde edilen zoeal larval evre kompozisyonu çizelge 32, zoeal larval evrelerin derinliklere göre yüzde bulunma oranları da çizelge 51'de gösterilmiştir.



Şekil 51. Yumurtalık Koy' unda Mavi Yengeçlerin Zoeal Larva Evrelerinin Yüzde Dağılımı

Şekil 51' de görüldüğü gibi bulunan zoéal evredeki larvaların % 66.3 gibi büyük bir bölümünü I. evredeki larvalar oluşturmaktadır. II. evredeki larvalar ise toplam larvanın %12.4'ü oluştururken, III. (%3.4) ve IV.(%1.1) evreler düşüş göstermiştir. VI. (%5.6), VII.(%6.7) ve VIII. (4.5) evrelerde ise yavaş bir yükselme olmuştur. I. evrenin bulunurluğunun sıcaklık ve tuzlulukla doğrusal ilişkili olduğu ve yüzey suyu sıcaklığının üremeyi ve larval gelişimi etkilediği bilinmektedir. Çalışmanın gerçekleştiği dönem içinde yüzey suyu sıcaklığı 15.2 °C ile 31.5 °C sınırları arasında ölçülmüştür. Yumurtalık Koy' unda yüzey suyu sıcaklığı kış ve ilkbaharın ilk ayında (Mart) düşük , ilkbaharın diğer aylarında ve yaz aylarında ise yüksek ölçülmüştür. En düşük sıcaklık 0-10 m derinlikte ocak ayında (15.2 °C), en yüksek sıcaklık ise yine aynı derinliklerde ağustos ayında (31.5 °C) olarak saptanmıştır. Nisan ayından itibaren sıcaklık değerleri yükselmeye ve yaz aylarında ise en yüksek değerlerine ulaşmakta, Eylül den itibaren ise tekrar düşmeye başlamıştır (çizelge 1, Şekil 9). Ortalama yüzey suyu sıcaklığı ise 24.70 ± 4.42 °C olarak saptanmıştır.

Bir yıllık sürede aylık dönemlerle yapılan örnekleme çalışmalarında Nisan , Ekim ve Kasım aylarında örnekleme yapılamamıştır. 0-5 m derinliklerde sadece Ağustos ayı içerisinde I. ve II. evredeki bireyler bulunmuştur. Yılın diğer aylarında ise her hangi bir larva evresine rastlanılmamıştır. 5-10 m derinlik bölgesinde ise Ocak ve Şubat ayı dışındaki bütün aylarda yine ilk larval evrelerdeki (I. ve II.) bireylere rastlanılmıştır. Bu aylarda daha ileri zoéal evrelerdeki larvaların bulunmamasının sıcaklığın düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 10-20 m derinlik bölgesinde, Şubat-Ağustos süresince özellikle Mart ayında VII. evre, Ağustos ayında ise V. evre dışındaki bütün evreler örneklenmiştir. 20-50 m derinlik de ise Mart-Eylül süresince yine 10-20 m bölgesinde olduğu gibi V. evre dışındaki larval evrelere rastlanmıştır (çizelge 32).

Çizelge 32. Mayıs-1997-Mart-1998 Dönemlerinde Yumurtalık Koyu'nda Derinliklere Göre Mavi Yengeç Zoeal Larvalarının Aylık Bulunurluğu

Aylar	Derinlikler ve Larval Evreler			
	0-5 m	5-10 m	10- 20 m	20-50 m
Mayıs/97	---	I	I	I
Haziran	---	I	I, II	I, II, VI
Temmuz	---	I	I	I
Ağustos	I, II	I, VI	I, II, VI, VII, VIII	I, II, III, VI, VII, VIII
Eylül	---	I	---	I, II, III, IV, VI, VII
Ocak/98	---	---	---	---
Şubat	---	---	I	---
Mart	---	I, II	I, VII	I, VIII

Zoeal larvaların derinliklere göre yüzde dağılımı çizelge 33' de gösterilmiştir.

Çizelge 33. Mavi Yengeç Zoeal Larvalarının Yumurtalık Koy'unda Derinliklere Göre Yüzde Dağılımı (%)

Larval Aşamalar	Derinlikler		
	0-10 m	10-20 m	20-50 m
I	66.6	66.6	55.5
II	22.2	22.2	33.3
III	---	---	22.2
IV	---	---	11.1
V	---	---	---
VI	11.1	11.1	33.3
VII	11.1	22.2	33.3
VIII	---	11.1	22.2

Çizelge 33 incelendiğinde I. evredeki larvaların 0-10 ve 10-20 m derinlik bölgelerinde önemli çoğunlukta, 20-50 m derinlik bölgesinde ise az bir çoğunluk var olduğu, II. evredeki larvaların bütün derinliklerde az da olsa bulunduğu saptanmıştır. III. evredeki larvalara 0-10 ve 10-20 m derinliklerde hiç rastlanmamış, 20-50 m de ise az miktarda bulunmuştur. IV. evre için de durum aynı olmakla birlikte, 20-50 m de nadiren rastlanmıştır. V. evredeki larvalara hiçbir derinlikte rastlanılmamıştır. VI. Evredelikler 0-10 ve 10-20 m de nadiren , 20-50 m de az da olsa bulunmuştur. VII. zoeal evredeliklere 0-10 da nadiren, 10-20 ve 20-50 m de az miktarda; VIII. zoeal evre 0-10 m de hiç bulunmazken, 10-20 m de nadiren, 20-50 m de az miktarda rastlanmıştır. Tüm koy ele alındığında I. evre sürekli, II. evre çoğunlukla, III. evre

az, IV. evre nadiren, VI. evre çoğunluk, VII. evre önemli çoğunlukla, VIII. Evre az da olsa bulunmuş, V. evreye ise hiç rastlanılmamıştır.

Bu duruma göre Yumurtalık Koy' u Mavi Yengeçlerinin üreme işini Mart' tan başlayarak Eylül' e kadar sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca yumurtlama dönemi olan yaz ayları süresince, özellikle Ağustos ve Eylül aylarında bütün larval evrelere, özellikle yumurtalı bireylerin yoğun olarak örneklediği 10-50 m derinliklerde rastlanmıştır. Yapılan arazi çalışmalarında da Yumurtalık Koy' undaki bütün derinlik bölgelerinde yumurtalı dişiler elde edilmiştir. Yalnız 10-20 m derinliklerde (özellikle 12-15 m) daha yoğun elde edilmişlerdir. Larva verileri de doğal olarak bu durumu desteklemektedir. Üremenin olduğunun göstergesi olan I. zoeal evredeki larvalar da bütün derinliklerde bulunmuştur.

Çalışma dönemi boyunca megalopa evresinde bireyler örneklenememiştir. Bunun, örnekleme yönteminin yetersizliğinden kaynaklandığı sanılmaktadır.

Belirlenen larval evrelerden I. ve VIII. zoeal evreler şekil 52'de , VI. ve VIII. zoeal evreler ise 53'de verilmiştir.




I. evre




VIII. evre

Şekil 52. Mavi Yengeç' de I. ve VIII. Zoel Evreler



VI. evre



VII. evre

Şekil 53. Mavi Yengeç' de VI. ve VII. Zoeal Evreler

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

4.1. Tartışma

Araştırma konularıyla ilgili olarak elde edilen bulgular, konu sırasına göre aşağıdaki şekilde tartışılmıştır.

Su Özellikleri

Eylül 1996-Mayıs 1998 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmada saptanan en düşük yüzey sıcaklığı 0-10 m derinlik bölgesinde Ocak ayında 15.2 °C, en yüksek Ağustos 31.5 °C, ortalama sıcaklık ise 24.70 ± 4.42 olarak saptanmıştır (çizelge 1, Şekil 9). Ocak ayında elde edilen en düşük değer kış koşullarına, Ağustos ayında elde edilen en yüksek değer ise koy' a tatlı su girdisinin yok denecek kadar az olması ve bu dönemde bölgede tek su girdisi olan yağışların gerçekleşmemesine bağlanabilir. İskenderun Körfez' inde gerçekleşen diğer çalışmalara bakıldığında, İyidüvar (1986)'a göre Çölaşan (1974) yüzey su sıcaklığını 1940-1960 dönemi için ortalama 22.3 °C olarak, 1968-1972 dönemi için 21.7 °C' olarak saptamıştır. İyidüvar (1986) 'ın 1981-1984 döneminde İskenderun Körfez' inde gerçekleştirdiği çalışmasında, en düşük sıcaklık değerini Mart ayında, en yüksek yüzey su sıcaklığını ise Temmuz ayında 29 °C olarak saptamıştır. Avşar ve ark.,(1996)'nın Yumurtalık Koy' unda Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleştirdikleri çalışmalarında ise derinlik tabakalarına göre yüzey su sıcaklık değerlerini 0-10 m için 25 °C, 10-20 m de 24.6 °C ve 20-50 m için ise 23.2 °C olarak saptamışlardır. Polat (1997), İskenderun Körfez' indeki çalışmasında, yüzey suyu sıcaklık değerlerinin yıl boyunca 14.9 °C ile 29.2 °C arasında değişim gösterdiğini bildirmektedir. Yukarıda belirtilen çalışmalar ile bu çalışma ile belirtilen sonuçlar karşılaştırıldığında hemen hemen aynı dönemlerde gerçekleşen Polat (1997)'ın yaptığı çalışma ile benzerlik göstermektedir. Yine İyidüvarın (1986) çalışmasında bulunduğu en yüksek sıcaklık, bir önceki aya (Temmuz) rastlamaktadır. Ayrıca en düşük sıcaklık Mart olarak bildirilirken, bu çalışmada Ocak ayında bulunmuştur. Çevik (1998)'in bildirdiğine göre Temmuz-Ağustos aylarında 28-29 °C olan yüzey sıcaklığı, dibe doğru azalarak 19 °C ye inmektedir. Bu dikey tabakalaşma Ekim ayında rüzgarların etkisiyle ortadan kalkmakta ve özellikle Şubat ayında sıcaklık tekdüze bir durumda 16 °C olmaktadır. Bu çalışmada sadece Temmuz/97 ayına ait derinlik bölgelerine göre alınan dip suyu sıcaklığı ve tuzluluk değerleri bulunmaktadır. 0-10 m derinlik tabakasında ortalama dip suyu sıcaklığı 29 ± 0.07 °C, 10-20 m

de $28.15 \pm 0.21^{\circ}\text{C}$, 20-50 m derinlik tabakasında $28.50 \pm 0.14^{\circ}\text{C}$ olarak belirlenmiştir. Bu değerler yukarıda belirtilen 19°C dip su değerlerinden oldukça yüksektir. Aslında karşılaştırmanın yıllık alınacak ölçümlerle yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Burada amaç, yumurtalı dişi bireylerin elde edildiği aylardan biri olan Temmuz sıcaklık ölçümleri ile özellikle üreme dönemindeki dip suyu sıcaklığı hakkında az çok bir bilgi sahibi olabilmektir.

Yüzey tuzluluk ölçüm değerleri Ekim’ de $\%027.00$ ile en alt düzeye inerken, Ağustos ayında $\%038.77$ ’lik değerle çalışma döneminin en yüksek değerlerine çıkmıştır. Ortalama Yüzey Su tuzluluğu $\%032.76 \pm 5.39$ olarak saptanmıştır (çizelge 3, şekil 10). Ağustos ayında en yüksek tuzluluğun elde edilmesi artan buharlaşma ile tatlı su girdisi ve yağışların bu dönemde olmamasına bağlanabilir. Yüzey suyu tuzluluğu doğal olarak yağışların başlaması ile sonbahar ve kış aylarında düşük, yaz aylarında ise yüksek değerlerde olmuştur. Şubat ve ilkbahar aylarında tuzluluk değerleri alınmamış olması bu dönem için herhangi bir yorum yapılamamasına neden olmuştur. İyiduvar (1986), İskenderun Körfez’ i için en düşük ve en yüksek tuzluluk değerleri olarak sırasıyla Nisan ve Kasım için $\%036.3$ ve $\%039.3$ vermiştir. Salihlioğlu ve ark., (1990)’nın yaptıkları çalışmada ise , en düşük ve en yüksek tuzluluk değerleri sırasıyla Nisan ve Eylül için $\%038.8$ ve $\%039.3$ olarak ölçülmüştür. Polat (1997) 1994-1995 yılları itibariyle bu değerleri Eylül ve Ağustos ayları için sırasıyla $\%037.2$ ve $\%039.4$ olarak bildirmiştir. Özellikle Polat (1997)’ in, İskenderun Körfez’ i için bildirdiği yüzey su tuzluluk değerleri bulgularımızla çakışmaktadır. Yalnız çalışmamızda, en düşük tuzluluk değeri Polat’ inkinden bir ay sonra, Ekim ayı içinde ölçülmüştür (çizelge 3).

Büyüme ve Morfometri

1996-98 yılları arasında yaklaşık 20 ayda gerçekleşen çalışmada toplam 1355 adet Mavi Yengeç bireyi incelenmiştir. 295 adet ile popülasyonun $\%23.9$ ‘nu ergin erkek bireyler oluşturmaktadır (çizelge 5, şekil 13). Bu bireylerin ortalama 12.74 ± 2.77 cm karapas genişliğinde olduğu ve 3.70-18.60 cm karapas genişlik sınırlarında dağılım gösterdikleri saptanmıştır (çizelge 6). Popülasyonun $\%47.5$ ile büyük bir kısmını oluşturan ergin dişi bireylerin ortalama karapas genişliği 12.69 ± 2.33 cm olarak hesaplanmış, 2.0-18.10 cm karapaks genişlik sınırları içinde dağılıma göstermişlerdir. Yumurtalı dişilerde karapas genişliği ortalama 12.65 ± 2.10 cm olarak belirlenmiş, 4.90-19.00 cm genişlik sınırlarında dağıldıkları bulunmuştur (çizelge 6). İncelenen toplam 1355 adet bireyin $\%21.3$ ‘ünü

yumurtalı dişiler oluşturmuştur (şekil 13). İncelenen örneğin %7.3 gibi düşük kısmını oluşturan juvenil bireylerde ise, erkeklerin 3.20-9.50 cm genişlik sınırlarında ,ortalama 5.41 ± 1.78 cm, dişilerin ise 4.50-12.30 cm genişlik sınırlarında, ortalama 7.40 ± 1.78 cm karapas genişliğinde oldukları bulunmuştur (çizelge 6). Toplam juvenillerin ortalama karapas genişliği 7.18 ± 1.95 cm olup, 3.20-12.30 cm genişlik sınırları içinde dağılım göstermişlerdir. Juvenil erkek ve dişilerde Karapas genişliği açısından farklılık % 5 önem düzeyinde yapılan tek yönlü varyans analizinde önemli bulunmamıştır. Karapas genişliği (UKG) bakımından cinsiyetler arasında farklar önemli olmuştur ($F=10,98$ $P<0.05$). Bulunan farklılığın hangi cinsiyetler arasında olduğunu belirlemek için % 5 önem seviyesinde Duncan Çoklu Aralık testi uygulanmıştır. Buna göre erkek, dişi ve yumurtalı dişilerde farklılık önemli görülmez iken juvenil bireylerin diğer bireylerden farklı olduğu belirlenmiştir.

Archambault, Wenner ve Whitaker (1990) Charleston Körfez' inde (ABD) ki çalışmalarında, toplam 3.373 adet erkek bireyin 14-191 mm genişlik sınırlarında ve ortalama 97.6 ± 1.1 mm karapas genişliğinde olduklarını belirtmektedirler.

Montfrans, Ryer, Orth (1991) yine Chesapeake Körfez' inin kıyısız bataklık koyunda 10.000m^2 'lik alanda yaptıkları çalışmada, popülasyonun ortalama 799-1564 bireyden oluştuğunu ve bu popülasyonun büyük bir kısmının orta büyüklükteki 50-100 mm karapas genişliğine sahip bireylerden oluştuğunu bildirmişlerdir. Enzenrob, Enzenrob ve Bingel (1997) 1985-1995 yılları arasında Akdeniz kıyılarımızda 51 erkek (%45), 21 dişi (%19) ve 41 juvenil (%36) toplamışlar. İskenderun'dan başlayarak bütün Akdeniz kıyı ve lagünlerinde, Ege de ise Menderes lagününe kadar dağılım gösterdiklerini bulmuşlardır. İskenderun Körfez' inde juvenil ve yetişkin olarak iki grup için karapas genişliğini (KKG) en az 108 mm, en yüksek 151 mm olarak belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre saptadığımız karapas genişlik sınırlarının daha geniş olduğu görülmektedir (çizelge 6). Ancak bu farklılığın çalışmanın değişik bölgelerde yapılmasının yanı sıra, örnekleme farkından da kaynaklanabileceği söylenebilir.

Çalışmamızda juvenil bireylere Eylül/96, Mayıs, Temmuz, Ağustos/97 ve Mayıs/98 de rastlanılmıştır. Özellikle juvenil erkekler Eylül (%19.5) ve Mayıs (%15.9), dişiler ise Temmuz (%16.5), Ağustos (%14.8) aylarında en yüksek oranda bulunmuşlardır (Çizelge 5). Juvenil bireylerin %70.7 gibi büyük bir kısmı Yumurtalık Koy' unun bataklık olarak adlandırılan *Zostera* çayırları ile kaplı olan bölgesinden elde edilmiştir. Bunu %8.6 ile çamurlu, killi Kokar burnu' nun 2 mil içerisinde olan bölgeden; %6.9 ile silt-kumlu dip yapılı Kokar burnu, %5.2 ile çamurlu-siltli geçit ve en son %1.7 ile Arap boğazı izlemiştir.

Örnekleme istasyonlarına göre ortalama karapas genişlikleri, bataklık örneklerinde; 6.70 ± 1.76 (3.20-9.70), Kokar burnu örneklerinde ; 9.10 ± 1.62 (6.90-10.80), Kokar burnu içi örneklerinde ; 5.54 ± 1.38 (4.20-7.40), geçit örneklerinde ; 7.07 ± 2.05 (3.20-12.30) cm olarak bulunmuştur. Yapılan varyans analizine göre bu belirtilen örnekleme alanlarından kokar burnu örnekleri ile bataklık ve kokar burnu içindeki bölgeden elde edilen örneklerin karapas genişlikleri arasında fark önemli bulunmuştur ($P < 0.05$). Özellikle, en büyük juvenil bireyler kokar burnundan örneklenmiştir. Haddon, Hines ve Wiechert (1990) Rhode Nehri'nin alt haliç bölgesinde juvenil Mavi Yengeçlerin Mayısın ikinci yarısından, Ekim ayına kadar bulduklarını, haliç sisteminde beslenerek hızla büyüduklarını bildirmektedirler. Fitz ve Wiegert (1991), Sapelo adasında gel-git zonunda yer alan tuzlu bataklık alanlara Mavi Yengecin yerleşimini inceledikleri araştırmada, bu alanlarda su sıcaklığının $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ altına indiği kış aylarında olmadıklarını veya çok düşük yoğunlukta bulduklarını bildirmişlerdir.

Ergin dişi bireyler en yoğun (%84.1) Nisan/98 ayında bulunmuş bunu Aralık/97 (%77.8) ve Kasım/97 (%75.5) izlemiştir. Böylece ergin dişiler araziden, özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında yoğun olarak örneklenmişlerdir (Çizelge 5). Yumurtalı dişiler ise en yoğun olarak Eylül/97 (%49.4), Mart/98 (%31.1), Mayıs/98 (%29.0) aylarında örneklenmişlerdir. Araştırma dönemi boyunca araziden yoğun olarak yumurtalı dişiler Mart ayından başlayarak Eylül ayına kadar ki dönemde elde edilmiştir. Ergin erkek bireyler Ekim/97 ayında %93.8 gibi büyük bir oranda elde edilmiştir. Bunun oldukça yüksek çıkması, bu ay için incelenen örnek sayısının az olmasına ve örneklemenin dalyanda gerçekleşmesine bağlanabilir. Bu ayı, Şubat/97 (%79.3) ve Mayıs/97 (%70.2) izlemiştir (çizelge 5). Archambault, Wenner ve Whitaker(1990), juvenil dişileri Şubattan başlayarak azalan oranlarda Temmuz'a kadar, erkekleri ise Ocaktan başlayarak, dişilerde olduğu gibi Eylül'e kadar azalan oranlarda örneklemişlerdir. Araştırmacıların belirttiği ile elde ettiğimiz bulgular oldukça farklıdır. Çalışmamızda dişiler ve erkekler aynı dönemlerde Mayıs' tan Eylül' e kadar örneklenmişlerdir. Bu sonucun bir olasılık, elde edilen verilerin sadece trol verilerine dayanmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Aynı araştırmacılar, küçük yengeç bireylerinin trol çekimlerinde ilk kez Ekim ayında görüldüğünü ve daha sonra düzenli olarak sayısında ve boyutlarında artış olduğunu bildirmektedir. Her bir cinsiyet karapas genişlik dağılımı birbirini izleyen aylarda oldukça farklı elde etmişlerdir (%99 önem düzeyinde Kolmogorov-Smirnov Test). Ayrıca, büyümenin Aralıktan başlayarak yavaş şekilde Marta kadar sürdüğünü fakat su sıcaklığının artması ile birlikte yazın hızlı bir büyümenin gerçekleştiğini bulmuşlardır. Çalışmamızda ise gerek cinsiyet yönünden, gerekse bir birini izleyen ayların tamamında yıl

içinde farklılık bulunmamıştır. Sadece dişiler için, % 5 önem düzeyinde Mart-Nisan (K-S-Z=1.817), Mayıs-Haziran (K-S-Z=2.153), Haziran-Temmuz (K-S-Z=1.735) ve Kasım-Aralık (K-S-Z=1.396) da karapas genişliklerindeki farklar önemli bulunmuştur. Büyümenin en yüksek oranda ilkbahar ile yaz mevsimi süresince gerçekleşmiştir. Erkeklerde ise Eylül-Ekim (K-S-Z=1.565), Ekim-Kasım (K-S-Z=1.396), Temmuz-Ağustos (K-S-Z=1.378) arasındaki farklılık önemli bulunmuştur. Sonuçta büyümenin dişilerde ilkbahar ve yaz sonu , erkeklerde ise sonbahar ve yaz ortasında hızlı gerçekleştiği söylenebilir. Juveniller için ise karapas genişlik frekanslarında önemli farklılık Mayıs-Haziran da elde edilmiştir (Kolmogorov-Smirnov Test,%95). Yine aynı çalışmada araştırmacılar, pubertal evredaki erkeklerin yüksek oranda Mayıstan Hazirana kadar elde edildiğini ve yaz süresince azaldığını bildirmişlerdir. Dişilere ise Nisan, Mayıs, Haziran süresince rastlamışlardır. Van Engel (1958) Chesapeake körfezinde "pubertal molt"un Temmuzdan Eylül'e kadar tamamladığını bildirmektedirler. Van Engel (1958) 'in bildirdiğine göre Tagatz (1968 a) St. John's nehrinde 2 çiftleşme periyodu bulmuştur. Birincisi erken ilkbahar yaz arasında, ikincisi de sonbaharın sonlarında gerçekleşmiştir.

Shirley (1990), Maryland'ın Rhode (ABD) Nehrinde yaptığı çalışmada, erkeklerin büyük çoğunluğunun nehir ile ilişkili çamurlu koylarda kabuk değiştirdiğini, dişilerin ise nehrin alt haliç sisteminde kalarak çiftleştiğini ve kabuk değiştirdiğini belirtmiştir.

Çalışmamızda pubertal dişi ve erkek bireyler Mart, Mayıs ve Eylülde araziden örneklenmişlerdir. Özellikle dişilerin Mayısta yoğun olduğu gözlenmiştir. Nisan ayında örnekleme yapılamadığı için bu ay için herhangi bir yorum yapılamamıştır. Ayrıca, arazi çalışmalarında çiftleşmenin ilkbaharda Mart-Nisan aylarında gerçekleştiği gözlenmiştir.

Havens ve McConaugh (1990), dişilerin larval gelişimlerinde 7-8 kez, juvenil iken 18-20 kez kabuk değiştirdiklerini bildirmektedirler. Juvenil' den ergine geçiş sırasındaki kabuk değişimi "terminal" veya "final molt" olarak bilinmektedir. Dişiler, final kabuk değişim evresinde kabuk henüz yeterli sertleşmemiş iken çiftleşmektedirler. Bu terminal kabuk değişiminde, dişinin 2-4 yıllık yaşamında sadece bir-kaç saatlik çiftleşme gerçekleşmektedir. Kabuk değişim sıklığını çevresel faktörlerden sıcaklık, ışık, tuzluluk gibi fizyolojik faktörler ile besin ve regenerasyon etkilemektedir.

Archambault, Wenner ve Whitaker (1990), 3.522 adet juvenil dişi bireyden %96.6'sının avlanma boyu sınırı (12.7 cm) nın altında, 2.718 adet ergin dişinin %10.6'sının bu sınırın altında olduğunu belirtmişlerdir. Ülkemizde ise Tarım ve Köy işleri bakanlığının yayınladığı su ürünleri avcılığını düzenleyen sirkülerinde Mavi Yengeç için avlanabilir en

küçük boy, 7 cm karapas genişliği bildirilmiştir (Anonim, 1998). Buna göre örneklemelerimizde toplam 850 adet dişinin yaklaşık % 1.76'sı, 296 adet erkek bireyin % 4.05 ve juvenillerin % 8.10'u avlanabilir boyun altında bulunmuştur. Ülkemiz koşullarında belirlenen avlanabilir boy değerinin, yukarıda adı geçen araştırmacıların bildirdiği sınır değere göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bunda da ağ göz açıklığının farklılığı ile Mavi Yengecin bölgemiz koşullarında ekonomik olarak tüketilip, değerlendirilmemesi nedeniyle uygun ağ göz açıklığı ve modelinin belirlenmemesinin neden olabileceği düşünülmektedir. Bu konuda ayrıca üreme dönemi , eşeyssel olgunluk büyüklüğü ile ilgili çalışmaların yeterli düzeyde bulunmamasının da etkili olabileceği göz ardı edilmemelidir. Fitz ve Wiegert (1991) Sapelo adasında gel-git zonunda yer alan tuzlu bataklık alanlara Mavi Yengec'in yerleşimini inceledikleri araştırmada, bu alanlarda ≤ 80 mm karapas genişliğindeki juvenillerin Mart veya Nisan aylarında gel-git zonuna doğru hareket ettiklerini bildirmişlerdir. Fakat gel-git zonundaki yengeç yoğunluğunda büyük juvenillerin ve yetişkinlerin (>80mm KG) 2.5 yıllık çalışmaları süresince yaz aylarında baskın olduğunu saptamışlardır. >125 mm 'lik KG sahip bireylerin büyük çoğunluğu Mayıs ve Haziranda gel-git zonunun altından örneklenirken gel-git zonu içerisinde 51-80 mm KG' lik yengeçler Haziranda, 81-125 mm KG dekiler ise Ağustosta örneklediklerini bildirmişlerdir. Ryer, Montfrans ve Orth (1990), çayır yataklarında ortalama 77 mm, bataklık koy' da ise 88 mm karapas genişliğinde bireyler örneklemiştir. 30 mm den daha küçük olan bireyler ise örneklenememiştir. Araştırmacılar ayrıca, yengeç büyüklüğü 10 Temmuzda ortalama 73.0 mm iken, 1 Eylül de 95.9 mm ye ulaştıklarını ve çayırılık bölgelerdekilerin bataklık koyda bulunanlardan daha ufak bireyler olduğunu bildirmişlerdir.

Enzenrob, Enzenrob ve Bingel (1997) erkek, dişi ve juvenil bireylerde uzun karapas genişliği, kısa karapas genişliği ve karapas uzunluğu arasında doğrusal ilişki bulmuşlardır. Ayrıca erkek ve dişi bireyler arasında uzun karapas ve kısa karapas genişliği regresyon doğrusu eğimleri için bir farklılık elde etmediklerini bildirmişlerdir ($F_{0.05} = 3.92 < 43$). Çalışmamızda Karapas Uzunluğu ile saptadığımız tüm morfometrik ölçümler arasında doğrusal ilişki hesaplanırken, vücut ağırlığı ile arasındaki ilişki üssel bulunmuştur (Çizelge 8, şekil 16,17,18,19). Karapas uzunluğu değişimi ile ağırlık dışındaki ölçümlerdeki değişim yönü aynı bulunmuştur. Karapas uzunluğu ile tüm biyometrik ölçümler arasındaki bağıntılar önemli olmuştur (çizelge 9,10) ($P < 0.05$). Vücut kısımlarının büyüme tipi, Karapas uzunluğuna diğer morfometrik verilerin $Y = a \cdot X^b$ denklemine uygulanmasıyla elde edilmiştir (Hartnoll, 1978). $b > 1$ pozitif allometri göstergesi olup uygulanan vücut kısmının karapas

uzunluğundan daha hızlı büyüdüğünü, $b=1$ izometrik büyüme göstergesi olup, her iki vücut kısmının eşit oranda büyüme gösterdiğini, $b<1$ negatif allometri göstergesi olup uygulanan vücut kısmının karapas uzunluğuna oranla büyümesinin daha yavaş olduğunu göstermektedir. Çizelge 4.8 de verildiği gibi, dişilerde Kısa Karapas Genişliği (KKG), Uzun Karapas Genişliği (UKG), Abdomen Genişliği 4 ve 6. Segment (DAG4 ve DAG6) pozitif allometri gösterirken; Vücut Derinliği (VD) negatif allometri göstermektedir. Gerçekten de krustaselarda dişilerin abdomen segmentlerinin oldukça yüksek pozitif allometri gösterdikleri bilinmektedir (Hartnoll, 1978). Erkek bireylerde sadece Kısa ve Uzun Karapas Genişliği pozitif allometri gösterirken; Vücut Derinliği ve Abdomen Genişliği negatif allometri göstermektedir. Bu da bu kısımların karapas uzunluğuna oranla daha yavaş büyüdüğünü göstermektedir. Bu durumun eşeyssel dimorfizmden kaynaklanabileceği söylenebilir. Juvenillerde ise dişi ve erkek karışık Uzun Karapas Genişliği, pozitif ; Kısa Karapas Genişliği, Vücut Derinliği negatif; Dişilerde 6. Abdomen Segment Genişliği pozitif ;4. Segment Genişliği ile erkeklerde Abdomen Genişliği negatif allometri büyüme göstermektedir. Toplam populasyon incelendiğinde ise Kısa Karapas Genişliği, Uzun Karapas Genişliği, dişilerde 4. ve 6. Segment Genişliğinde pozitif ; Vücut Derinliği ve erkek Abdomen Genişliğinde negatif allometri belirlenmiştir. Bu durumda karapas genişlikleri ve dişilerde abdomen genişliğindeki artışlar, karapas uzunluğuna oranla daha yüksek olurken; vücut derinliği ve erkeklerde abdomen artışının karapas uzunluk artışına oranla daha yavaş gerçekleştiği söylenebilir (çizelge 8). Sonuç olarak hesaplanan büyüme biçimlerinin, yengeçlerin bilinen yapısal özellikleriyle uyum içinde olduğu kabul edilebilir. Karapas Uzunluğu ile bütün kısaç boyutları arasında doğrusal ilişki hesaplanmıştır (çizelge 12, şekil 20,21,22). Büyüme biçimine bakıldığında , dişilerde büyük ve küçük kısaçların uzunluklarında (propodal Uzunluk (PU)) pozitif; diğer bütün boyutlarda propodal Derinlik (PD), propodal Genişlik (PG) de negatif allometri, erkeklerde büyük ve küçük kısaçların bütün boyutları ile Karapas Uzunluğu arasında pozitif allometri bulunmuştur. Erkek ve dişi karışık juvenillerde ise büyük kıskaçın derinliği ve genişliğinde negatif allometri, büyük ve küçük kıskaçın diğer bütün boyutlarında pozitif allometri bulunmuştur. Populasyon genel olarak ele alındığında büyük ve küçük kısaç boyutlarının pozitif allometri gösterdiği ve Karapas Uzunluğuna oranla kısaç boyutlarında daha fazla artış olduğu ileri sürülebilir (Çizelge 12). Özellikle Hartnoll (1978)'in bildirdiği gibi, erkek bireylerin kıskaçları yüksek allometri göstermektedirler. Mavi Yengeç erkek bireylerinde, özellikle büyük kıskaç uzunluğunda yüksek pozitif allometri hesaplanmıştır. Bu da eşeyssel olgunluğa ulaşma

büyüküğünün belirlenmesi ve eşeyssel farklılık açısından oldukça önemlidir. Dişilerde ise 4. Abdominal Segment Genişliği önemli bir ölçüt sayılır. Bilindiği gibi yengeçlerde erkek bireylerin kısıkaçları dişilere göre oldukça güçlü yapıdadır. Oluşturulan regresyon doğrusu yardımıyla dişilerin eşeyssel olgunluğa Karapas Uzunluğu (KU) $Ln 1.8 \text{ cm} = 6.05 \text{ cm}$ 'den sonra ulaştığı saptanmıştır (şekil 23). Arazi örneklemelelerinde ergin dişilerin ortalama Karapas Uzunluğu $5.59 \pm 0.85 \text{ cm}$ hesaplanmıştır. Erkek bireylerin aynı yöntemle eşeyssel olgunluğu $Ln 1.5 = 4.48 \text{ cm}$ karapas uzunluğundan sonra ulaştığı bulunmuştur (şekil 24). Arazi örneklemelelerinde de spermatoforum bulunduğu üreme yeteneğine sahip en küçük bireyin karapas uzunluğu 4.70 cm ölçülmüştür.

Olmı III ve Bishops (1983) cinsiyet, cinsel olgunluk, kabuk değişim evresi ve karapas formunun boy-ağırlık ilişkisi denklemini etkilediğini bildirmişlerdir. Olgun erkek bireylerin benzer büyüklükteki juvenil erkeklerden daha ağır olduklarını, bunun tersine dişilerde ise aynı boyuttaki ergin bireylerin juvenillere göre daha düşük ağırlıkta olduklarını saptamışlardır. Her iki cinsiyette de ara kabuk değişim (C) ve ilk kabuk değişimi (D) evrelerinde , son kabuk değişim evresinden (A ve B) daha fazla ağırlık kazandıklarını, dişilerde ise ilk kabuk değişim evresinde, ara kabuk değişim evresi den daha fazla ağırlık kazancı olduğunu belirtmektedirler.

Üreme Biyolojisi

Wenner (1989) tarafından yapılan çalışmada cinsiyet oranında dişiler daha daha baskın bulunmuş, dişi ve erkek cinsiyet oranı 1.9: 1 oranında elde edilmiştir. Archambault, Wenner ve Whitaker (1990), Cinsiyet oranı homojenliğini tuzluluk sınıfları, aylar ve yıllara göre G-test ile incelenmişlerdir. Trol örneklemelelerinde genellikle dişilerin baskın olduğu, bütün tuzluluk sınıflarında 1:1 oranından oldukça farklı ve dişi-erkek oranını 0.95:1 ila 2.53:1 sınırlarında, az olan erkek baskın oranını belirgin olarak en düşük Ağustos ayında bulmuşlardır. Ayrıca araştırmacılar trol çekimlerinde dişilerin baskın durumda olmasına rağmen av istatistiklerinde yakalananların $\frac{3}{4}$ 'ünü erkek bireylerin oluşturduğu belirtilerek bu farklılığın, ergin dişilerin derin suları tercih ederek geniş alanlara dağılım göstermesinden kaynaklandığını bildirmişlerdir.

Montfrans, Ryer ve Orth (1991), Chesapeake Körfez' inin aşağı kıyısız bataklık koyunda Mavi Yengecin populasyon dinamiğini incelemişler, erkek:dişi cinsiyet oranını %47 ve 53 yaklaşık 1:1 oranın da elde etmişler ve yapılan Ki-kare testi ile farklılık olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda ise 97 yılının Şubat ve Ekim ayı dışındaki aylık örneklemelelerde

dişilerin baskın olduğu görülmektedir (çizelge 16). Bu dişi:erkek oranında örnekleme ayları arasında farklılık önemli olmuştur ($\chi^2 = 416$ $df=38$ $P<0.05$). Populasyon için cinsiyet oranı (dişi:erkek) $851:296=2.9:1$ olarak saptanmıştır. Bütün yıl boyunca aylık bulunan cinsiyet oranı 1:1 oranından oldukça farklı elde edilmiştir. Aylar temel alındığında dişi-erkek oranı 0.07:1 ila 14.5:1 sınırları arasında bulunmuştur. En az erkek birey ilkbahar aylarında elde edilmiştir (Çizelge 16). Dişilerin baskın çıkmasının, Wenner ve Whitaker (1990)'ın belirttiği gibi, örneklemlerin büyük bir kısmının trol ile derin ve tuzlu ($\%032.76 \pm 5.39$) sularda yapılmasından kaynaklandığı söylenebilir.

Wenner (1989) Güney Karolayna' da ergin dişiler içinde döllenmemiş bireyleri belirlemeye çalışmıştır. Bu bireyler pubertal molt'u tamamlamış olan bireylerdir. Mavi Yengeç'lerin erkek bireyleri hızlı bir şekilde son üç kabuk değişimi süresince dişilerle birden fazla çiftleşebilmektedirler. Araştırmacı, çiftleşmemiş ergin dişilerin oranları bütün yıl içinde benzer bir dağılım gösterdiğini, döllenmemiş dişi sayısının ayrıca incelenen alanlarda farklı olmadığını saptamıştır. Ayrıca, döllenmemiş dişi bireylerde resaptakulum seminisin küçük, beyaz ve ince olduğu, sperm veya spermatofor bulunan resaptakulum seminislerin ise oldukça şişkin oldukları belirtilmiştir. Ancak, resaptakulum seminisin bu durumunun gonad gelişimine bağlı olmadığı bildirilmiştir. Çalışmada araştırmacı, gonad gelişim evrelerini de incelenmiş ve yıl içerisinde istatistiksel açıdan benzer bir dağılım gösterdiklerini bulmuştur. Diğer yandan çalışmada, ileri olgun gonadların Şubat' tan Nisan' a kadar baskın durumda olduğu, Ağustos' da çoğu bireyin yumurtalı, olgunlaşmamış, vitellogenesis evreli oldukları ve Eylül' de artış gösterdikleri, ara gelişmiş evreli yumurtaların ise Kasım ve Aralık' ta baskın oldukları belirtilmiştir. Çalışmamızda ise Çizelge 17 de görüleceği gibi 1996 yılı için olgun bireyler Eylül ayında, 1997 yılında Mart ayından Kasım ayına kadar geçen dönemde örneklenmiştir. Nisan ayı içinde örnekleme yapılamadığı için herhangi bir yoruma gidilememiştir. 1998 örneklemlerinde Ocak ve ilkbahar ayları içinde olgun bireylere rastlanılmıştır. Araştırmanın yapıldığı yıllar birlikte değerlendirildiğinde, olgun bireyler Ocak/98 dışında Mart' tan başlayarak Eylül' e kadar ve hatta Ekim ayı içinde de gözlenmiştir (çizelge 17). I. gelişim evresindeki ovaryumlara sahip dişi bireylere 97 yılı içinde Şubat, Mart ve 98 yılının Şubat ayında rastlanılmamıştır. Olgunlaşmaya başlamış ve olgunlaşan ovaryumlu bireylere ise bütün aylık örneklemlerde bulunmuştur. Sonbahar ve kış aylarında ileri olgun ovaryumlu sahip bireyler görülmemektedir. İlkbahar ve yaz aylarında ise olgun ovaryumlu dişilere rastlanılmıştır (çizelge 17). Wenner (1989), araştırmacı ileri olgun gonadların Şubat ayından Nisan' a kadar baskın olduğunu bildirmektedir. İskenderun Körfez' inde ise ileri olgun

gonadlara ise Mart' tan başlayarak Eylül' e kadar daha geniş bir dönemde rastlanılmıştır. Sonuçta aylara göre bu farklılığın %5 önem düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır ($\chi^2 = 332$ $df=54$). Gonad gelişim evrelerine göre Karapas Genişliği ($F = 70.469$ $df=488$ $P<0.05$) ve Karapas Uzunluğu ($F = 74$ $df=638$ $P<0.05$) arasındaki farklar istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. Buna göre Karapas Genişliği ve Uzunluğu arttıkça gonad gelişiminin de arttığı ileri sürülebilir.

Çalışma süresince, dişilerde hesaplanan GSI değerleri, Mavi Yengeç' in İskenderun Körfez' inde üremeye Mart ayında başladıklarını ve Eylül sonuna kadar devam ettiklerini göstermektedir (Şekil 25). Erkek bireylerde üreme bütün bir yıl boyunca gerçekleşmektedir. Erkek bireylerde üreme olgusunun en yüksek oranda Temmuz ve Ekim ayların arasında gerçekleştiği belirlenmiştir (Şekil 25). Dişi ve erkek bireylerde en yüksek kondisyon değerleri Mayıs/97 , en düşük değerler dişilerde Kasım/97 ve Mart/98, erkeklerde Ağustos /97 aylarında bulunmuştur (çizelge 19). Çalışmanın gerçekleştiği dönem için geçerli olmak üzere dişiler için ortalama kondisyon değeri 5.26 ± 1.27 , erkekler için ise 7.42 ± 1.29 olarak saptanmıştır. Buna göre erkek bireylerin dişilere göre daha iyi beslendikleri ve daha yapılı bir vücuda sahip oldukları belirtilebilir. Bu farklılık önemli bulunmuştur. Dişi bireylerin üremeye başladıkları Mayıs ayında en yüksek olan kondisyon değeri yaz mevsiminde üreme işlevinin yoğunlaşmasına bağlı olarak düzenli bir düşüş göstererek Ağustos ayında en düşük değere ulaşmıştır. Daha sonra aynı düzeyde sürmüştür. (Şekil 26). Erkek bireylerde ise Kasım, Aralık ve Ocak aylarında en düşük kondisyon değerleri saptanmıştır. Bu durum su sıcaklığının düşmesine bağlı olarak besin alınımının yavaşlamasına dayandırılabilir (şekil 27). Ayrıca, erkek bireylerde en yüksek Mayıs ayında elde edilen kondisyon değeri, GSI değerlerine uygun olarak üreme döneminde (Temmuz-Eylül) azalmaya başlamış ve üreme olgusunun en yüksek olduğu Ağustos ayında en düşük bulunmuştur (çizelge 19).

Wenner (1989), şişkin resaptakulum seminisleri gelişmiş ve gelişmemiş gonadlarda, ince resaptakulum seminisleri ise ileri gelişmiş gonadlarda yüksek oranda bulmuştur. Resaptakulum seminisin de sperm veya spermatofor bulunmayan 37 bireyin %51'inin ara gelişen, %38'nin de ileri gelişen gonadlara sahip olduğunu belirtmektedir. Mayıs' tan Ocağa kadar şişkin resaptakulum seminis baskın durumda iken Şubat' tan Nisan' a kadar ince resaptakulum seminislerin baskın oldukları bildirilmektedir. Söz konusu çalışmada, ergin dişilerin %97 'si döllenmiş bulunmuş, ergin populasyondaki çifileşme davranışının yüksek oranda şişkin resaptakulum seminislerin görüldüğü Mayıs-Haziran ve Ağustos' tan Ocağa kadarki dönemlerde görüldüğü belirtilmiştir. Bu aylar süresince gelişmemiş, gelişen ve orta

gelişmiş yumurta evreleri baskın durumda bulunmuştur. Ayrıca, ince resaptakulum seminis oranında geç sonbahar ve Nisan boyunca artış olduğu, yumurtalı dişilerin Mart ayından Eylül'e kadar görüldükleri, en yüksek değere ise Nisan da ulaşıldığı, bu aylar süresince yumurtaları dölleyebilecek serbest spermlerin resaptakulum seminis içinde buldukları belirtilmiştir. Çalışmamızda ise incelenen ergin dişilerin gonad gelişimlerine bakıldığında, her dört gelişim evresindeki bireylerde de ince ve şişkin resaptakulum seminisler belirlenmiştir (çizelge 20). Olgunlaşmamış evredeki bireylerin %26.76, olgunlaşmakta olanların %17.73, olgunlaşanların %23.47, olgun evredeki bireylerin ise % 38.1 'inde resaptakulum seminislerin de sperm veya spermatofora rastlanılmamıştır. İnce resaptakulum seminis yüzdesi en düşük %17.73 ile 2. evredeki olgunlaşan bireylerde, en yüksek değer ise %38.1 ile olgun evredeki bireylerde görülmüştür (şekil 33). Ayrıca, resaptakulum seminis durumu ile gonad gelişim evreleri arasında farklar önemli bulunmamıştır ($\chi^2 =5$ $df=4$ $P>0.05$). İncelenen 357 ergin dişinin %21.85 'nin resaptakulum seminisinde ne spermatofor, ne de sperm' e rastlanılmamış %78.15 gibi büyük bir oranının ise döllemiş oldukları saptanmıştır. Bu oran, Wenner (1989)'in Güney Karolayna' da yaptığı çalışmadan düşük olup, bunun nedeni olarak popülasyondaki dişilerin baskın olması sonucu erkek oranının düşük olması dişilerin yüksek oranda döllememesi gösterilebilir. Şekil 29'da verildiği gibi bütün aylarda döllemiş dişi birey oranı yüksektir. En yüksek döllememiş dişi oranı Aralık/96 (%81), Ağustos/97 (%60) ve 98 yılı içinde ise Mart (%30), Nisan (%38)ve Mayıs (%35) ayında elde edilmiştir (Çizelge 20). Ayrıca incelemelerde Ağustos ayındaki bireylerin büyük bir kısmının ileri olgunlaşmış gonadlara sahip bireyler olduğu bulunmuştur. Bütün dişilerin döllemiş oldukları aylar ise 1997 yılının Mayıs, Ekim, Aralık ayları ve 1998 yılının ise Ocak ayıdır (çizelge 20). Bu durum, belirtilen aylarda örneklenen birey sayısının azlığından kaynaklanabileceği gibi, bu ayların çiftleşme dönemini izleyen aylar olmasından kaynaklanabileceği unutulmamalıdır.

Wenner ve Dauherty (1990) 'in yine güney Karolayna' da (ABD) gerçekleştirdikleri benzer konulu çalışmalarında, Mavi Yengeç avcılığının erkek bireyler üzerinden gerçekleştiğini ve bunun döllememiş dişi sayısını dolaylı olarak da larva sayısında azalmaya neden olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar, sperm veya spermatofor bulunmayan resaptakulum seminisleri ufak ve gevşek yapılı olarak tanımlamışlardır. Bu durumdaki resaptakulum seminislere sahip dişilerde gelişmiş ovaryumlara rastlanılmıştır. Bu durum bizim sonuçlarımızda da görülmektedir. Söz konusu çalışmada araştırmacılar, bu durumdaki dişilerin yıllık üreme dönemlerini uzattıkları ve en az iki kez yumurtlamak için çiftleştikten sonra spermleri depo ettiklerini belirtmişlerdir.

Archambault, Wenner ve Whitaker (1990)'in Charleston Liman' ın da (ABD) yaptıkları çalışmada yumurtalı dişileri Nisan ayından Ağustos ayına kadar bulmalarının yanında Mart ayının başında ve Ekim aylarında da az miktarda toplamışlardır. En çok yumurtalı dişi bireyi ise Temmuz ayında elde etmişlerdir. 14 °C altındaki su sıcaklıklarında ve %10 tuzlulukta yumurtalı dişilerin yakalandığını bildirmişlerdir. Yumurtalı dişilerin 6/9 'u, hemen liman ağız içerisinde 7-12 m derinliklerden elde etmişlerdir. Yine aynı araştırmacılar, Van Engel' in yaptığı çalışmaya dayanarak dişilerin Mayıs ve Haziranda yumurtladıklarını fakat larvaların Ağustos' ta yumurtadan çıktıklarını bildirmişlerdir. Söz konusu çalışmada, terminal molt evresindeki dişilerin ilkbahar ile yazın başlarında ve sonbahar ortalarında bulmalarına dayanarak çiftleşmenin bu zamanlarda gerçekleştiğini söylemektedirler. Ayrıca, Tagaz (1968)'in St. John's Nehrinde biri ilkbahar diğeri sonbahar olmak üzere 2 çiftleşme zamanı bulunduğu aynı araştırmacılar tarafından bildirilmektedir. Çalışmamızda da aynı dönemler saptanmıştır.

Havens ve Mcconaugha (1990)'nın Chesapeake Körfez' inde (ABD) inceledikleri populasyonun yumurtlama işlevinin Mayıs' ta başladığını ve en yüksek değere ulaştığını ve Ağustos' ta kadar devam ettiğini bildirmektedirler.

Jones ve Ark.(1990), Chesapeake Körfez'inde (ABD) 1986-87 yıllarında yaptıkları çalışmada ise şu sonuçları elde etmişlerdir: 1986 yılında Temmuzdan Eylül ayına kadar incelenen yumurtlayan dişi stoğu 8-9 Temmuzda 10^5 ile en düşük, 30 Temmuz-1 Ağustos' ta $9.3 \cdot 10^5$ ile en yüksek bulunmuştur. Yaz mevsimi süresince yumurtlama stoğunun büyüklüğünde önemli farklılıklar saptamışlardır. 1987 yılında ise stok yoğunluğunda oldukça farklılıklar görüldüğü, en düşük yoğunluğun $1.4 \cdot 10^5$ ile Temmuz sonlarında, $1.5 \cdot 10^6$ ile Ağustos sonlarında olduğu bildirilmiştir. Bu yıl içerisinde iki pik noktası görüldüğü, bunlardan birincisinin Mayıs, Haziran başları, ikincisi ise (en geniş olan) Ağustos sonları olduğunu bildirmişlerdir. 1987 de yumurtlayan dişi stoğundaki yoğunluğun 1986 yılındaki yoğunluğun %16 'sını oluşturduğunu bildirmişlerdir. Söz konusu çalışmada araştırmacılar, embriyo gelişim evrelerinin yoğunluğunu da belirlemişlerdir. 1986 yılında 1. evredeki (Sarı yumurtalı) dişi birey yoğunluğundaki artışı yaz başlarında, 2. evredeki (portakal renkli yumurtalı) Temmuz sonu Ağustos başı, 3. (Kiremit renkli yumurtalı) ile 4. (Kahve renkli yumurtalı) evredeki Ağustos ayı ortaları, 5. evredeki (Siyah yumurtalı) Temmuz ortalarında ve Eylül' ün sonları ile Ekim başlarında bulmuşlardır. 1987 yılında ise 1. evredeki bireylerin yoğunluğundaki artış Temmuz' dan Eylül sonuna kadar, 2. evredeki Mayıs sonu ile Temmuz' un sonundan Eylül' ün başında kadar, 3. evredeki Temmuz ve

Ağustos' ta ,4. evredekiler Temmuzun sonundan Ağustos' kadar, 5. evrede ise Haziranın başları ile Ağustos' ta bulmuşlardır.

Perry ve Macilwain (1986), Meksika Körfez'indeki Mavi Yengeç populasyonunda yumurtlamanın ilkbahardan sonbahara kadar haliç ve kıyılarda gerçekleştiğini bildirmişlerdir.

Prager ve ark.,(1990) Cheapeake Körfez'inde incelenen yumurtalı bireylerin ortalama karapas genişliğini 14.7 ± 1.8 cm, ortalama yumurta verimliliğini ise $3.2 \cdot 10^6 \pm 1.6 \cdot 10^6$ yumurta olarak bildirmişlerdir. Yumurta verimliliğinin karapas genişliği ile ilişkili olduğunu , yumurta gelişiminin ise ilişkili olmadığını belirterek, 1986 için ortalama yumurta verimliliği $2.6 \cdot 10^6$ yumurta, 1987 için ise $4.0 \cdot 10^6$ yumurta, yumurta verimliliği ve karapas genişliği arasındaki ilişkiyi $F(10^6) = -2.25 + 0.38 W$ olarak bulmuşlardır. Bölgemiz populasyonunda ise yumurtalı dişiler 96-97 yıllarındaki örneklemelerde Mart ayından başlayarak Eylül ayının sonuna kadar elde edilmiştir. Şekil 34 'de görüleceği gibi en yüksek yumurtalı dişi bireyler Mayıs' tan başlayarak bütün yaz ayları süresince yoğun olarak örneklenirken özellikle Temmuz ayında en yüksek miktar elde edilmiştir. İkinci pik ise Ağustos sonu Eylül ayında saptanmıştır. İlk gelişim evresindeki (sarı renkli) bireyler en yüksek Temmuz, Mayıs ve Mart 98 aylarında , ikinci evreli (portakal renkli) Ağustos-Eylül, üçüncü evreli (kiremit-kahve renkli) Eylül ayında son evreli (siyah) dişi bireyler ise bütün aylara bulduysa da en yüksek yaz ayları özellikle Mayıs ayında elde edilmiştir (şekil 34). Buna dayanılarak İskenderun Körfez' i Mavi Yengeç populasyonunda yumurtlamanın Mart ayından başlayarak Ekim ayına kadar sürdüğü söylenebilir (çizelge 22, şekil 34). Yumurtalı bireylerin ortalama karapas genişliği 12.65 ± 2.10 ; en düşük 4.90, en yüksek ise 19.00 cm bulunmuştur. Karapas uzunluğu ise ortalama 5.52 ± 0.76 ; en düşük 2.40 , en yüksek 7.20 cm ölçülmüştür (çizelge 6). Ortalama yumurta verimliliği $1.876.969 \pm 1.165.659$ olarak saptanmıştır. En düşük değer 243.666 en yüksek ise 7.030.000 adet olarak bulunmuştur. Diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında yumurta verimliliği düşük bulunmuştur. Bunun Yumurtalık Körfez'inde populasyonun uygun çevresel koşulları bulması nedeniyle diğer populasyonlara göre daha erken eşeyssel olgunluğa ulaşmasına ve küçük boyda yumurtlamasına bağlayabiliriz (çizelge 6). Şekil 40 (e) 'de verildiği gibi en yüksek sayıda yumurtalı dişiler 10 m derinlikten sonra özellikle 12-15 m derinlikte elde edilmiştir. İskenderun Körfez' i için bulduğumuz yumurta verimliliği ile ağırlık, karapas genişliği, karapas uzunluğu ,4.ve 6. segment genişliği ilişkisi sırasıyla Yumurta verimliliği $F=801749.W^{0.005}$; $F=250726.KKG^{0.175}$; $F=180648.KU^{0.384}$, $F=167745.DAG4^{0.522}$ ve $F=311148.DAG6^{0.140}$ şeklindedir (Şekil 39).

İskenderun Körfez' i populasyonu için saptanan yumurtlama dönemi yukardaki çalışmalarda belirtilen dönemler ile benzer durumdadır. Yalnız İskenderun Körfez' i özellikle çalışmamızın yoğun olarak gerçekleştiği Yumurtalık Koy' unun özellikle yaz aylarında tropikal yapı kazanması ve sıcaklığın yüksek olması nedeniyle üreme dönemleri diğer çalışma yapılan bölgelerden daha uzun bir dönemi kapsadığı görülmektedir.

Archambault, Wenner ve Whitaker (1990), Charleston Liman' ında (Güney Karolayna) Mavi Yengeç erkek bireylerinin işlevsel üreme yapısına erken yaz süresince ve bunu izleyen sürede (yumurtadan çıktıktan 11 ay sonra) ulaşırken dişilerin bunu izleyen sonbahar veya ilkbaharda olgunlaştıklarını (açılımdan 15-20 ay sonra) bildirmişlerdir. Ayrıca, Charleston Limanı populasyonundaki erkek bireylerin çoğunun erken yazda ergin durumda olduğu ve en az oranda juvenil erkeklerin Ocak ve Eylül süresince, en yüksek oranda Pubertal erkek bireyin Mayıs'tan Hazirana kadar yakalandığı fakat yaz aylarında azalma olduğu belirtilerek erkeklerin olgunluğa yumurta çıkışından 11-12 ay sonra ulaştığı bildirilmiştir.

Van Engel (1990) Erkek Mavi Yengeçlerde yetişkin evreye geçişteki dış ve iç yapıyı araştırmış ve 52 ile 125 mm karapas genişliğindeki erkek bireylerde abdomen ve sternumun kaynaşmasını 4 kombinasyon şeklinde tanımlamıştır. Bunlar Grup 1: 3. segmentten 6. segmente kadar yan sınırları sternal oyuk içerisinde girmiştir. Abdomeni serbest bırakmak için güç gereklidir. Sternum üzerinde segmentlerin parçaları bulunmaktadır. Grup 2: 3. segmentten 5. segmentin kenar sınırları sternal oluk sınırlarına yerleşmektedir. 6. segment sternuma yerleşmemiştir. Sternal tüberküllere bağlanmış olabilir. Abdomenin serbest kalabilmesi için güç gereklidir. Grup 3: Abdomenin 6. segmenti sternal tüberküller üzerine çengelle bağlanmıştır. Diğer bütün segmentler sternum ile bağlantılı değildir. Grup 4: Abdomendeki tüm segmentler sternumda tamamen serbest şeklindedir. Araştırmacı, incelediği 52-125 mm Uzun Karapas genişliğindeki bireylerin yaklaşık %13'ünde penisler 1. pleopodlara, %2 'sinde ikinci pleopod spinleri birinci pleopodlara yerleşmemiş, 65-69 mm karapas genişliğindeki bireylerin yaklaşık %3'ünde ilk kez spermetoforların bulunduğu, 82 mm 'lik bireylerin %50'si, 97 mm ve daha geniş bireylerin %95'inde spermetoforlar bulunduğunu belirtmiştir. 117 mm 'lik ve daha geniş bireylerin ise %80-92 sinde penis ve pleopodların işlevsel olduğunu bulmuştur. Ayrıca, ortalama 82 mm karapas genişliğindeki bireylerde ilk kez abdomenin sternumdan serbest kaldığını, Vas-deferentia'nın ön kısmında (AVDs) spermatoforların ilk görüldüğü bireylerin Karapas Genişliğinin ortalama 15 mm olduğunu bildirmiştir.

Çalışmamızda abdomeni tamamen serbest, penisler ve ikinci pleopodlar birincileri içerisine yerleşmiş 295 ergin birey ve belirtilen özellikleri göstermeyen 29 ergin birey incelenmiştir. Populasyondaki erkek bireylerin yıl içinde her ay işlevsel olarak üreyebildikleri, erkek bireylerin yaklaşık %90'nın Vas-deferentia' sının ön bölgesinde sperme rastlanılmıştır. Çizelge 25'in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi Aralık/96 da sperm bulunmayan bireylerin yüzdesi %60 ile en yüksek saptanmıştır. Bunu % 25 değer ile Kasım 97/98 ve Şubat/98 ayları izlemiştir. Dölleme yeteneğine sahip bireyler yılın bütün aylarında araziden bulunmuştur (şekil 41). Örneklenen 8.00-9.50 cm karapas genişliğindeki bireylerin tamamında spermatoforlar bulunurken, daha yüksek genişlik sınırlarında çok az oranlarda spermatofor oluşturmamayan bireyler saptanmıştır (şekil 43). Karapas uzunluğuna bakıldığında ise 11 cm karapas uzunluğundaki bireylerde spermatofor oluşturmamayan bireylerin sayısı diğer karapas genişlik sınırlarına göre daha yüksek bulunmuştur (şekil 44). Yapılan t-test istatistik analizi ile eşeyssel olgunlaşmaya ulaşma ile karapas genişliği ve uzunluğu arasında ilişkinin önemli olmadığı saptanmıştır. Arazi örneklemelerinde de farklı genişlik ve uzunluk sınırlarında hem spermatoforlu hemde bulunmayan bireyler elde edilmiştir. Elde edilen fonksiyonel üreme yeteneğine sahip en küçük birey 8.00 cm kısa karapas genişliğinde ve 5.20 cm karapas uzunluğunda bulunmuştur (çizelge 6).

Biyokütle

Bingel (1987), Doğu Akdeniz'de kıyı balıkçılığı av alanlarında sayısal balıkçılık projesi kesin raporunda İskenderun Körfez' inde en yüksek birim biyokütlenin yaz-sonbahar da olduğunu bildirerek, Tarsus çayı- Seyhan Nehri etki alanında aylara göre Mavi Yengeç ve Portunus ikisi birlikte ağırlıklarının (gr/s) dağılımı şu şekilde vermiştir. 1981 için; Haziran 427.5; Temmuz 1610; Ağustos 207.5; Eylül 2712.5, Aralık 3605; 1982 için Nisan 711.7; Mayıs 89679.7; Haziran 50004; Temmuz 13725; Ağustos 25640.8; Eylül 21934.3; Ekim 9725; Kasım5075. Yumurtalık bölgesi içi ise; 1981 Temmuz 935; Ağustos 1689.5; Eylül 2720; Aralık 22.5; 1982 Mayıs 50; Haziran 1300; Ağustos 8400; Ekim 13760, Kasım 179.8 (gr/s) Yine aynı araştırmacı, Yumurtalık bölgesinde ana avda ilk sırayı %26.911 ile Mavi Yengeç ve Portunus' un birlikte oluşturduğunu, Karataş bölgesinde %18.395 ile ilk sırada yer aldığını saptamış, İskenderun Körfez' inde toplam biyokütle ve ana avı oluşturan organizmalar içinde Mavi Yengeç ve Portunus' un ikisinin birlikte %11.37 ile üçüncü sırada yer aldığını bulmuştur.

Lipcius ve Van Engel (1990)'ın Chesapeake Körfez'inin York Nehrinde 1972-1988 yılları arasında ortalama 10 m derinlikte gerçekleştirdikleri trol çekimleri sonucunda, en düşük Mavi Yengeç yoğunluğunu 1974-1977 ; en yüksek yoğunluğu ise 1972-1973 ve 1978-1984 yıllarında bulmuşlardır. Aynı çalışmada, aylık olarak en yüksek miktar Mayıs-Ağustos ile Eylül-Ekim de ve ayrıca her yıl Haziran ayında en yüksek değerler saptanmış, yumurtlayan stok ise Mayıs' tan Ağustos' ta kadar örneklenmiştir. Yoğunluktaki mevsimsel varyasyonlar belirlenmiş, en yüksek yaz aylarında (Hazirandan Ağustosta kadar) en düşük Ekim ve Kasım da elde edilmiş, trol çekimlerinde ise en az yoğunluk kış süresince ve erken ilkbaharda (Aralık-Nisan) bulunmuştur. Bu belirlenen mevsimsel dağılımın Chesapeake Körfez'inin makrobentozu ve Mavi Yengeç için karakteristik olduğu belirtilmektedir.

Enzenrob, Enzebrob ve Bingel (1997) Akdeniz ve bağlantılı Ege Deniz'inde Mavi Yengecin 1985-1995 yıllarındaki varlığını ve bulunurluluğunu inceledikleri araştırmalarında, bütün yıllar boyunca en yüksek yoğunluğun Akyatan dalyanında bulunduğu ve bunu Deveciüşağı, Burnaz, Beymelek lagününün izlediğini bildirmişlerdir. İskenderun Körfez'inde ise Mavi Yengeç' in bütün yıl içinde düzenli olarak elde etmişlerdir.

Çalışmamızda saptanan en yüksek Mavi Yengeç biyokütlesi su sıcaklığı ve beslenme ile ilgili olarak yaz aylarında ve sonbaharın ilk ayında , en düşük ise kış aylarındadır. Yumurtalık Koy' u toplam 118 km² alanında toplam biyokütle 34.9291 kg , km² birim kütle ise 0.30 kg olarak hesaplanmıştır (çizelge 26).

Yumurtalık Koy' unda ki Mavi Yengeç popülasyonunun da Lipcius ve Van Engel (1990)'ın belirttiği karakteristik mevsimsel dağılımı gösterdiği belirlenmiştir. Buna uygun olarak kış ve ilkbahar aylarında 20 m derinlikten sonraki bölgelerde yapılan trol çekimlerinde yengeç bireylerine rastlanılmamış olup, Mayıs ayından başlayarak yaz ve sonbahar aylarında 20-50 m derinliklerde bulunmuştur (çizelge 26). Bu durumun dişilerin yumurtalarını bırakmak için koy' un ağızına yani derinlere üreme göçünden kaynaklandığı kanısındayız.

Beslenme Ekolojisi

Çalışmamızda 148 dişi, 72 erkek ve 45 juvenil bireyin mide içeriği incelenmiş, örneklerin %24'nü boş midelerin oluşturduğu, bivalviya, balık, krustase, gastropod ve bitkisel organizmalar olmak üzere 5 büyük av grubu üzerinden beslendiği bulunmuştur (çizelge 27) Sonuç olarak tüm bireylerde besin grupları içinde sırasıyla bivalviya, balık ve krustaseler gerek bulunma oranı gerekse ağırlık olarak birincil besin gruplarını oluşturduğu saptanmış

olup, yapılan tek yönlü varyans analizinde cinsiyet-ağırlık arasında krustase bakımından fark önemli elde edilmiştir ($P<0.05$). Bu farklılık Duncan çoklu Aralık testine göre erkek-dişi bireyler arasında saptanmıştır. Bu duruma erkek bireylerin büyük krustaseler üzerinden beslenmesinin etkili olduğu kanısındayız. Ergin yengeç bireylerin mide içeriklerinde karapas genişliğinin artması ile balık ve krustase tüketiminde artış olmakla beraber bivalviya tüketiminin ise her büyüklükte önemini koruduğu görülmüştür (çizelge 29). Ancak t-testine göre her bir besin grubunun alındığı bireylerde ortalama karapas genişliği bakımından farklılığın önemli olmadığı saptanmıştır. Bu durumda her karapas genişlik sınırlarında bütün besin gruplarının tüketildiğini belirtebiliriz.

Yapılan aylık incelemelerde ise ilkbahar ve yaz aylarında Mavi Yengecin bivalviya, krustase ve balık üzerine av baskısının arttığı, sonbaharda ise dalyanlara geçişe bağlı olarak av baskısının balık üzerine yoğunlaştığı belirlenmiştir (çizelge 30). Ayrıca aylara göre hesaplanan Beslenme İndeksi değerlerine bakıldığında dişilerin erkek ve juvenillere göre daha yüksek değerlere sahip olduğu (Şekil 48), dişilerde en yüksek değer 3. ayda, erkeklerde ise 2. ayda bulunduğu görülmektedir. Juvenil bireylerde en yüksek değer 5. ayda elde edilmiş, bulunabildiği aylar süresince (5. aydan 10. aya kadar) düzgün bir değer gösterdiği ve erkek bireylerden oldukça yüksek beslenme indeksine sahip olduğu saptanmıştır (Şekil 48).

En yüksek yüzde mide boşluk indeksi, dişilerde 3. ayda (%70), erkeklerde 8. ayda (%100), juveniller de ise en yüksek oran 7. ayda (%30) elde edilmiştir (şekil 49).

Eggleston (1990) , Mavi Yengecin çok çeşitli av grupları üzerinden beslenen geniş epibentik omnivor olduğunu, balık, küçük bentik faunalar, algler ve köklü bitkiler ile beslendiğini bildirmiştir. Araştırmacı Mavi Yengecin beslenme davranışına juvenil istiridyeye *Crassostrea virginica* 'nın yoğunluğunun ve büyüklüğünün etkilerini incelemiş, sonuçta tüketim oranının istiridyeye yoğunluğu ve kabuğunun yüksekliği ile büyük oranda arttığını bildirmiştir. Maksimum günlük tüketim oranı en küçük istiridyeye için 142 istiridyeye yengeç⁻¹ , 25-35 mm kabuk genişliğindeki istiridyeler için ortalama oranı 27-7 istiridyeye yengeç⁻¹ şeklinde elde etmiştir. Çalışma bulgularımızda da Mavi yengecin hemen hemen aynı av grupları üzerinden beslendiği ve av grupları içerisinde de gerek bulunma oranı gerekse ağırlık olarak en büyük yüzdeyi bivalviyaların oluşturduğu saptanmıştır (çizelge 28).

Seed ve Hughes (1997), Mavi Yengecin detritustan bitkisel materyallere , bentik omurgasızlardan balığa kadar çok çeşitli besinleri tükettiği, oppurtunistik beslenme özelliği gösterse de obur avcı olduğu ve yoğun olarak av grupları üzerine predatör olduklarını söylemektedirler. Araştırmacılar kiskaçların morfolojisi yanında av grubu olarak bataklık

midyesi *Geukensia demissa* veya fiddler yengeç *Uca pugilator* kullanarak Mavi Yengecin avcılık davranışını incelemişler, yengeçlerin genellikle kolaylıkla açabilecekleri (<2.5 cm) *G. demissa* 'yı tercih ettikleri büyük (>2.5 cm) olanları ise tüketmediklerini bulmuşlardır. Çalışmada ayrıca predatör yengeçlerin besinlerinde sert krustase, yumuşakçaların yer aldığı ve Mavi Yengeçlerin bu av sınıfları içerisinde en küçük olanlarını seçme davranışı gösterdikleri belirtilmiştir. Çalışmamızda da ağırlık yüzde olarak (%36.2) en büyük av grubunu, frekans olarak ise 3. büyük av grubunu sert krustase yumuşakçalardan bivalviyaların oluşturduğu saptanmıştır (çizelge 28).

Hsueh , McClintock ve Hopkins (1991), Mobil Körfez' in de (Alabama) *C. sapidus* ve *C. similis* 'in doğal besinlerini belirlemeye çalışmışlar, her iki türünde balık, bivalviya, yengeçler ve gastropod'lar olmak üzere genel 4 av grubu üzerinden beslendiklerini saptamışlardır. Bizim bulgularımızda erkek, dişi ve juvenil bireylerin araştırmacıların belirttiği av grupları dışında bitkisel organizmalar ve yumurta ile de beslendikleri belirlenmiştir.

Fitz ve Wiegert (1991), Kıyusal tuzlu-bataklık alanlarda >100 mm karapas genişliğindeki Mavi Yengeçlerin büyük bir bölümünün pelajik balıklar (%38) ve Portunid olmayan yengeçler (%43) ile beslendiklerini, besinlerinin %12 sini karides ve küçük krustaselar (Crustaceans) diğer küçük bölümünü ise Annelid ve Gastropod gibi omurgasızların oluşturduğunu saptamışlardır. Portunid olmayan yengeçler detayı ile tanımlanamamakla birlikte *Uca* sp., Grapsid ve Xanthid yengeçler interdiyal zondaki bireylerin mide içeriklerinde tanımlanmışlardır. Balık ve yengeçlerin mide içeriğinde yaklaşık eşit oranlarda, mide hacminin yaklaşık %80 nini oluşturdukları, mide hacminin %66'sını Portunid olmayan yengeçler, %60'mı ise balıkların oluşturduğu bulunmuştur. Diğer krustaselar kategorisi ise mide hacminin %12'sini veya dört de birini kapsayarak diğer geniş av grubunu oluşturmakta olun juvenil Penaeid karidesler, Palaemonid karides ve küçük Peracaridan krustaselerden özellikle juvenil *Penaeus* sp. baskın olarak görülmektedir. Spartina (ölü veya canlı) midelerin %14 ve hacim olarak %1.5 inde saptanmıştır. Çeşitli av grubunun tüketimi yengeç de düşük bulunmuş bunlarında Brachyuran yengeç larvası, Copepodlar, Annelidler, Gastropodlar, Bivalviya ve Foraminifera dan oluştuğunu bildirmişlerdir. Çalışma sonuçlarımız pek farklı olmasa da önemli nokta tüm bireylerde gerek bulunma oranı gerekse ağırlık olarak Bivalviya grubunun oldukça yüksek bir değer almasıdır. Ayrıca bitkisel organizmalar özellikle erkek ve juvenil bireylerde oldukça önemli bir yer kaplamaktadırlar (çizelge 4.28). Ayrıca ilkbahar ve yaz aylarında daha çok bivalviya, krustase ve balık

üzerinden beslendiği saptanmıştır. Sonbahar aylarında ise av baskısının daha çok balık üzerine yoğunlaştığı belirlenmiştir. Mevsimlere göre alınan besin grupları arasındaki bu farklılık χ^2 istatistik analizinde önemli elde edilmiştir ($\chi^2=49$ $df=12$ $P<0.05$).

Et Kompozisyonu

Yengeçler yenilebilir et kalitesi ve ekonomik değer bakımından gelişmiş ülkelerde oldukça yüksek fiyat bulan bir su ürünüdür. Bu endüstride çeşitli işleme kademelerinden geçen yengeçler üç tip ürün halinde üretilmektedir. Bunlar yengeç eti, bütün yengeç ve yengeç atıklarıdır. Atık denilen kısımlar ise yengeç parçaları, kabuklar, kitin, protein konsantrasyonları, etler ve sakatatlardan oluşmaktadır. Bu atık etler fazla miktarda protein ve mineral içerdiğinden dolayı sığır, domuz, kümes hayvanları ve hatta balık beslenmesinde kullanılmaktadır (Paul ve Haefner, 1985a). Çeşitli ülkelerde sevilerek tüketilen ve bir endüstri kolu haline gelen deniz yengeçleri ülkemizde insan tüketimi açısından en az bilinen su ürünleri arasında yer almaktadır. Bunda en etkili faktörün bilgi ve gelenek olduğu düşünülmektedir.

Yengeçte protein kuru maddenin %65-55'ini oluşturmaktadır. Yengeç dokusunda yağ içeriği oldukça düşüktür. Bu da lipidin dokularda birikmediğini göstermektedir. Ancak bilindiği gibi lipit ve karbonhidratlar vücut için enerji kaynağı olarak kullanılırlar (Siddiqui, Akbar ve Qasım, 1987). İncelenen tür için de kısıkaç ve göğüs etlerindeki lipit oranı oldukça düşük çıkmıştır. Özellikle kış ayında erkek bireylerin göğüs etinde en düşük lipit değeri (%0.21) saptanmıştır (çizelge 31). Bunun kış aylarında besin alınımı su sıcaklığı ile azaldığından, hem vücut sıcaklığını ayarlamak hem de enerjinin büyük bir kısmı karşılamak için vücuttaki lipitin kullanılmasından kaynaklandığı düşüncesindeyiz. Bunun yanında en yüksek lipit değeri erkek bireylerin kısıkaç etinde ve ilkbaharda elde edilmiştir (çizelge 31). Bununla birlikte su sıcaklığının artması ve beslenmenin yoğunlaşmasına bağlı olarak alınan fazla besinin lipit şeklinde depolanmasından kaynaklandığını belirtebiliriz. Ayrıca Bu farklılıkların ortamdaki besin içeriğinin, Yengeçlerin olgunluk evrelerinin ve kabuk değiştirme dönemlerinin farklılığından da kaynaklanabileceği unutulmamalıdır.

Kuru maddenin % 85-95'ini oluşturan organik bileşiğin %55-56'sı proteinlerden oluşmaktadır. Yengeç dokusu 1:3.34 ve 1:4.29 arasında değişen C:N oranı ile yüksek Azot içermektedir. Lipit, karbonhidrat ve kül oranı düşüktür (Siddiqui, Akbar ve Qasım, 1987). Siddiquie ve ark. bildirdiklerine göre Amerika da *C. sapidus* ile yapılan çalışmada, yaş

ağırlıkta protein 16.10, yağ 1.0 , kül 1.6 oranında elde edilmiştir. Başka bir araştırmada yaş örnekte yengeç kasında yüzde olarak nem 83.1, protein 15.0, lipit 0.5 olarak bildirilmiştir (Ternes, 1994). Bu sonuçlarla bulgularımız arasında benzerlik görülmektedir (çizelge 31).

Tsai, Chen ve Tsai (1984) 70 adet Mavi Yengeçte gonad, kas ve hepatopankreasta toplam lipit ve kolesterol değerlerini ve bunların cinsiyet, büyüklük, olgunluk evresi ve mevsimlerle ilişkilerini incelenmişlerdir. Bu çalışma sonucunda toplam lipit ve kolesterol düzeyleri en yüksek oranda pankreasta bulunmuştur. Erkek bireylerde lipit ve kolesterol miktarları genç dönemden ergin döneme doğru gidildikçe düşük bulunmuştur. Ekim ayında bu değerler , yumurtalı dişilerde ergin fertlerden daha yüksek düzeylerde elde edilmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar tarafından Mavi Yengeç de toplam lipit ve kolesterol düzeylerinin hepatopankreas, gonad ve kaslarda, cinsiyetler arasında ve gelişim dönemlerinde farklı olduğunu bildirilmişlerdir. Bu farklılığın dokuların fizyolojik fonksiyonlarıyla ilişkili olduğu da ifade edilmiştir. Et verimindeki değişimler solunum ve kabuk değişim döngüsü ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Bu değişim daha çok dişilerde olmakta ve et verimini en çok yumurtlama periyodu ve gonad gelişimini etkilemektedir. Yengeç türlerinin büyük bir çoğunluğunda erkekler dişilere göre daha önce en yüksek büyüklüğe ulaşmaktadırlar. Bu nedenle avcılık daha çok erkek bireyler üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Yapılan çalışmada erkek bireylerin kısıkaç etindeki değerler bütün mevsimlerde göğüs etinden yüksek elde edilmiştir. Genel bakıldığında, dişilerde sonbahar hariç diğer mevsimlerde göğüs etindeki değerler kısıkaça göre yüksek bulunurken, sonbaharda ise göğüs ve kısıkaç etlerindeki değerler oldukça birbirine yakın ve farklılık önemli elde edilmemiştir. En yüksek ham protein değeri (%21.96) ilkbaharda dişi bireylerin göğüs etinde, kuru madde (%26.15) ilkbaharda erkek kısıkaçında, ham kül %3.28 ile dişinin göğüs etinde kısım, lipit ise %3.89 ile ilkbaharda erkek bireylerin göğüs etinde saptanmıştır (çizelge 31). Yengeç etinin protein değeri yüksek, lipit oranı düşük saptanmıştır. Bu da insan besini yönünden değerli bir protein kaynağı oluşturabileceğini göstermektedir.

Larva

Johson ve Hess (1990), Chesapeake Körfez' inde (ABD) Mavi Yengeç larvalarının dağılımını ve stoğa katılımını araştırdıkları çalışmalarında, Mavi Yengecin körfezinin ağzına yakın Mayıs' tan Eylül' e kadar yumurtladığı, en yüksek yumurtlamanın Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleştiğini ve oluşan zoea ile megalopa'nın çoğunluğunun 1 m derinlik ile yüzey

arasında dikey düzenlendiğini bulmuşlardır. Optimal laboratuvar koşullarında Mavi Yengeç yumurta çıkışından megalopal evreye 31-35 günde ve 6-10 günde ise ilk juvenil yengeç evresine ulaştığını bildirerek Chesapeake Körfez' inde buna benzer sonuç bulduklarını belirtmektedirler. Ayrıca ilk zoea evresindeki larvaların körfez ağzının cezir sınırında yoğunlaştığını buna bağlı diğer zoeal ve megalopal evrenin kıyısız suların girişinde yoğunlaştığını saptamışlardır. Bu çalışmada baskın kabul edilen model, larvaların yüzey sürüklenme ile kıyısız sulara girdiği veya ayrıldığı şeklindedir. Çalışma sonucunda araştırmacılar, larvaların bir çoğunun körfezde kalırken büyük bir çoğunluğunun açıklara dağıldıklarını ve daha sonra tekrar körfeze döndüklerini belirterek, larvaların ortalama %13'nün körfezi terk etmediği, büyük oranının %87'sinin körfezden ayrıldığı daha sonra ise bunun %29'unun yüzey suyu ile tekrar körfeze geri döndüğünü saptamışlardır. Yumurtalık Koy' unda ise yumurtalı dişiler koy' un giriş kesimlerinde (10-20 m) Mart' tan Eylül' e kadar yumurtlamaktadırlar. Buna uygun olarak larval örneklemelerde de en yoğun I. evredeki bireylerde koy' un giriş kısmında yoğunlaşmaktadırlar (çizelge 33).

Garvine ve ark., (1997), Delaware Körfez' inin(ABD) orta Atlantik Koy' undaki kıyısız bölgelere Mavi Yengeç larvalarının yerleşim ve geçiş matematiksel modelini incelemişler larvaların 7 veya 8 zoea evresi gelişiminden sonra megalopa evresi geçirerek batı kıyı haliç yetişkin popülasyonuna katıldıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca, larvaların su yüzeyinde yoğun oldukları belirtilirken zoea larvaları kadar megalopa' sının da su kolonunun 2 m üstünde yoğun olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle de kontinental kıyıya geçişin su yüzeyine yakın sirkülasyon ile kontrol edildiği düşünülmüştür. En yüksek larva üretimi haliç ağzına göç eden çok sayıda dişilerden dolayı yazın ortasında elde edilmiştir.

Mcconaugha ve ark., (1983), Chesapeake Körfez' ine yakın sulardaki Mavi Yengeç larvalarının 1980 yılında Mayıs' tan Eylül' e kadar mevsimsel dağılımını incelemişler ve özellikle pik oluşturdukları geç Temmuzda üreme aktivitelerini saptamayı amaçlamışlardır. Bu çalışmada Nichols ve Keney (1963)'in Mavi Yengeç larvalarının yıl boyunca bulunduğunu, yumurtlamanın bütün yıl içinde gerçekleştiğini belirttiğini bildirmişlerdir. Son zamanlarda ise larval gelişimin açıklarda neuston seviyesinde olduğu kabul edilmektedir. Araştırmacılar körfez ağzında Mayıs 30'da en az sayıda larva elde etmişlerdir. Larva sayısında 15 Temmuzdan sonra artış gözlemlendiğini ve en yüksek değere Ağustos ortalarında ulaştığını saptamışlardır. Daha sonraki iki hafta içinde ise yoğunlukta düşüş görülmüş, II. evredeki larvaların total larvaların %9.4'ünü oluşturduğu VII. evreye doğru larval yoğunluğunda düşüş olduğu VIII. evre yüzdesinde ise yavaş bir artış ve %0.97 ile megalopa

evresinde artış bulmuşlardır. Ayrıca larvaların evre kompozisyonunda mevsimsel değişiklikler de saptamışlardır.

Yumurtalık Koy' unda yaptığımız çalışmada da larvaların büyük bir kısmını yaklaşık % 66.3 'nü I. evredeki larvalar oluşturmaktadır. II. evredeki larvalar toplam larvanın %12.4'ü oluştururken III. (%3.4) ve IV. (%1.1) evrede düşüş görülmekte, VI. (%5.6), VII. (%6.7) ve VIII. (4.5) evrede ise tekrar yavaş bir yükselme bulunmuştur (şekil 51). Yukarıda belirtilen çalışmada olduğu gibi bulgularımızda da yıl içinde larval evrelerin kompozisyonunda aylara göre değişimler gözlenmiştir (çizelge 32). Bu durum üreme aktivitesindeki değişimi göstermektedir. Özellikle araştırmacıların (McConaughy ve ark., 1983) bildirdikleri gibi I. evrede larvaların örnek içerisindeki baskın olması üreme aktivitesinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Çizelge 4.32, 4.33 şekil 4. 51 verildiği gibi Yumurtalık Koy' unda Mart ile Eylül süresince I. evrede (%66.3) larvalar en yüksek oranda bulunmuştur. Buna dayanarak Yumurtalık Koyu Mavi Yengeç popülasyonunda üremenin Mart' tan başlayarak Eylül sonuna kadar sürdüğü belirtilebilir.

Aynı araştırmacılar megalopanın ise bimodel mevsimsel değişim gösterdiğini bildirmişlerdir. Aynı çalışmada *C. sapidus*' un tropikal ve subtropikal popülasyonlarında üremenin bütün yıl boyunca devam ettiği bildirilirken Cheapeake Körfez' inde geç Mayısta su kolonunda I. evredeki larva bulunmaması ve geç Ağustosta I. evrede hızlı artış ,yumurtlamanın sadece yaz aylarında gerçekleştiği sonucuna ulaştırmıştır. Ayrıca, su kolonundaki I. evredeki larvaların sayısındaki artışın sıcaklık ile artış gösterdiği, I. evredeki larvaların %90 'ından fazlasının neuston safıta yoğunlaştığı , yüzey suyu sıcaklığının larval gelişim oranını etkilediği ve üreme için en düşük su sıcaklığının 20 °C olduğu ileri sürülmektedir. Çalışmamızın gerçekleştiği dönem içinde ortalama yüzey su sıcaklığı 24±4.42 °C olarak bulunmuştur. Bu durumda Mavi Yengeç üreme ve yerleşimi için Yumurtalık Koy' unun uygun bir ortam olduğunu söyleyebiliriz.

Metcalf ve Lipcius (1992) Dişi Mavi Yengeçlerin erken yazdan sonbahara kadar Cheapeake Körfez' inin (ABD) ağzında larvalarını oluşturdıkları kontinental kıyı sularında 7 veya 8 zoeal evre geçirdiklerini bildirmişlerdir. Erken zoeal evreler haliç ağzında bulunurken ileri zoeal evrelerin genellikle açıklarda toplandıkları, megalopanın ise kıyıda uzaklarda toplandığını saptamışlardır. Bu nedenle de Mavi Yengeç larvalarının haliç ağzında oluştukları kıyıda uzaklara taşındıkları ve daha sonra postlarva olarak haliçlere geri döndüğünü bildirmişlerdir.

Olmi III ve ark., (1990) York Nehrinde (Virjinya ABD) Mavi Yengeç megalopa' sının yerleşimi ve planktonik dağılımını inceledikleri çalışmalarında plankton içinde ortalama megalopa yoğunluğunu 10 m³ de 0.4 ile 57.9, her kollektör de 0-20 adet olarak bulmuşlardır. Ayrıca, megalopa ve juvenil bireyler yoğun olarak deniz çayırının bulunduğu alanlarda saptanmıştır.

Maris (1990) Cheapeake Körfez' inin (ABD) ağzına yakın bölgede I. evredeki Mavi Yengeç larvalarının orta-derinliklerde dağılım gösterdiklerini ve dış akıntı sularıyla körfezden uzaklaştıklarını bildirmiştir. Açıklarda I-IV. evredekilerin ilk önce su yüzeyine göç ettikleri daha sonra geç larval evrede V-VIII ile postlarva evresinde suyun yüzeyinde kaldıklarını saptamıştır. Yumurtalık Koy' da da benzer durum bulunmuştur. Koy' un giriş kısmında 10-20 m derinliklerde yumurtadan çıkan I. evredeki larvalar ve diğer zoea evreleri yüzeysel plankton çekimlerinden elde edilmiş, dikey plankton çekimlerde herhangi bir larval evreye rastlanılmamıştır.

Roman ve Boicourt (1990) Cheapeake Körfez' inin (ABD) kıyı sularında Şubat, Haziran ve Ağustos 1985 ve Nisan 1986 da plankton örneklemeleri yapmışlar, Nisan ayında zoea larvalarının dağılımının tuzlulukla ters ilişkili olduğunu, Ağustos ayında en yüksek zoea yoğunluğunun körfez ağzının dışında bulunduğunu bildirmişlerdir. Zoea yoğunluğundaki artış kıyı ve körfez ağzının tatlı suyun karıştığı kısımlar olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca Zoea larvalarının yoğun olarak su yüzeyine yerleştikleri ve yoğunluklarının tatlı su karışımı ile arttığını bulmuşlardır. Çalışmamızda da en fazla I. evredeki (%66.3) larvalar yüzey sularındaki plankton çekimlerinde elde edilmiştir (çizelge 33, şekil 51).

Vernall ve Mcconaugha (1990) Orta Atlantik Koy' undaki (ABD) Mavi Yengeç larvalarının zaman ve uzaklığa bağlı olarak dağılımlarını incelemişler ve bu amaçla neuston net ile 1 ve 3 m derinliklerde Mayıs' tan Kasım' a kadar iki ayda bir 1982-1983 yıllarında örnekleme yapmışlardır. Larval yoğunluk m³ de 0-22.000 bulmuşlardır. İlk larval evrede en yüksek yoğunluk, körfez ağzının 20 mil içerisinde geç evrede ise 40-50 mil açıklarda saptanmıştır.

Montfrans, Peery ve Orth (1990) York Nehrinde (Virjinya ABD) Mavi Yengeç megalopasının günlük, aylık ve yıllık yerleşimi incelemişler, yumurtlamanın körfez içinde oluştuğunu larvaların kıyıya yakın kontinental sulardan ayrılarak geliştiklerini ve postlarva veya juvenil şekilde haliçlere geri döndüklerini saptamışlardır. Her yıl megalopanın farklı zamanlarda yerleştiği 1985 de erken Kasım, 1986 da ileri Ekim, 1987 de erken sonbahar ve erken Kasım olduğunu bulmuşlardır.

Orth ve Montfrans (1990) Mavi Yengecin genel yaşam döngüsünde yumurtalı dişilerin lagünlerin açıklarına göç ederek zoaları oluşturdukları ve larvaların burada gelişerek, megalopaların metamorfozu kıyısız kontinental alanlarda tamamlayarak tekrar lagünlere döndüklerini bulmuşlardır. Araştırmacıların bildirdiklerine göre Mense ve Wenner (1989)'in yaptıkları çalışmada Mavi Yengeç megalopasının polyhalin çamurlu alanlarda (toplam%75) mesohalin (%23) veya oligohalin (%2) alanlara göre daha en yüksek oranda bulmuşlardır.

Yumurtalık Koy' unda gerçekleştirilen bu çalışmada Mavi Yengecin I-VIII. zoea evresi geçirdiği bulunmuştur. Sadece yapılan örneklemelelerde V. evredeki bireyler tanımlanamamış ve megalopa evresi elde edilememiştir (çizelge 33, şekil 51). Bunun örnekleme yönteminin yetersizliğinden kaynaklanabileceği kanısındayız. Şekil 51 den de anlaşılacağı gibi toplam zoeal evre içerisinde özellikle üreme aktivitesinin göstergesi olan I. evredeki bireyler en yüksek değerde bulunmuştur. Diğer yukarıda verilen tüm çalışmalarda da bu durum bildirilmiştir. Derinlikler dikkate alındığında I. evredeki larvaların bütün derinlik bölgelerinde en yüksek yüzde ile temsil edildiği görülmektedir (çizelge 33). Ayrıca Mavi Yengeç zoea larval evrelerinin Yumurtalık Koy' unda yüzde dağılımına bakıldığında I. evre sürekli, II. evre çoğunlukla, III. evre az, IV. evre nadiren, VI. çoğunlukla, VII. evre önemli çoğunlukla ve VIII. evre az da olsa bulunmuştur (çizelge 33).

Sonuçta Yumurtalık Koy' un da Mayıs-1997 ve Mart-1998 dönemlerinde gerçekleştirilen çalışmada yumurtalı dişilerin larva oluşturmak için koy' un girişine (10-20 m derinlik) göç ettikleri ve burada Mart Eylül' e kadar larvaları oluşturdukları, larvaların I-VIII planktonik evre geçirdikleri bulunmuştur. Yukarıda verilen bir çok çalışmada da verildiği gibi zoeal larvalar neuston sathihta yer almış ve en yüksek I. evre ile temsil edilmişlerdir. *C. sapidus* 'un I. evreden megalopa' ya kadar ki gelişiminin 25 °C de ortalama 31-35 gün olduğu ve bunu 7-11 gün megalopal gelişimin takip ettiği bilinmektedir (Mcconaugha ve ark., 1983, Johson ve Hess 1990,). Çizelge 32 de görüldüğü gibi özellikle Ağustos ve Eylül ayında görülen ileri zoeal evredeki larvaların daha sonra koyda oluşan hakim rüzgarlarla (özellikle baskın rüzgarlar doğu ve kuzeydoğu kaynaklı olup güz ve kış aylarında doğu ve kuzey rüzgarları, buna karşılık yazın güney ve batı rüzgarları hakimdir) koy' un girişinde açıklarda gelişimlerini tamamlayarak kıyılara taşındığı ve lagünlere yerleştiği saptanmıştır. Bu sürenin Mavi Yengeç için bilinen gelişim süresi ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Arazi örneklemelelerinde bunu destekler nitelikte bulunmuş ve özellikle sığ-vegetasyonlu alanlarda ilk kez juveniller Mayıs' ta ve Eylül' de görülmüştür (çizelge 5).

4.2. Sonuç

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre , İskenderun Körfez'indeki Mavi Yengeç popülasyonu ile ilgili olarak elde edilen başlıca sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

1. İncelenen popülasyonda % 47.5 ergin, %21.3 yumurtalı olmak üzere toplam %68.8 ile dişilerin hakim olduğu ve bunu %23.9 ile erkek bireylerin izlediği belirlenmiştir. Ergin dişilerin ortalama 12.69 ± 2.33 cm (2.00-18.10), erkeklerin 12.74 ± 2.77 cm (3.70-18.60), juvenillerin 7.18 ± 1.95 cm (3.2-12.30) cm karapas genişliğinde olduğu bulunmuştur. Tarım ve Köy işleri bakanlığının yayınladığı su ürünleri avcılığını düzenleyen sirkülerinde Mavi Yengeç için avlanabilir en küçük boy, 7 cm karapas genişliği olarak bildirilmiştir (Anonim, 1998). Buna göre örneklemelerimizde toplam 850 dişinin yaklaşık % 1.76'sı, 296 erkek bireyin % 4.05 ve juvenillerin % 8.10'nun avlanabilir boyun altında yakalanmıştır.

2. Dişilerde 4. Abdomen genişliği, erkeklerde kısaç propodal uzunluğu ile karapas uzunluğu arasında oluşturulan allometrik büyüme denklemi ile; dişilerin 6.05 cm , erkek bireylerin ise 4.48 cm karapas uzunluğundan sonra eşeyssel olgunluğa ulaştığı belirlenmiştir. Arazi örneklemelerinde ise ergin dişilerin ortalama karapas uzunluğu 5.59 cm, erkeklerde ise vas-deferentia' da spermatoforum bulunduğu üreme yeteneğine sahip en küçük bireyin karapas uzunluğu ise 4.70 cm ölçülmüştür. İskenderun Körfez' i Mavi Yengeç popülasyonu için 6.30 cm karapas uzunluğunun en küçük av büyüklüğü sınırı olarak kabul edilmesinin uygun olacağı önerilebilir.

3. Çalışmamızda pubertal dişi ve erkek bireyler Mart, Mayıs ve Eylülde araziden örneklenmişlerdir. Özellikle dişilerin Mayıs' ta yoğun olduğu gözlenmiştir. Nisan ayında örnekleme yapılamadığı için bu ay için herhangi bir yorum gidilememiştir. Ayrıca arazi çalışmalarında çiftleşmenin Mart-Nisan aylarında ilkbaharda gerçekleştiği gözlenmiştir.

4. Gonadosomatik İndeks değerleri ise İskenderun Körfez' inde Mavi Yengeç dişilerinin üremeye Mart ayında başladıkları ve Eylül sonuna kadar devam ettiklerini göstermiştir. Erkek bireylerde ise üreme bütün bir yıl boyunca gerçekleşmekte ancak en yüksek üreme olgusu Temmuz ve Ekim ayları arasındadır. Bu nedenle İskenderun Körfez' i Mavi Yengeç popülasyonunda üreme ilkbahar sonu başlayarak yaz ayları süresince ve sonbaharın ilk aylarına kadar sürmektedir. Tarım ve Köy işleri Bakanlığının yayınladığı su ürünleri avcılığını düzenleyen sirkülerinde Mavi Yengeç için herhangi bir yasak dönemine rastlanılmamıştır. Bu açıklığın giderilmesi amacıyla İskenderun Körfezinde Mavi Yengeç avcılığının Mayıs ayından başlayarak Ekim ayının başlarına kadar yasak olmasının uygun olacağı önerilebilir.

5. Yumurtalı dişiler ise Mart ayından başlayarak Eylül ayının sonlarına kadar yakalanmıştır. En yüksek oranda ise yaz ayları süresince özellikle Temmuz ve Eylül’ de örneklenmişlerdir. Ortalama yıllık yumurta verimliliği $1.876.9689 \pm 1.165.659$ adet olarak hesaplanmıştır. Yumurtalı dişilerin ortalama karapas genişliği 12.65 ± 2.10 cm, en düşük 4.90, en yüksek ise 19.00 cm ölçülmüştür.

6. Erkek bireylerde ise vas-deferetantia da spermatofor bulunan fonksiyonel üreme yeteneğine sahip en küçük birey 8 cm karapas genişliğinde ölçülmüştür. Bu nedenle İskenderun Körfez’indeki Mavi Yengeç popülasyonu için dişilerde 4.50 cm, erkeklerde ise 8 cm karapas genişliği en küçük av genişliği sınırı olarak alınması gerektiği kanısındayız.

7. Yumurtalık koy’ u toplam 118 km² alanında Mavi Yengeç toplam biyokütlesi 34.9291 kg, km² ise 0.30 kg olarak hesaplanmıştır. Trol çekimlerinde av grupları içinde ilk sırayı Mavi Yengecin aldığı gözlenmiştir.

8. Yengeç etinin protein değeri yüksek, lipit oranı düşük saptanmıştır. Bu da insan besini yönünden değerli bir protein kaynağı oluşturabileceğini göstermektedir. Bunu dışında gerek işleme sonucunda oluşan atıkların gerekse avcılığı sırasında ezilen yada özürlü olanların balık yada karides yemi olarak değerlendirilebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca Türkiye'nin Doğu-Akdeniz kıyılarında dalyan ve lagünlerde bol miktarda bulunduğu bilinen Mavi Yengeçler eğer usulüne uygun olarak modern yöntemlerle avlanır ve özel geliştirilmiş sistemlerde kabukları atılarak yumuşak yengeç olarak üretilip batı Avrupa ülkeleri, Amerika ve Japonya gibi yengeçlerin en çok arandığı yurt dışı pazarlarında değerlendirilebilirlerse bu hem bölge balıkçısı ve yatırımcılar için iyi bir gelir hem de ülke ekonomisine büyük bir fayda getirmiş olacaktır.

KAYNAKLAR

- ALDRIDGE, J.B., CAMERON, J.N., 1982. Gill Morphometry in The Blue Crab, *Callinectes sapidus* Rathbun (Decapoda Brachyura). Crustaceana 43 (3). 297-305.
- ALVAREZ, R.Z., 1968. Crustaceos Decapodos Ibericos . Inv., Pesq., Tomo 32, Barcelona Agosto. 482 pp.
- AMANIEU, M., DANTEC, J., 1961. Sur La Presence Accidentelle De *Callinectes sapidus* M. Rathbun A L'embouchure De La Gironde. Rev.,Trav., Peches Marit., 25 (3). 339-343.
- ANONYMOUS, 1993. SPSS for Windoes Advanced Statistics Release 6.0., 578 s.
- ANONONİM, 1998. Denizlerde ve İç sularda Ticari Amaçlı Su ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1998-1999 Av Dönemine Ait 32/1 Numaralı Sirküler. Tarım Ve Köyışleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müd., Ankara 77 s.
- ARCHAMBAULT, J., A., WENNER, E.,L., WHITAKER, J.,D., 1990. Life History and Abundance of Blue Crab, *Callinectes sapidus* Rathbun, At Charleston Harbor, South Carolina . Bull., Mar., Scien., 46(1): 145-158.
- AVŞAR, D., ÇEVİK, C., TÜRELİ, C., 1996. İskenderun Körfezi İçin Yeni Bir Tür Olan (*Rhopilema nomadica*)'nın Biyometrisi ve Yumurtalık Koyundaki Bulunurluğu. XIII. Ulusal Biyoloji kongresi, 17-20 Eylül 1996, İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü,İstanbul. 476-486.
- AVŞAR,D.,1998. Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği ders Kitabı No.5. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fak., Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Ana bilim Dalı. ADANA.303 s.
- BAGENAL, T., 1978. Methods for Assesment of Fish production in Fresh waters. Western Printing Servis Ltd, Bristol barrd by Kemp Halk bridary mead, Oxford.219-226
- BEK, Y., EFE, E., 1988. . Araştırma ve Deneme Metodları I. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:71 ADANA. 395 s.
- BLIGH, G. E., DYER, F.W.,1959. A rapid method of total lipid extraction and purification. Can. J. Biochem. Phys. 37 (8), 911-917.
- BİNGEL, F., 1987. Doğu Akdeniz'de Kıyı Balıkçılığı Av Alanlarında Sayısal Balıkçılık Projesi Kesin Raporu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü. 312 s. Erdemli, İÇEL

- BOICOURT, W.C., ROMAN, M.R., 1990. Transport and Dispersion of Blue Crab Larvae in The Vicinity of the Chesapeake Bay Plume. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 244.
- BOURDILLON-CASANOVA, L., 1960. Le Meroplanton Du Golfe De Marseille : Les De Crustacea Decapodes. Rec. Trav. Sta. Mar. Endoume, Fasc. 30, Bull. 18, 286 pp.
- CADMAN, L., WEINSTEIN, P.M., 1988. Effect of Temperature and Salinity on the Growth of Laboratory-reared Juvenile Blue Crab *Callinectes sapidus* Rathbun. J.Exp.,Mar.,Biol., Vol. 121, pp. 193-207.
- CADMAN, L., 1990. Some Effects of Temperature and Salinity of the Growth of Juvenile Blue Crabs. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 244.
- COSTLOW, D. J., BOOKHOUT, C.G., 1959 The Larval Development of *Callinectes sapidus* Rathbun Reared in The Laboratory . The Biological Bulletin Vol: 116. 373-396.
- ÇEVİK, C., 1998. İskenderun Körfezi'nin Molluska Faunası (Doktora Tezi). Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Su Ürünleri Anabilim Dalı. 127 s. ADANA.
- DANCE, S.P., 1996. Shells Eyewitness Handbooks. Dorling Kindersley. London. 256 pp.
- DITTEL, A., EPIFANIO, C.E., 1990. Distribution of Portunid Larvae in a Tropical Estuary: Gulf of Nicoya, Costa Rica. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 245.
- EGGLESTON , D.B., 1990. Foraging behavior of The Blue Crab, *Callinectes sapidus* , on Juvenile Oysters, *Crassostrea virginica*: Effects of Prey density and Size. Bull., Mar., Scien., 46(1) , 62-82.
- ENZENROB, R., ENZENROB, L., 1990. Wissenschaftlich Interessante Funda aus der Sammlung Enzenross (Marine Invertebraten). Jh. Ges. Naturkde. Württ. 145. 284-293.
- ENZENROB, R., ENZENROB, L., BİNGEL, F., 1997. Occurrence of Blue Crab, *Callinectes sapidus* (RATHBUN, 1896)(Crustacea, Brachyura) on the Turkish Mediterranean and the Adjacent Aegent Coast and Its Size Distribution in the Bay of İskenderun. Tr., J., Zoology , No:21, 113-122.
- FITZ, C.H., WIEGERT, R.G., 1990. Utilization of Georgia Salt Marsh By Blue Crab . Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 245.
- FITZ, H.C., WIEGERT, R.G., 1991. Utilization of The Intertidal Zone of a Salt Marsh By The Blue Crab *Callinectes sapidus* : Density, Return Frequency and Feeding Habits. Mar., Ecol., Prog., Ser., Vol:76: 249-260.
- FREEMAN, J.A., KILGUS, G., LAURENDEAU, D., PERRY, H.M., 1987. Postmolt and Intermolt Cycle Stages of *Callinectes sapidus* . Aquaculture, 61, 201-209.

- FOUKE, S.S., LAWTON, P., 1990. Effects of Substrate and Hard Clam Density on Predation By Portunid crabs. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 245.
- GARVINE, R.W., EPIFANIO, C.E., EPIFANIO, C. C., WONG, K-C., 1997. Transport and Recruitment of Blue Crab Larvae: A Model with Advection and Mortality. Estuarine, Coastal and Shelf Science No.45, 99-111.
- GELDIAY, R., KOCATAŞ, A., 1988. Deniz Biyolojisine Giriş (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:31. 459 s.
- GOODRICH, D., VAN MONTFRANS, J., ORTH, R., 1990. Movement of Blue Crab Megalopae into Chesapeake Bay: Observational Evidence for A Wind-Driven Mechanism. Vol.46, No.1, 245.
- GÖKOĞLU, M., ORAY, I., K., 1997. Antalya Körfezi'nde Mavi Yengeç Avcılığı Üzerine Bir Araştırma . II. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Workshop'97. 6-7 mart 1997 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü. 26 s.
- GÖNÜL, M., 1997. Mavi Yengeç (*Callinectes sapidus* Rathbun, 1896) Avlama Yöntemleri. II. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Workshop'97. 6-7 mart 1997 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü. 27 s.
- GUERINE, L.J., STICKLE, B.W., 1990. Effects of Salinity on The Tolerance and Bioenergetics of Blue Crab *Callinectes sapidus* . Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 245-246.
- GURNEY, R., 1942. Larvae of Decapod Crustacea . The Ray Society. Instituted 1844. For the Publication of Works on Natural History. List of Recent and Forthcoming Publications. London, 305 pp.
- HADDON, A.M., HINES, A.H., WIECHERT, L.A., 1990. Population Dynamics, Habitat Utilization and Foraging Impacts of the Guild of Blue Crabs and Demersal Fish in The Rhode River Subestuary.. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 246.
- HARTNOLL, R.G., 1974. Variation in The growth Pattern Between some Secondary sexual Characters in crabs (Decapoda Brachyura). Crustaceana 27 (2), 131-136.
- _____ 1978. The Determination of Relative Growth in Crustacea. Crustaceana 34 (3). 281-293.
- HAVENS, K., J., McCONAUGHA, J., R., 1990. Molting in the mature Female Blue Crab *Callinectes sapidus* Rathbun. Bulletin of Marine Science , 46(1): 37-47.

- HAYWARD,P.,NELSON-SMITH,T.,SHIELDS, C., 1996. Sea Shore of Britain and Northern Europe. Harper Collins Publishers. 352 pp.
- HILL,J., FOWLER.D.L., AVYLE, M.J., 1990. Species Profiles. Life Histories and Environmental Equirement of Coastal Fishes and Invertebrates (Mid-Atlantic), crab. Biol., rep., U.S.Fish, Wildl., Serv., 27 pp.
- HINES, A.H., LIPCIUS, R.N., 1990. Blue Crab Predation on Clams: Effects of Species, Density and Siphon Nipping . Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.2, 246.
- HINES, A.H., WOLCOTT, T.G., 1990. Blue Crab Movement and Feeding Measured By Ultrasonic Telemetry. Bull., Mar., Scie., Vol.46, No.1, 246.
- HINES, A.H., WOLCOTT, T.G., LIPCIUS, R.N.,1992. Population and Community Ecology of Blue Crabs (*C. Sapidus*) in Chesapeake Bay, USA. Museum-Natl.d:Histoire Naturelle, Paris, France, PARIS-FRANCE MNHN, 67-68..
- HSUEH, P., McCLINTOCK, J.B., HOPKINS, T.S., 1991. Natural Diets of the Blue Crabs *Callinectes sapidus* and *C. similis* in Mobile Bay, Alabama. Am., Zool., 1991. Vol.31, No. 5, 27A.
- HSUEH, P., McCLINTOCK, J.B., HOPKINS, T.S., 1992. Comparative Study of the Diets of the Blue Crabs *Callinectes. Sapidus* and *Callinectes similis* from a Mud-Bottom Habitat in Mobile Bay, Alabama. J., Crust., Biol., Vol.12, No.4, pp. 615-629.
- HOLDEN.M.J., RICTT.D.F.S., 1974. Manual of Fisheries Science. Part 2. Methods of resource Investigation and These Application. Food and Agriculture Organization of The United Nations Roma,
- HYSLOP.E.J., 1980. Stomach Contents Analysis-A Review of Methods and Their Application. J. Fish Biol. Vol.17, 411-429.
- INGLE,R., 1989. Larval Stages of Northeastern Atlantic Crabs. An Illustrated Key. Natural History Museum Publication. 363 pp.
- İYİDUVAR.Ö.,1986. Hydrographic Chacteristic of İskenderun Bay, MSc. Thesis, Institute of Marine Sciences, Middle east technical University, 33731, Erdemli-İçel.157 pp.
- JOHNSON, D.,A., HESS, K., W., 1990. Numerical Simulations of Blue crab Larval Dispersal and Recruitment . Bull., Mar., Scien., Vol: 46, No: 1. 195-213.
- JONES, M.C., McCONAUGHA, J.R., GEER, P.J., PRAGER, M.H., 1990. Estimates of Spawning Stock Size of Blue Crab, *Callinectes sapidus* , in Chesapeake Bay, 1986-1987.Bull., Mar., Scie.,Vol.46, No. 1, 159-169.

- KOCATAŞ, A., 1986. Akdeniz Benthosu. Yüksek Lisans Ders Notları Ege Üniv., Su Ürünleri Fakültesi (Basılmamış), İzmir.
- KNOTTS, K.S., 1990. Preliminary Information on The Population Dynamics of The Blue Crab in Chesapeake Bay Base on Field Sampling of The Commercial Fishery. Vol.46, No.1, 246.
- LAGLER, E.D., 1970. Freshwater Fishery Biology. W.M.C. Brown Company Publisher Duopue Iowa, 317 pp.
- LIPCIUS, R. N., VAN ENGEL, W.A., 1990. Blue Crab Population Dynamics in Chesapeake Bay: Variation in Abundance (York River, 1972-1988) and Stocks-Recruit Functions. Bull., Mar., Scien., 46 (1): 180-194.
- LIPCIUS, R. N., NOLMI III, E.J., VAN MONTFRANS, J., 1990. Regulatory Mechanisms of Postlarval Blue Crab Recruitment: Settlement, Metamorphosis and Development State. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 247.
- LIPCIUS, R. N., METCALF, S.K., 1992. Relation of Habitat and Spatial With Physiological State and Settlement of Blue Crab in Chesapeake Bay : Mar. Ecol. Prog., Ser. Vol.82: 143-150.
- LITTLE, K.T., 1990. Mechanism For The Reinvasion of The Atlantic Blue Crab, *Callinectes sapidus* (Rathbun) into The Delaware Estuary. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 247.
- LUCKENBACH, M.W., ORTH, R., 1992. Swimming Velocities and behavior of Blue Crab (*Callinectes sapidus* Rathbun) megalopea in Still and Flowing Water. Estuaries Vol. 15, No.2, 186-192.
- MANSOUR, R.A., LIPCIUS, R., N., 1988. Feeding Ecology of *Callinectes sapidus* in Chesapeake Bay- Implications for Soft-Sediment Marine Benthic Predator – Prey Dynamics. JNL Shellfish Res. Vol: 7 No. 3, 561
- MARIS, R.C., 1990. Dispersal-Recruitment Mechanisms of *Callinectes sapidus* Rathbun Involving Larval and Postlarval Patterns of Diurnal Distribution in The Vicinity of The Chesapeake Bay, Virginia. Vol.46, No.1, 247.
- MATIATISSEK, R., SCHNEPEL, F.M., STEINER, G., 1989. Lebensmittel-analytik, Springer- Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo. S:440.
- McCLINTOCK, B., J., KLINGER, T.S., MARION, K., HSUEH, P., 1991. Digestive carbohydrases of Blue Crab *Callinectes sapidus* (Rathbun) : Implication in Utilization of Plant- Derived Detritus as a Trophic Resource. J. Exp., Mar., Biol., Ecol., 148. 233-239.

- McCLINTOCK, B. ve ark.,1993. Population Studies of Blue Crabs in Soft-Bottom, Unvegetated Habitats of a Subestuary in the Northern Gulf of Mexic. J. Crust., Biol., Vol. 13, No.3, pp. 551-563.
- McCONAUGHA, J.R., JOHNSON, D.F., PROVENZANO, A.J., MARIS, R., C., 1983. Seasonal Distribution of Larvae of *Callinectes sapidus* (Crustacea: decapoda) in The waters Adjacent to Chesapeake Bay. Journal of Crustacean Biology, 3(4): 582-591.
- McCONAUGHA, J.R., 1990. Interannual Variation in *Callinectes sapidus* Population Densities: Biological and Physical Factors. Bull., Mar., Sicen., Vol.46, No.1, 247.
- McCONAUGHA, J.,R., McCONAUGHA, C.,S., 1991. The Effects of habitat avability on the Growth of Juvenile Blue Crabs (*Callinectes sapidus*) . Am.,Zool., Vol.31,No. 5, 25A.
- METCALF, K.S., LIPCIUS, R.N., 1992. Relationships of habitat and Spatial Scale with physiological State and Settlement of Blue Crab Postlarvae in Chesapeake Bay. Mar., Ecol., prog., ser., Vol.82, no.2, pp. 143-150.
- MONTFRANS, J., V., PEERY, C., A., ORTH, R., J., 1990. Daily, Monthly and Annual Settlement Patterns By *Callinectes sapidus* and *Neopanope sayi* megalopae on Artificial Collectors Deployed in the York River, Virginia: 1985-1988. Bull., Mar.,Scien., 46 (1): 214-229.
- MONTFRANS , J., V., RYER, C.,H., ORTH, R.,J., 1991. Popoulation Dymanics of Blue Crabs *Callinectes sapidus* Rathbun in a Lower Chesapeake bay Tidal Marsh Creek. J. Exp., Mar., Biol., Ecol., 153, 1-14.
- NYE, L.A., 1990. Telemetric Analysis of Foraging Behavior By Blue Crabs. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 248.
- OLMI III, E., BISHOP, J.M., 1983. Varitions in Total Width-weight Relationships of Blue Crabs, *Callinectes sapidus* , in Relation to Sex , maturity, Molt Stage and carapace Form . Journal of Crustacean Biology , 3(4): 575-581.
- OLMI III, E., J., MONTFRANS, J.,V., LIPCIUS, R.,N., ORTH, R.,J., SADLER, P.W., 1990 Varition in Planktonic Avability and Settlement of Blue Crab Megalopae in the York River, Virginia. Bull., Mar.,Scien., 46 (1): 230-243.
- ORTH, R.J., MONTRANS, V.J., 1990. Utilization of Marsh and Seagrass Habitats By early Stages of *Callinectes sapidus* : A latitudinal Perspective. Bull., Mar.,Scien., Vol.26, No.1, 126-144.

- ÖZEL, İ., 1993. Planktonoloji Cilt I. (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 145,270 s. İzmir.
- _____ 1996. Planktonoloji II. Denizel Zooplankton. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:49, 269 s. İzmir.
- PAUL,A., HAEFNER JR., 1985 a. The Biology and Exploitation of Crabs. The Biology of Crustacea, Vol.10, 111-163.
- _____ 1985 b. Morphometry, Reproduction, diet and Epizoit of *Ovalipes stephensoni* Williams, 1976 (Decapoda, Brachyura). Journal of crustacean Biology , 5(4): 658-672.
- _____ 1990. Morphometry and Size at Maturity of *Callinectes ornatus* (Brachyura, Portunidae) in Bermuda. Bull., of Mar., Scien., 46(2), 274-286.
- PEERY, H.M., MACILWAIN, T.D., 1986. Species Profiles : Life Histories and Environmental Requirement of Coastal Fishes and Invertebrates (Gulf of Mexico). Blue Crab. Biol. Rep., U.S., Fish Wildl., ser., 30 pp.
- PEERY, C.S., MONTFRANS, J.V., ORTH, R.J., 1990. Settlement Pattern of Several Different Species of Decapod in The York River, Virginia. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 248.
- PLETL, J.J., McCONAUGHA, J.R., 1990. The Physiological and Bioenergetic Responses of Blue Crab Larvae to Diet and Seasonality. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 248.
- POLAT, S., 1997. İskenderun Körfezinin Yumurtalık-Toros Gübre arasındaki Kıyı Bölgesinde Fitoplankton Dağılımı, Yoğunluğu ve Bunların Zamana bağlı değişimleri. Doktora Tezi, Ç.Ü. fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Ana Bilim dalı. 127 s. Adana.
- POIRRIER, M.A., GRACI, K.A., STEVENSON, M.M., ARY, R.D., 1990. Effects of Adverse Water Quality on Emersion in The Blue Crab, *Callinectes sapidus* Rathbun. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 249.
- PRAGER, M. H., McCONAUGHA, J.R., JONES, C.M., GEER, P.J., 1990. Fecundity of Blue Crab , *Callinectes sapidus* , in Chesapeake Bay: Biological, Statistical and Management Considerations. Bull., Mar., Scien., 46(1), 170-179.
- RAMADAN,Sh.E., DOWIDAR, N.N., 1972. Brachyura (Decapoda Crustacea) From the Mediterranean Waters of Egypt. Thalassia Jugoslavica 8(1), 127-139.
- RELINIG., 1980. Cirripedia Toracici . Guide Per il Riconoscimento dello Specie Animali delle Acque Lagunarie e Costiere italiane AQ/1/91. 115 pp.

- RIEDL,R., 1983. Fauna Und Flora des Mittelmeeres. Ein Systematischer meeresführer für Biologen und Naturfreunde. Verlag paul parey Hamburg. 831 pp.
- ROE,G., 1990. Comparison of Health Parameters of *Callinectes sapidus* Held in Two Types Shedding Systems. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 249.
- ROMAN, M.R., BOICOURT, W.C., 1990. Temporal and Spatial Variations in The Abundance of Blue Crab Larvae in The Chesapeake Bay Plume and Surrounding Shelf Waters. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 249.
- RUPPERT,E.E., BARNES,R.D., 1994. Invertebrate Zoology (Sixth Editions). Saunders College Publishing. London. 799 syf.
- RYER, H., C., MONTFRANS, J.,V., ORTH, R., 1990. Utilization of A Seagrass Meadow and Tidal Marsh Creek By Blue Crabs *Callinectes sapidus* II. Spatial and Temporal Patterns of Molting. Bull.,Mar., Scien., 46 (1). 95-104.
- SADLER, P.W., MONFRANS, J.V., ORTH, R.J., 1990. The Spatial and Temporal Distribution of *Callinectes sapidus* Megolopal Settlement in The York River, Virginia, During September 1985 . Bull.,Mar.,Science, Vol, 46, No. 1.
- SALIHLİOĞLU,İ., ve ark., 1990. Transport and Distribution of nutrient and Chlorophyl- α by mesoscale Wddies in the Northeastern Mediterranean. Marine chemistry, 29:pp. 375-390.
- SAS Institute.1985.SAS User's guide, Statistics. Version 5 Edition. SAS Institute Inc.,Cary, NC.,
- SEED, R., HUGHES, R.N., 1997. Chelal Characteristics and Foreigning Behaviour of The Blue Crab *Callinectes sapidus* Rathbun. Estuarine, Coastal and Shelf Science 44, 221-229.
- SHEETS, P.,W.,C., DENDINGER, J.,E.,1983. Calcium Deposition into The Cuticle of the Blue Crab, *Callinectes sapidus*, Related to External Salinity. Comp., Biochem., Physiol., Vol. 74A, No. 4, 903-907.
- SHIBER, J.G., 1981. Brachyurans From Lebanese Waters. Bulletin of Marine Sci., 31 (4):864-875.
- SHIRLEY,M.A., 1990. Habitat Selection By Molting and Mating Blue Crabs . Bull., Mar., Science, Vol. 46, No. 1
- SIDDIQUIE, P.J.A., AKBAR, Z.,QASIM,R 1987. Biochemical Composition and Calorific Values of the Three Edible Species of Portunidae Crabs From Karachi. Pakistan. J. Sci., Ind., Res., Vol. 30, No. 2. 119-121.

- SMITH, D.L., 1990. Patterns of Limb Loss in the Blue Crab, *Callinectes sapidus* Rathbun, and The Effects of Autotomy on Growth. Bull., Mar., Scien., Vol. 46, No. 1, 23-36.
- SNOVSKY, Z., GALIL, B., 1990. The Occurrence of the American Blue Crab, *C. sapidus* Rathbun, in the sea of Galilee. Ist., J. Aquacult, Bamidgah, Vol. 42, No. 2, pp. 62-63.
- STEELE, P., BERT, T., 1994. Population Ecology of the Blue Crab, *C. Sapidus* Rathbun, in a Subtropical Estuary: population structure, Aspects of Reproduction and habitat Partitioning. Fla., mar., Res., Publ., No. 51, pp. 24.
- SULKIN, S.D., 1975. The Significance of Diet in the Growth and Development of Larvae of Blue Crab, *Callinectes sapidus* Rathbun, Under Laboratory Conditions. Center for Environmental and Estuarine Studies, University of Maryland, No: 661. 119-133.
- _____ 1978. Nutritional Requirement During larval Development of The Portunid crab, *Callinectes sapidus* Rathbun. J. Exp., Mar., Biol., Ecol., Vol: 34, 29-41.
- TERNES, W., 1994. Naturwissenschaftliche Grundlagen der Lebensmittelzubereitung, Behr's Verlag Hamburg, 762 s..
- TSAI, D., CHEN, H., TSAI, C., 1984. Total Lipid and Cholesterol Content in the Blue Crab, *Callinectes sapidus* Rathbun. Comp. Biochem., Physiol. Vol. 78B, No. 1, 27-31.
- THOMAS, J.L., ZIMMERMAN, R.J., MINELLO, T.J., 1990. Abundance Patterns of Juvenile Blue Crabs (*Callinectes sapidus*) in Nursery Habitats of Two Texas Bays. Bull., Mar., Scie., Vol. 46, No. 1, 115-125.
- VAN ENGEL, W.A., 1990. Development of the Reproductively Functional From in The Male Blue crab, *Callinectes sapidus*. Bull., Mar., Science, 46(1): 13-22
- VAN HEUKELEM, W.F., SULKIN, S.D., 1990. Effects of Low Temperature on Activity and Survival of Juvenile Blue Crabs. Bull., Mar., Scien., Vol. 46, No. 1, 251.
- VARNELL, L., McCONAUGHA, J., 1990. Temporal and Spatial Distribution of Blue Crab Larvae on The Mid-Atlantic Bight, 1982-1983. Bull., Mar., Science, Vol. 46, No. 1
- YILMAZ, A., 1982. Fluorescence Measurements in Marine Environment. M.S. Thesis. IMS-METU, 127 pp.
- YILMAZ, A., BAŞTÜRK, Ö., SAYDAM, C., EDİĞER, D., HATİPOĞLU, E., 1992. Eutrophication In Iskenderun Bay, North-eastern mediterranean. Sciences of the Total Environment, Elsevier Science Publisher B.V., Amsterdam, 705-717.
- WENNER, E.L., 1989. Incidence of Insemination in female Blue Crabs, *Callinectes sapidus*. Journal of Crustacean Biology, 9 (4): 587-594.

- WENNER , L.E., DAUGHERTY .M., 1990. Incidence of Insemination in Adult Female Adult Blue Crab From South Carolina. Bull., Mar., Science Vol. 46, No. 1
- WILLIAMS, A.H., COEN, L.D., STOELTING, M.S., 1990. Seasonal Abundance, Distribution and habitat Selection of Juvenile *Callinectes sapidus* (Rathbun) in The Northern Gulf of Mexico. J.Exp., mar., Biol., Ecol., Vol.137, 165-183.
- WILSON, K.A., ABLE, K.W., HECK, K.L., 1990. Habitat Use By Juvenile Blue Crabs. Bull., Mar., Scien., Vol.46, No.1, 105-113.
- WOOTTON, 1990. Ecology of Teleost Fishes. Chapman and Hall, London.404 pp.

TEŞEKKÜR

Bu çalışmayı, TBAG-1552 Kod No'lu proje olarak destekleyen TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu'na, çalışmanın yürütüldüğü dönem boyunca etkin bilgi ve deneyimlerini esirgemeyen Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri sayın Prof. Dr. Tuncer KATAĞAN ve Prof. Dr. Ahmet KOCATAŞ' a, özellikle larva konusundaki önemli bilgi birikiminden yararlandığımız Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. İsmet Özel' e, fakültenin bütün olanaklarından yararlanmamızı sağlayan fakültemiz dekanı sayın Prof. Dr. Ercan SARIHAN' a, yengeç sepetlerini hazırlanmasında yardımcı olan sayın Osman TAŞDEMİR' e, gerek avcılık gerekse arazi çalışmalarımızda yardımını esirgemeyen sayın Arş. Gör. Erhan AKAMCA' ya, çalışmada kullanılan fotoğrafların çekilmesinde emeği geçen sayın Arş. Gör. Faik SAĞLAMTIMUR' a, istatistik analizlerde yardımını gördüğümüz Ç. Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bölümü araştırma görevlilerinden sayın Arş. Gör. Yaşar SERTDEMİR' e , Karataş' da örneklemelerde teknelerinden yararlandığımız kaptan Canan GAYIR' a, Yumurtalık'ta gerçekleştirilen çalışmalarda büyük özveri ile yardım eden Fakültemiz' e ait GÖZLEM adlı Araştırma teknesi personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

BİBLİYOGRAFİK BİLGİ FORMU

1- Proje No: TBAG-1552 (196TO56)

2- İlgili Araştırma Grubu: Temel Bilimler Araştırma Grubu

3- Projenin Başlangıç ve Bitiş tarihleri:

Başlama tarihi: 15.09.1996 Bitiş tarihi: 14.09.1999

4- Projenin Adı:

İskenderun Körfez'indeki Mavi Yengeç (*Callinectes sapidus* RATHBUN,1896) in Bazı Biyolojik Özellikleri

5- Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacılar:

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ünal ERDEM

Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Dr. Canan TÜRELİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇELİK

6- Projenin Yürütüldüğü Kuruluş ve Adresi:

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 01330 Balcalı ADANA

7- Destekleyen Kuruluş(ların) Adı ve Adresi:

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu, Temel Bilimler Araştırma Grubu,
06100 ANKARA

Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu, Çukurova Üniversitesi, 01330 Balcalı-ADANA

8- Özet (Abstract)

Özet: Bu çalışma ile İskenderun Körfez'inden 15 Eylül 1996 ile 15 Mayıs 1998 tarihleri arasında elde edilen örnekler incelenerek Atlantik kökenli Mavi Yengeç (*Callinectes sapidus* Rathbun, 1896)'in yaşam döngüsü (yumurtlama, larva oluşturma, kabuk değişimi), üreme biyolojisi (yumurta verimliliği, gonadosomatik indeks), morfometrik özellikleri, beslenme özellikleri, et analizleri (kuru ağırlık, protein, lipit) gibi biyolojik özellikleri belirlenmiştir. Sonuçta İskenderun Körfez'indeki popülasyonda %68.8 ile dişilerin baskın olduğu, ergin dişilerin ortalama 12.69 ± 2.33 cm, erkeklerin 12.74 ± 2.77 cm, juvenillerin ise 7.81 ± 1.98 cm karapas genişliğinde oldukları saptanmıştır. Eşeyssel olgunluğa dişilerin 6.05 cm, erkeklerin 4.48 cm karapas uzunluğunda ulaştıkları ve çiftleşmenin ilkbaharda Mart-Nisan aylarında vejetasyonlu, tatlı suyun karıştığı sığ bölgelerde gerçekleştiği, yumurtlamanın Mart ile Eylül hatta Ekim ayına kadar yoğun olarak Yumurtalık Koy'unun 12-15 m derinliklerde gerçekleştiği, yumurta verimliliğinin ortalama $1.876.968 \pm 1.165.659$ adet olduğu bulunmuştur. Yumurta açılımdan sonra 8 zoea larval evre geçirdikleri saptanmıştır. Yumurta açılımı Yumurtalık Koy'unun girişindeki 10-20 m derinliklerde gerçekleşmekte daha sonra hakim rüzgarlarla larvalar sığ vejetasyonlu bölgelere taşınmaktadır. Juvenil bireyler Mayıs ve Eylül de arazide bulunmuştur. Yumurtalık Koy'unun toplam 118 km^2 alanında toplam biyokütle 34.9291 kg , km^2 ise 0.30 kg olarak hesaplanmıştır. Trol çekimlerinde av grupları içerisinde ilk sırayı Mavi Yengecin aldığı gözlenmiştir. Mavi Yengecin bivalviya, krustase, gastropod, balık ve bitkisel organizmalar üzerinden beslendikleri bulunmuştur. Yengeç etinin protein oranı yüksek (%21.96), lipit (%0.21) oranı ise düşük saptanmıştır.

Abstract: This study was conducted in İskenderun Bay and investigated the cycle (ovulation, larval period, molt cycle), reproductive biology (fecundity, gonadosomatik index), morphometric aspects, feeding regime, meat analysis (dry weight, protein, lipid) of *Callinectes sapidus* from 15 September 1996 to 15 May 1998, Which is originated from Atlantic (Which is originating Atlantic). The population of mature females in İskenderun Bay were dominant to males (68.8 %) and the carapace of mature females and males were 12.69 ± 2.33 and 12.74 ± 2.77 cm in width, respectively. Whereas, juveniles were observed 7.81 ± 1.98 cm in carapace width. Sexual maturation of females and males was observed at 6.05 and 4.48 carapace length respectively. Mating behaviour was observed in spring from March to April in freshwater and shallow area which was rich in vegetation. Ovulation was detected which detected in Yumurtalık Bight (12-15 m depth) from September to October even until November. The Blue Crab was found to be a mean fecundity of $1.876.968 \pm 1.165.654$ and it was found out that after hatching, larvae were passed through 8 zoeae stage. Hatching occurred in 10-20 m depth in entire Yumurtalık Bight However, that were moved to the shallow, vegetation area by winds. Juvenils were first seen in sea between May and September. In Yumurtalık Bight total biomass was calculated as $34.9291 \text{ kg}/118 \text{ km}^2$ ($0.30 \text{ kg}/ \text{km}^2$). According to the catches which were performed by troll, the biggest number of groups was seen as Blue Crabs. The Blue Crabs was feeding on Bivalvia, Crustacea, Gasropoda, fish and phytoplantons, protein rate of crab meat was obtained as 21.96 %. Although lipid rate was found to be low 0.21%.

9- Anahtar Kelimeler:

Mavi Yengeç, *Callinectes sapidus* , Biyo-Ekolojik Özellikler, Üreme Biyolojisi, Et Analizleri

Blue Crab , *Callinectes sapidus* , Bio-Ecological Parameters, Reproductive Biology, Meat Analysis

10- Projede Yapılan Çalışmaların Sonuçları ile İlgili Yayınlar (makale, tebliğ):

11- Proje Sonuçlarının Gizlilik Durumu: Gizli Değil